


Справочник по приматам, Том 2 (из 2)

Генри О. Форбс

A Hand-book to the Primates, Volume 2 (of 2)

Henry O. Forbes



Электронная книга проекта "Гутенберг" из Справочника по приматам, Том 2 (из 2)

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Справочник по приматам, Том 2 (из 2)

Автор: Генри О. Форбс

Дата выхода: 23 октября 2013 г. [Электронная книга № 43992]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

Язык: Английский

Втирах: Продюсеры: Крис Карноу, Род Кроуфорд, Кит Эдкинс и команда онлайн-редакторов, распространяющих корректуру на,,<http://www.pgdp.net> (Этот файл был создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА: СПРАВОЧНИК ПО ПРИМАТАМ", ТОМ 2 (ИЗ 2) ***

Примечание переписчика:

Исправлено несколько типографских ошибок. Они отображаются в тексте следующим образом, а объяснение появится при наведении указателя мыши на отмеченный отрывок.

У проекта "Гутенберг" есть другой том этой работы.

[Том I](#): смотрите

<http://www.gutenberg.org/ebooks/43991>

ФОТО XXVI.



МАКАКА СВЯТОГО ИОАННА

"ЕСТЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ ЛЛОЙДА".

Под редакцией Р. Боудлера Шарпа, доктора права, F.L.S. и с.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ПО ПРИМАТАМ.

ГЕНРИ О. ФОРБС, доктор права, F.R.G.S., F.Z.S. И ДР.,

ДИРЕКТОР МУЗЕЕВ ЛИВЕРПУЛЬСКОЙ КОРПОРАЦИИ,

*Автор книги "Странствия натуралиста по Восточному архипелагу",
и т.д., и т.п.*

ТОМ II.

ЛОНДОН:

ЭДВАРД ЛЛОЙД, ЛИМИТЕД,

СОЛСБЕРИ-СКВЕР, 12, ФЛИТ-СТРИТ.

1897.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Вступительные замечания в предыдущем томе объясняют смысл "Настольной книги" приматов, за которую взялся доктор Форбс. Я надеюсь, что часть работы, посвященная географическому распространению этих животных, будет сочтена представляющей некоторый интерес; но, как объяснил автор, скудость материала в музеях чрезвычайно затрудняет определение точных мест обитания обезьян.

Р. БОУДЛЕР ШАРП.

Введение.

Мне нечего добавить к замечаниям, приведенным в первом томе этого "Справочника". Я могу сослаться, однако, на интерес, который придает изучение вымерших форм жизни по отношению к тем, которые существуют в настоящее время. Хотя я постарался, в меру своих возможностей, представить студенту как можно более полный обзор известных нам в настоящее время видов обезьян, я хорошо осознаю, что предстоит проделать огромный объем работы, прежде чем можно будет назвать наши знания о приматах полными. У спортсменов существует естественное отвращение к коллекционированию образцов обезьян. Стрелять в кого-то - все равно что убивать своего рода родственника, и даже наши лучшие коллекционеры, которые досконально понимали необходимость добывания образцов в интересах науки, с чувством боли говорят о страданиях, подобных человеческим, которые испытывает раненая обезьяна; и поэтому трудно убедить путешественников стрелять в животных, которые представляют собой столь "фальшивое представление" для людей.

Расплывчатость, с которой натуралисты старшего поколения выражались в отношении географического распространения, также чрезвычайно затруднила правильную оценку ареалов некоторых приматов. Таким образом, "Бразилия" может означать любую часть южноамериканского континента от Аргентинской Республики до Амазонок, а "Мексика" служила во многих музеях любого населенного пункта между Мексикой и Панамой. Таким образом, многое еще предстоит сделать, чтобы точно определить районы обитания различных видов приматов.

ГЕНРИ О. ФОРБС.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	СТРАНИЦА
ОТРЯД ПРИМАТОВ (продолжение),	1
ПОДОТРЯД II.—ANTHROPOIDEA (продолжение),	1
СЕМЕЙСТВО ЦЕРКОПИТЕКОВЫХ (продолжение),	1
ПОДСЕМЕЙСТВО ЦЕРКОПИТЕКОВЫХ (продолжение),	1

IV. <i>Macacus</i> , Lacép.,	1, 213
01. <i>inuus</i> (L.),	4, 213
02. <i>arctoides</i> , Is. Geoffr.,	8
03. <i>rufescens</i> , Anders.,	11
04. <i>maurus</i> , F. Cuv.,	11
05. <i>fuscatus</i> , Blyth,	13
06. <i>leoninus</i> , Blyth,	14
07. <i>неместринус</i> (L.),	16
08. <i>силенус</i> (L.),	18
09. <i>ассаменсис</i> , Макклелл.,	20
10. <i>резус</i> (ауд.),	22
11. <i>лазиотис</i> , Серый,	25
12. <i>челиенсис</i> , Милн-Ред.,	26
13. <i>санкти-йоханнис</i> (Свинх.),	28
14. <i>циклоп</i> , Свинх.,	28
15. <i>киномологус</i> (L.),	31
16. <i>пилеатус</i> (Шоу),	33
17. <i>синикус</i> (L.),	35
В. Церкоцебус, Джеффри,	36
лет.01. <i>fuliginosus</i> , Geoffr.,	37
лет 02. <i>воротничок серый</i> ,	38
лет 03. <i>этиопс</i> (L.),	39
04. <i>альбигена</i> , Грей,	40
лет.05. <i>атеррим</i> , Удем.,	40
06. <i>галеритус</i> , Петерс,	41
VI. <i>Cercopithecus</i> , Erxl.	41
Группа I.— <i>Cercopithecini rhinosticti</i>	44
01. <i>петавриста</i> (Schreb.)	44
02. <i>сигнатус</i> , Джентинк	45
03. <i>эритрогастер</i> , серый	46
04. <i>бьюттикофери</i> , Джентинк	47
05. <i>мартини</i> , Вода	47
06. <i>людю</i> , Грей,	48
лет 07. <i>melanogenys</i> , Gray	49
08. <i>stampflii</i> , Jentink	50
09. <i>schmidtii</i> , Matschie	50
10. <i>nictitans</i> (L.)	51
11. <i>эритроз</i> , водный.	52
12. <i>сепхус</i> (L.)	53

Группа II.—Cercopithecī chloronoti	54
13. cynosurus (Scop.)	55
14. sabæus (L.)	56
15. вернери, Джеффри.	58
16. callitrichus, Is. Geoffr.	58
17. pygerythrus, F. Cuv.	60
18. tantalus, Ogilby	62
Группа III.—Cercopithecī erythronoti	63
19. patas (Schreb.)	63
20. pyrrhonotus, Н. и Е.	64
21. руфо-виридис, Джеффри.	65
Группа IV.—Cercopithecī melanochiri	66
22. мона (Schreb.)	66
23. альбигулярис (Сайкс)	67
24. бутурлинии, Гигл.	69
25. кампбелли, Уотерх.	70
26. саманго, Сандев.	71
27. лабиатус, Джеффри.	72
28. опистостикус, Scl.	72
29. стайрси, Scl.	73
30. молонейи, Скл.	74
31. неглект, Скл.	75
32. левкампикс (Фишер)	75
Группа V.—Cercopithecī auriculati	76
33. грайи, Фрейзер	77
34. погониа, Беннетт	78
35. черные полосы, Дю Шайю	78
36. вольфи, Мейер	79
Группа VI.—Cercopithecī barbati	79
37. диана (L.)	79
38. палатин, Вагн.	81
39. бразза, Милн-Ред.	81
Группа VII.—Cercopithecī trituberculati	82
40. талапоин, Erxl.	82
ПОДСЕМЕЙСТВО СЕМНОПИТЕКОВЫХ	83
I. Колобус, Иллиг.	85, 214
01. вер, Ван Бенед.	87
02. руфомитратус, Питерс	88
03. кирки, Грей	89

04. ферругинус (Шоу)	91
05. сатанас, Уотерх.	93
06. урсин, Огилби	93
07. веллеросус (Ис. Geoffr.)	94
08. angolensis, Scl.	96
09. guereza, Rüpp.	97
10. хвостатый, Томас	98
II. Семнопитек, F. Cuv.	100, 214
01. барбии (Блит)	102
02. пилеатус, Блит	103
03. энтелл (Дуфр.)	104
04. шистацеус, Ходжс.	107
05. приам (Блит)	108
06. гиполев, Блит,	110
07. джонни (Фишер)	111
08. головоногий (Зимм.)	112
09. сабанус, Томас	116
10. хосий, Томас	117
11. томази, Коллетт	119
12. эверетти, Томас	120
13. круцигер, Томас	121
14. урсин (Блит)	122
15. обскурус, Рид	123
16. голотефреус, Андерс.	124
17. жермени, Милн-ред..	124
18. маурус (гребень)	125
19. бедренная кость, Хорсф.	126
20. рубикундус, С. Мюлл.	128
21. натуна, Томас и Хартерт	129
22. файрии (Blyth)	131
23. ратледжи, Андерсон	133
24. frontatus, S. Müll.	133
25. nemæus (L.)	134
26. nigripes, Милн-Ред.	135
27. melanolophus (Raffl.)	136
28. mitratus (Esch.)	137
29. roxellanae, Милн-Ред.	139
III. Назалис, Джеффр.	140
01. larvatus (Wurmb.)	140

СЕМЕЙСТВО SIMIIDAE	143
I. Хилобаты нелиговые.	148, 216
01. agilis, F. Cuv.	151
02. левциск (Schreb.)	154
α. левциск (Schreb.)	154
β. concolor, Schl.	155
03. лейкогенис, Огилби	158
04. лар (L.)	159
05. хулок, Хаслан.	161
06. хайнань, Томас	164
07. синдактилус (десм.)	166
II. Симия, Л.	170, 217
01. сатирус, Л.	170, 217
III. Горилла, это. Джеффри.	180
01. горилла (Вайман)	180
IV. Антропомитек, Blainv.	187, 217
01. троглодиты (L.)	194
02. кальвус (Дю Шайю)	199
СЕМЕЙСТВО ГОМИНИДЫ	203, 218
I. Человек, L.	203
01. сапиенс, L.	203
α. Эфиопская раса	207
β. Монгольская раса	207
γ. Европеоидная раса	208
ВЫМЕРШИЕ АНТРОПОИДЕИ	209
СЕМЕЙСТВО NAPALIDAE	210
I. Napale, Illig.	210
01. grandis, Лунд	210
СЕМЕЙСТВО CEBIDAE	210
Подсемейство Nyctipithecinae:	
I. Protopithecus, Лунд	210
01. brasiliensis, Лунд	210
II. Каллитрикс, Джеффри.	210
01. chlorosomys, Лунд	210
02. primæva, Лунд	210
Подсемейство мицетиновых:	
III. Алуатта, Ласип.	210
01. медведица (Humb.)	210
Подсемейство Cebinae:	

IV. Себус, Erxl.	210
01. макрогнатус, Лунд	210
02. фатуэллус (L.)	210
03. сиррифер, Джефф.	210
Против. Гомункулус, Амег.	211
01. патагоникус, Амег.	211
VI. Антропопс, Амег.	211
01. perfectus, Амег.	211
СЕМЕЙСТВО CERCOPITHECIDAE.	
Подсемейство Cercopithecinae:	
I. Papio, Erxl.	212
01. субгималаямус (Мейер)	212
02. фальконери (Лайдеккер)	212
03. atlanticus, Thomas	212
II. Oreopithec, Герб.	212
01. бамболии, герб.	212
III. Macacus, Lacér.	1, 213
01. sivalensis, Lydekker	213
02. priscus	213
03. inuus, Gervais	4, 213
04. florentinus, Cocchi	213
05. суевикус, Хединг.	213
06. таренсис, Помель	213
IV. Долихопитек, Депере	214
01. русциненсис, Депере	214
V. Месопитек, род.	214
01. пентеличи, род.	214
Подсемейство семнопитековых:	
I. Колобус, иллиг.	85, 214
01. грандебус, Фраас.	214
II. Semnopithecus, F. Cuv.	100, 215
01. monspessulanus, герв.	215
02. palæindicus, Lydekker	215
СЕМЕЙСТВО SIMIIDAE	215
I. Pliopithecus, Gerv.	215
01. antiquus, Gerv.	215
02. chantrei, Gerv.	216
II. Хилобаты, илиг.	148, 216
01. leuciscus (Schieb.)	216

III. Дриопитек, Лартет.	216
01. фонтани, Лартет.	217
IV. Симия, Л.	170, 217
01. сатирус, Л.	170, 217
V. Антропопитек, Blainv.	188, 217
01. sivalensis (Lydekker)	217
СЕМЕЙСТВО ГОМИНИД	218
I. Гомо, Л.	218

СПИСОК НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ.

XXVI.	—Макака Сент-Джонса	<i>Macacus sancti-йоханнис.</i>
XXVII.	—Мангабей с белой короной	<i>Cercocebus ethiops.</i>
XXVIII.	—Зеленый Генон	<i>Cercopithecus callitrichus.</i>
XXIX.	—"Генон" Бутурлини	<i>Cercopithecus boutourlinii.</i>
XXX.	—Генон Эркслебена	<i>Серкопитек серый.</i>
XXXI.	—"Генон" Де Браззы	<i>Церкопитек бразза.</i>
XXXII.	—Талапоин	<i>Cercopithecus talapoinus.</i>
XXXIII.	—Залив Гереса	<i>Железистый колобус.</i>
XXXIV.	—Белохвостая гереса	<i>Хвостатый колобус.</i>
XXXV.	—Лангур Хоса	<i>Семнопитек хосий.</i>
XXXVI.	—Лангур Эверетта	<i>Семнопитек эверетти.</i>
XXXVII.	—Хоботковая Обезьяна	<i>Nasalis larvatus.</i>
XXXVIII.	—Сиаманг Гиббон	<i>Hylobates syndactylus.</i>
XXXIX.	—Орангутанг	<i>Симия сатирус.</i>
XL.	—Горилла	<i>Горилла -горилла.</i>
XLI.	—Лысый шимпанзе	<i>Антропопитек кальвус.</i>
XLII.	—Карта I., показывающая распределение живых и ископаемых <i>Lemuroidea</i> .	
XLIII.	—Карта II. Показано распространение семейства <i>Tarsiidae</i> и подсемейства <i>Galaginae</i> из <i>Lemuridae</i> .	
XLIV.	—Карта III. Показано распределение семейства <i>Chiromyidae</i> , и подсемейств <i>Lemurinæ</i> и <i>Indrisinae</i> , и подсемейства <i>Lorisinae</i> из <i>Lemuridae</i> .	
XLV.	—Карта IV. Показано распределение живых и ископаемых <i>Anthropoidea</i> .	
XLVI.	—Карта V., показывающая распределение семейств <i>Hapalidae</i> и <i>Cebidae</i> .	
XLVII.	—Карта VI. Показано распределение родов <i>Papio</i> , <i>Theropithecus</i> , <i>Cynopithecus</i> , <i>Cercocebus</i> , <i>Cercopithecus</i> и <i>Macacus</i> .	
XLVIII.	—Карта VII. Показано распределение родов <i>Semnopithecus</i> , <i>Nasalis</i> и <i>Colobus</i> .	
XLIX.	—Карта VIII. Показано распределение родов <i>Hylobates</i> , <i>Simia</i> , <i>Gorilla</i> и <i>Anthropopithecus</i> .	

ОТРЯД ПРИМАТОВ.

ПАВИАНЫ, МАНГАБЕИ И МАКАКИ

(Продолжение).

МАКАКИ. РОД *MACACUS*.

Macacus, Lacép., Mem. de l'Inst., iii., стр. 450 (1801).

Этот род охватывает большое количество видов, которые характеризуются коренастым телом и короткими крепкими конечностями с отведенным назад большим пальцем. Морда значительно развита и закруглена, но нос не выступает так далеко, как плоскость верхней губы; ноздри открываются перед своим окончанием и направлены косо наружу и вниз; их щечные мешки большие, а губы толстые и выпуклые; их глаза приближены и смотрят из-под толстых и выступающих надбровных дуг; их уши голые и плотно прижаты к бокам головы, а их задний верхний угол заострен; их мозоли, которые увеличиваются с возрастом, часто окружены частью лица. Ягодицы, которые всегда обнажены. Хвост длинный, короткий, с хохолком или сведенный к простому бугорку, и внешне он может быть совершенно незаметен. У некоторых волосы на голове длинные и расходятся во все стороны; у других лицо окружено чем-то вроде гривы. У некоторых северных форм все тело покрыто густым мехом в качестве защиты от холода.

В черепе лицевая область преобладает над черепной, и нижний край лобных костей вытянут, образуя толстый выступающий гребень над глазами и носом; сосцевидные отростки с каждой стороны черепа, за ухом, очень заметны для прикрепления мышцы, которая помогает открывать рот и глотать пищу. Сильные мышцы также растягиваются от затылка к позвоночнику для поддержки головы. Клыки длинные и прижимаются к передним молярам нижней челюсти, положение которых изменяется или искажается под действием давления, что позволяет этим животным раздавливать и вскрывать фрукты с твердой скорлупой. Их передний и средний нижние коренные зубы четырехзубые, в то время как задний заметно крупнее и имеет пять острых зубов и задний коготь. Запястье, или запястье, имеет центральную (*os centrale*) кость, а пястные кости пальцев удлинены. Хвостовые позвонковые у видов этого рода обычно многочисленны; даже у короткохвостых видов их количество варьируется от пятнадцати до семнадцати, причем уменьшение длины хвоста является результатом значительного уменьшения размера, а не количества позвонковых. Однако в хвосте одного вида (*M. inuus*) их количество сокращено до двух или трех; у того же вида на хвосте отсутствуют шевронные (или V-образные) кости с нижней стороны, а также отростки, к которым прикреплены мышцы, обеспечивающие его движение. У большинства макаков есть горловой мешок, который сообщается с гортанью под щитовидным хрящом и который наполняется воздухом, действуя как резонатор для их голоса.

Макаки - одни из самых распространенных обезьян Индии и островов Восточной Индии. Они встречаются также в Северной Африке (Марокко) и в Гибралтаре, по ту сторону пролива. На восток они простираются до Тибета и Северного Китая. Они также встречаются на Суматре, Яве, Борнео, Целебесе и в Тиморе, причем это самое восточное место обитания любого из *антропоидов*, за исключением *Synopithecus niger*. Доктор Блэнфорд в своей книге "Млекопитающие Британской Индии" говорит, что виды нынешнего рода похожи друг на друга по своим привычкам; они встречаются стаями, часто значительных размеров, и обычно состоят из представителей обоих полов и всех возрастов. Это активные животные,

хотя и менее проворные в своих передвижениях, будь то по деревьям или по земле, чем лангуры (*смотрите ниже*). Их пища разнообразна, большинство видов, если не все, питаются насекомыми, а также семенами, фруктами и т.д., а один вид полностью питается ракообразными. Известно, что время от времени они пожирали ящериц и, как говорят, лягушек. Все они имеют привычку запихивать пищу в свои щечные мешочки, чтобы пережевывать на досуге.... Голос и жесты всех видов (*возможно, за исключением M. silenus*) схожи и отличаются от таковых как у гиббонов, так и у лангуров. Тикелл отмечает это в своих заметках MS. Notes и приводит следующие подробности, которые заслуживают цитирования: "Гнев обычно выражается беззвучно или, самое большее, низким хриплым монотонным "Хоу", не таким гортанным, как рычание; скука и желание компании выражаются скулящим "Хом", приглашением, осуждением, мольбой, причмокиванием губами и выставлением резцов в правильной широкой ухмылке, сопровождаемой приглушенным хрюкающим смешком, очень выразительным, но не подлежащим передаче на бумаге; страх и встревоженность в виде громкого резкого крика "Кра" или "Краух", который также служит предупреждением другим, которые могут не обращать внимания на опасность. В отличие от лангуров и гиббонов, у них нет голоса, если они вызывают друг к другу".

Большинство видов очень послушны в молодости. Они хорошо развиваются, и некоторые из них размножались в условиях изоляции. Период беременности составляет около семи месяцев, при рождении, как правило, появляется только один детеныш. Взрослыми они становятся в возрасте четырех-пяти лет, но размножаются раньше.

Что касается выражения эмоций у этих обезьян, м-р Дарвин записал у разных видов, что при удовольствии они оттягивают уголки рта в подобии улыбки, краснеют, когда сердятся, и бледнеют, когда боятся.

Термин "Макака" был дан этим обезьянам Буффоном, который, однако, взял его из того, что, как предполагается, было местным названием *африканского* вида обезьян, и неправильно применил его к этой индийской группе. *Macacus* следовательно, это латинизированная форма этого слова, которая в настоящее время применяется слишком долго, чтобы ее можно было изменить.

I. БЕРБЕРИЙСКАЯ МАКАКА. *MACACUS INUUS*.

Simia inuus, Linn., Syst. Nat., i., стр. 34 (1766).

Simia sylvanus, Линн., т.н. стр. 35.

Inuus ecaudatus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 100 (1812); Грей, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 32 (1870).

Ле маго, Ф. кювье и жоффруа., Мама., livr. ii. (1819); F. Cuv., Мама., стр. 114, стр. 41.

Macacus inuus, Desmar., Mamm., стр. 67 (1820).

Inuus pithecus, Is. Geoffr., Кат. М., Приматы, стр. 31 (1851).

Macacus sylvanus, Сл., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 115 (1876).

Персонажи.—Тело короткое и коренастое, размером примерно с собаку среднего размера. Голова продолговатая, длинная, округлая и морщинистая; лицо и подбородок голые; глаза приблизительной формы, посажены глубоко под надбровными дужками; лоб небольшой; шея короткая. Уши заострены к верхнему углу спины, а их края покрыты шерстью; нос не выдающийся; ноздри - два щелевидных отверстия, сходящихся под прямым углом к

перегородке; губы тонкие, растянутые; верхняя губа широкая; мозоли менее обширные, чем у павианов; хвост снаружи незаметен; пальцы длиннее пальцев, и оба сильно покрыты шерстью. Шерсть на макушке короткая и загнутая назад; волосы на щеках, образующие усы, направлены назад; шерсть на передних конечностях направлена к локтям.

Макушка и бока головы, щеки, шея, плечи, верхняя часть спины и передняя часть передних конечностей золотисто-желтые, с примесью нескольких черных волосков, отдельные волоски темно-серые у основания, окаймленные по всей длине желтыми и серыми кольцами; остальная верхняя часть тела серовато-желтая или желтовато-коричневая; нижняя сторона челюсти, нижняя сторона тела и внутренняя поверхность конечностей серовато-желтые или желтовато-белые; темное пятно из черных волосков с желтыми кончиками у внутреннего угла каждого глаза и тянущийся книзу на щеках; обнаженные части лица, уши и мозоли бледно-телесного цвета, как и тонкошерстная кожа внутренних сторон конечностей; хвост представлен небольшим бугорком обнаженной кожи. Длина тела, 2½ фута.

Самка.— В точности напоминает самца по окраске, но немного меньше по размеру и более дружелюбна по нраву; клыки едва ли больше резцов.

Распространение.—Этот вид, названный французами "Маго", обитает в Марокко и Алжире в Северной Африке. Он встречается также на Гибралтарской скале и на некотором расстоянии вглубь Испании; но был ли он завезен из Африки или жил там с тех пор, как его предки оказались в изоляции, когда Гибралтарский пролив опустел и отделил Европу от Африки, - вопрос, который сейчас невозможно решить. Несомненно, что мавры привозят сейчас и, вероятно, на протяжении веков имели обыкновение привозить пойманные экземпляры этой обезьяны для торговли на европейской стороне; следовательно, не исключено, что "Скальные обезьяны" могли быть завезены таким образом. Это единственный африканский (или европейский) вид рода.

Привычки.—Эта обезьяна известна науке на протяжении многих веков. Как отмечает месье Фредерик Кювье в своей "Истории млекопитающих", благодаря исследованиям месье де Бленвиля, посвященным обезьяне, препарированной Галеном, теперь точно известно, что *Питек* Аристотеля был нашим Маготом, поскольку мы не знаем ни одного другого вида макака без хвоста. Берберийские макаки, находясь на земле, неизменно передвигаются на своих четырех ногах, но в неловкой манере по сравнению с их движениями при лазании; они гораздо лучше чувствуют себя на деревьях или скалах, где лазают с поразительной быстротой. Они питаются в основном плодами и листьями, питаются руками и нюхая все, в чем они не уверены, прежде чем положить это в рот. Они также очень охотно едят траву. Они водятся большими скоплениями в лесах Берберии, которые доходят до моря, и очень разрушительны для возделанных полей мавров, на которые они совершают постоянные набеги и во время которых, подобно павианам, выставляют часовых, чтобы предупредить об опасности своих друзей-добытчиков пищи. Эта обезьяна спит на боку или в сидячей позе, опустив голову между колен.

На европейской стороне Средиземного моря эти обезьяны одно время водились в большом количестве на Гибралтарской скале, но по мере того, как они грабили сады гарнизона, их убивали всеми возможными способами в течение нескольких лет, пока, в конце концов, их количество не сократилось до трех. Однако власти отдали приказ об их сохранении, и еще несколько пар были импортированы из Африки. Теперь они часто посещают недоступные выступы Скалы, особенно на ее средиземноморском склоне, по которому взбираются с поразительной быстротой.

В ответ на запросы о нынешнем состоянии берберийских обезьян (*Macacus inuus*) на Скале доктор Склейтер сообщает в 1893 году, что генерал сэр Лотиан Белл, губернатор Гибралтара, сообщил ему, "что в настоящее время их численность заметно увеличивается. Он сам насчитал до тридцати человек в одной группе, и, согласно некоторым сообщениям, на Скале их было вдвое больше. На самом деле они были так многочисленны, и их грабежи стали настолько серьезными, что некоторое время назад была поднята агитация за сокращение их численности, и, возможно, было бы необходимо немного проредить их численность, но об их истреблении не могло быть и речи, о нем и не думали".

Эти животные - удивительно любящие родители, мать постоянно ухаживает за своим единственным детенышем, в то время как самцов часто можно увидеть на руках у кого-нибудь из детенышей стаи. В молодости "Скальная обезьяна" игрива и нежна, но в старости становится злобной.

В гневе их челюсти двигаются вверх и вниз с большой скоростью, при этом они издают громкие и резкие крики. Самцы дерутся с помощью своих крепких клыков и длинных и крепких, хотя и плоских ногтей, которыми они способны наносить друг другу глубокие раны. Когда они в хорошем настроении, их голос обычно мягкий; но мистер Дарвин заметил в Зоологическом саду, что тамошний экземпляр, когда ему приятно, издает пронзительный звук и точно так же оттягивает уголки рта, очевидно, за счет сокращения тех же мышц, что и у людей. Кожа нижних век также сильно сморщилась. "В то же время оно быстро двигало нижней челюстью или губами в спазматической манере, обнажая зубы; но производимый звук был едва ли более отчетливым, чем тот, который мы называем беззвучным смехом. Двое сторожей подтвердили, что этот негромкий звук был смехом животного, и когда я выразил некоторые сомнения по поводу этой головы (будучи в то время совершенно неопытным), они заставили ее напасть или, скорее, угрожать ненавистной обезьяне *Entellus*, живущей в том же отсеке. Мгновенно все выражение лица *инородца* изменилось; рот открылся гораздо шире, клыки обнажились более полно, и раздался хриплый лающий звук".

II. БУРАЯ МАКАКА. *MACACUS ARCTOIDES*.

Macacus speciosus, F. Cuvier, Mamm., стр. xlv. (Февраль 1825 г.) (основан на рисунке).

Macacus arctoides, Is. Geoffr., Журнал зоологии., 1833, стр. 1, стр. ii.; Sclater, P. Z. S., 1872, стр. 203; Anderson, Zool. Юнь-нань, стр. 45, примечания i. и ii. (1878) с полной синонимией; Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 17 (1891); Schl., Mus. Pays-Bas, viii., стр. 116 (1876).

Папио меланотус, Огилби, P. Z. S., 1839, стр. 31.

Macacus melanotus, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз., стр. 29 (1870).

Macacus thibetanus, Alpha., Милн-Эдвардс, C. R., lxx., стр. 341 (1870).

Macacus brunneus, андерсон, P. Z. S., 1871, с. 628, 1872, с. 203, стр. xii. (Июнь), 1874, с. 652.

Персонажи. Тело короткое и крепкое; голова большая; морда короткая и усеченная; подбородок выпуклый; подбородок и горло почти обнаженные; глаза большие; уши большие и округлые, с заостренным выступом сзади; конечности короткие, крепкие и сильные; кисти и пальцы короткие, конечные фаланги голые; хвост почти рудиментарный; мозоли и окружающая область ягодич голые.

Мех длинный и пушистый (особенно у тех, кто живет на больших высотах), длиннее на голове, спине и конечностях, короче над крестцом; шерсть на голове разделена пробором от

центра наружу; пальцы слегка опушены; хвост тонкоопушенный или голый у старых животных. У особей, обитающих в суровых районах Восточного Тибета, хвост покрыт густой шерстью.

Общий окрас темно-коричневый или черноватый; щеки, нижняя сторона тела, внутренние стороны рук и ног более бледные, с желтоватым оттенком, волосы обрамлены очень плотными кольцами (у одних более отчетливо, чем у других) на двух третях их внешней поверхности с чередующимися золотисто-желтыми и коричневыми кольцами, их концевые точки темно-коричневые. Лицо, уши, субкаудальные мозоли, ярко-красноватого телесного цвета, более глубокие круги вокруг глаз. Длина тела 15-24 дюйма; хвоста 1/2-2 дюйма.

У детенышей мех светлее. При первом рождении он чисто однородного коричневого цвета, с возрастом появляются кольца, количество которых увеличивается.

У молодой особи с острова Борней бока, брюшко и ноги светло-каштанового цвета; кончики многих волосков золотистые, которые с возрастом все больше становятся черновато-коричневыми. Хвост длиной 3½ дюйма и чрезвычайно тонкий на последних двух третях своей длины — часть, которую легко потерять в неволе.

Язык с многочисленными сосочками железистых крипт для смазывания щечных мешочков. Горловой мешочек, расположенный в углублении подъязычной кости, продолжающийся схождением голосовых связок.

Череп с сильными выступающими внутрь надглазничными отростками; внешнее отверстие для ноздрей треугольное. Первыми появляются передние верхние резцы, за ними следуют передний моляр, средний моляр, средний предмоляр, а затем клыки; передний моляр четырехзубый; передний нижний моляр пятизубый. Хвостовых позвоночных одиннадцать.

Распространение.—Мупин на северо-западе Китая, обитающий в заснеженных горах; Верхняя Бирма (Бахмо); Сиам; горный регион Качар и Качин на западной границе провинции Юньнань, Китай; Северо-западное Борнео, на материке напротив Лабуана. Этот вид был зарегистрирован, но ошибочно, в Мадрасе, куда образцы завезены из Бирмы или с Малайских островов.

Доктор Джон Андерсон, выдающийся натуралист экспедиции Юнь-нань, делает следующие интересные замечания относительно распространения этого вида: "*M. arctoides*, по-видимому, имеет значительный диапазон распространения, в котором, однако, он соответствует тому, что отличает большую серию форм млекопитающих, встречающихся в том же регионе. Он был добыт в Кашаре, и я узнал о его существовании в Верхнем Ассаме, и раздобыл его живым в горах Качин на границе Юньнана, за пределами которой он распространяется на юго-восток Кочин-Китая. По-видимому, это, по сути, холм или горная форма, встречающаяся только в горных районах Кашара, отсутствующая в долине Иравади, но простирающаяся вокруг нее в Юньнань от Верхнего Ассамы, несомненно, распространенная по горному региону, который находится между Иравади и Кочинхиной-Китая".

Привычки.—Об этой макаке мало что известно в диком состоянии. Однако она очень послушна и нежна в неволе. В жизни хвост редко держится вертикально и, как правило, прижат к заднему проходу; его последняя четверть загибается влево и служит для заполнения промежутка между расходящимися частями мозолей, так что животное сидит на этой части своего хвоста, которая содержит лишь несколько зачатков позвоночных у

основания, а верхняя поверхность которого грубая и несколько мозолистая.... Здесь мы имеем дело с обезьяной, которая сидит у себя на хвосте, и хотя, возможно, она делает это не всегда, после тщательного наблюдения я готов заявить, что она делает это очень часто; и этому наблюдению следует придавать большее значение, потому что эта привычка, по-видимому, является особенностью вида. (Андерсон.)

III. РЫЖЕВАТАЯ КОРОТКОХВОСТАЯ МАКАКА. *MACACUS RUFESCENS*.

Macacus rufescens, Андерсон, P. Z. S., 1872, стр. 204 (Юв.); id., Зоол. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 79 (1878); Сл., P. Z. S., 1872, стр. 495, стр. xxiv.; 1873, стр. 194.

Macacus arctoides, Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 116 (1876; часть).

Персонажи.—Очень близкий родственник *M. arctoides*, из которых это, возможно, только южная раса. Морда красная, более блестящая вокруг глазниц; нос и губы коричневатые; хвост короткий, тонкошерстный. мех довольно блестящий, кирпично-красный, особенно на щеках, боках и внешней стороне конечностей. Однако это животное известно только по молодым экземплярам.

Распространение.—Малайский полуостров.

IV. БОЛОТНАЯ МАКАКА. *MACACUS MAURUS*.

Macacus maurus, Ф. Кювье, Мамм., стр. xlv. (Аврил, 1823); Андерсон, Зоол. Доп. Юньнань, стр. 80 (1878, pt.; с полной синонимией); Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 117 (1876).

Cynocephalus niger (?), Обычный и древний, Вой. de l'Astrol., Zool, i., стр. 67 (1830).

Macacus arctoides, Is. Geoffr., зоол. Bélange. Вой., стр. 61 (1834); id., арх. Мус., ii., стр. 573.

Macacus ocreatus, Огилби, P. Z. S., 1840, стр. 56; Склейте, у Волка, Зоол. Эскизы, ii., стр. i. (1865); id., P. Z. S., 1860, стр. 420, стр. lxxxii.; Anderson, t.c., стр. 81 (pt).

Macacus fusco-ater, Schinz, Syn. Mamm. i., стр. 58 (1844).

Macacus inornatus, Серый, P. Z. S., 1866, стр. 202, стр. xix.; id., Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 129 (1870).

Персонажи. Морда узкая и удлиненная, обнаженная, за исключением нескольких коротких волосков на верхней губе; нос плоский; уши довольно длинные, округлые, тонкошерстные; волосы на одной стороне головы образуют несколько крупных усов; пах, область снаружи от мозолей и вниз по бедрам тонкошерстные; хвост очень короткий, обнаженный, загнутый вверх; лобная полоса, лицо и уши черные; мозоли и окружающие их части тонкошерстные; область ягодиц телесного цвета; волосы на верхней губе черные; пучки усов черные с сероватыми кончиками; остальная часть головы и тела угольно—черная; нижняя сторона шеи, крестец, нижняя поверхность тела, внутренняя сторона конечностей, передние конечности, голени и задняя сторона бедер серые; хвост черный. Длина тела - 21 дюйм; хвоста - 1 дюйм.

Молодые.—Серовато-черный.

В черепе внешняя поверхность внешнего края орбит уплощена; носовые кости короткие и расширенные.

Этот вид отличается от *M. arctoides* и *M. fuscatus* черным цветом лица, а не ярко-красным.

Распространение.—Достоверно установлено, что этот вид, истинная родина которого долгое время была неизвестна, но предполагалось, что им является Борнео, ограничен южным полуостровом Целебес и соседним островом Бутон. Доктор Андерсон говорит об обезьяне с островов Ару, далеко к востоку от Целебеса, "если и не идентичной с *M. taurus*, то, по крайней мере, настолько близкой к ней, что я не решаюсь отделить ее". Образцы как с Борнео, так и с Ару, если они действительно привезены с этих островов, должны были быть доставлены туда в торговом потоке с Целебеса на восток в первую очередь.

Против ЯПОНСКОЙ МАКАКИ. *MACACUS FUSCATUS*.

Macacus speciosus, F. Cuv., Mammif., стр. 46 (1825); Murie, P. Z. S., 1872, стр. 780; Sclater, P. Z. S., 1875, стр. 418, стр. xlvii.; Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 114 (1876)

Inuus speciosus (некр. F. Cuv.), темм., фавн. япон. зоол. М., стр. 9, стр. i, рис. 1-8; стр. ii, рис. 1-6 (1847); Грей, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 32 (1870).

Macacus fuscatus, Blyth, J. A. S. Beng., xlv., дополнительный номер, стр. 6 (1875); Склейте, P. Z. S., 1876, стр. 332; Андерсон, Зоол. Дополнение. Юнь-нань, стр. 78 (1878; с полной синонимией).

Персонажи.Морда обнаженная, вытянутая вперед; морда выпуклая; надбровные дуги нависают над глазами; брови сходятся на средней линии; полоска над глазами на лбу лысая, за исключением нескольких очень коротких волосков; мех в целом длинный, мягкий, шелковистый и густой; короткие волоски, образующие нечто вроде усов на щеках, переходящие в шерсть на голове и умеренно длинную бороду; живот, грудь и внутренняя поверхность конечностей тонкошерстные; уши большие и, за исключением краев, покрыты длинными шелковистыми волосками; хвост короткий, в равной степени покрытый длинными волосками, а с верхушечным пучком, варьирующимся от 2-3 дюймов в длину. Длина тела - 24 дюйма. Лицо при жизни интенсивно красное, с пурпурным оттенком; нос и нижняя губа окрашены в коричневый цвет; мозоли и обнаженные части области мошонки пурпурно-красные; редкие волосы на лице темно-коричневые; общий цвет меха темно-коричневый, или желтовато-коричневый, или оливковый, наиболее темный вдоль середины спины, волосы обрамлены желто-коричневыми или черно-коричневыми кольцами; бока головы, груди, нижняя поверхность тела, под боками конечностей и под хвостом сероватые; борода желтовато-коричневая.

У молодого животного шерсть не кольцевидная.

Распространение.-Япония. Распространен на холмах Киото, по словам мистера Гауэра, который был консулом Х.Б.М. в Хиого в 1875 г. Доктор Дж. Рейн сообщает, что он встречается по всему острову Ниппон до 41 ° северной широты и, следовательно, имеет более северное место обитания, чем любая другая существующая обезьяна.

Привычки.О повадках японской макаки ничего не известно, но они, по всей вероятности, сходны с повадками ее индийских родственников.

VI. ЛЬВИНАЯ МАКАКА. *MACACUS LEONINUS*.

Macacus leoninus, Блит, Кошка. Mamm. Mus. A. S. Beng., стр. 7 (1863); Склейте, P. Z. S., 1870, стр. 663, стр. xxxv. (мужчина и женщина); Андерсон, Зоол. Ускоритель. Юн-нань, стр. 52 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind. Mamm., стр. 18, рис. 6 (1891).

Macacus andamanensis, Бартлетт, *Земля и вода*, viii., стр. 57 (1869); P. Z. S., 1869, стр. 467.

Inuus leoninus, Блит, J. A. S. Beng., xlv., стр. 2 (1875).

Персонажи. Коренастое, коротконогое, немного похожее на собаку животное; голова широкая, плоская сверху; морда короткая; хвост короткий, закинут за спину, составляет примерно одну треть длины тела.

Верхняя поверхность головы покрыта короткой шерстью, расходящейся от макушки, "окружена спереди и с обеих сторон гребнем в форме подковы, надглазничная часть которого состоит из очень жестких волос". (Блэнфорд.) Лицо густо покрыто тонкими волосками; по бокам лица расположены направленные назад усы, сходящиеся ниже подбородка. Шерсть на задней стороне шеи, плечах и верхней части передних конечностей длинная, короче за плечами и самая короткая на крупе; ягодицы негусто опушены; хвост несколько хохолок; живот, верхняя и внутренняя части конечностей тонкоопушены. Длина 23 дюйма; хвост (без хохолка) 8 дюймов.

Самец. Морда коричневато—телесного цвета на морде и между глазами, голубовато-белая вокруг последних; лобная полоса белая; узкая линия от внешнего уголка глаза назад красная; гребень в форме подковы, средняя линия спины, поясница, крестцовая область и верхняя поверхность хвоста черные, волосы седые у основания и темно-коричневые или черные вдоль их внешней части; уши телесного цвета, а волосы на них и вокруг них белые; область над глазами и вокруг лица, подбородка и горла желтовато-коричневые - волосы белые. кольчатые, над серыми основаниями, темно-коричневые и оранжевые, с черными кончиками; на плечах, задней части шеи и верхней части рук оранжево-оливковые - в шерсти преобладают оранжевые кольца, а не коричневые; остальная часть передней конечности желтовато—оливковая; бедра темно—серые с черным отливом; ягодицы серые; нижние части тела, внутренние стороны конечностей и нижняя сторона хвоста светло-серовато-коричневые; хвостовой хохолок часто ярко-рыжий. За исключением головы, поясницы, хвоста и ягодиц, все волосы кольцевидные, над их серыми основаниями оранжевые и коричневые, с темными кончиками. Руки и ноги темно-телесного цвета.

Самка.— Мельче самцов, но черная часть головы и спины отсутствует, а волосы на нижней части тела не кольцевидные; плечи светлее остального тела, желтовато-оливковые, а на внешней стороне конечностей серовато-оливковые.

Самец.—Череп меньше, короче и более шаровидный, чем у *M. nemestrinus*, который является его ближайшим союзником; морда менее выступает; углубление между глазами небольшое или вообще отсутствует; надорбитальные выступы выступают; орбиты большие, округлые; череп самки слабее во всех отношениях.

Распространение.— Южная часть Арракана и долина Иравади в Верхней Бирме. Андаманские острова, откуда мистер Бартлетт описал образец как новый вид, были ошибочным местом обитания, поскольку образец был завезен туда из Бирмы.

Привычки.—Об этом редком виде в его естественном состоянии известно очень мало. В неволе самки и самцы, будучи молодыми, становятся очень ручными и способны обучаться различным приемам. Самка, жившая в Садах Зоологического общества в 1869 году, была воспитана синими куртками одного из кораблей Ее Величества, которые выбрали ее на Андаманских островах и держали на борту три или четыре года, прежде чем ее отправили в Сады. "Дженни" проявила необычайную сообразительность, как рассказывал мистер

Бартлетт, суперинтендант, в "Земле и воде". Она могла пить из бутылки и курить трубку. Она ходила на задних лапах с поразительной легкостью и с гораздо меньшими усилиями, чем даже дрессированные обезьяны на лондонских улицах. В вертикальном положении она несла вещи.

VII. МАКАКА С КОСИЧКАМИ. *MACACUS NEMESTRINUS*.

Обезьяна неместрина, Linn., Sist. Nat., i., стр. 35 (1766).

Ле Маймон, Аудеб., Хист. Нац. Сингес, Семья ii., раздел i., стр. i. (1797).

Inuus nemestrinus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 101 (1812).

Macacus nemestrinus, Ф. Кювье, История. Нац. Мамм, ливр. xlii. (1820); ливр. xliv. (1822); Серый, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 29 (1870); Шл., Муз. Пайбас, vii., стр. 110 (1876); Андерсон, Зоол. Экспед. Юнь-нань, стр. 77 (1878; с полной синонимией).

Характеры.—Самец.—Крупного размера, даже приближающийся к "мастифу хороших размеров". (Андерсон.) Тело короткое и широкогрудое; голова приплюснутая; морда длинная и напоминает Бабуино; надглазничные гребни большие; конечности длинные и мощные; хвост тонкий, примерно треть длины тела, заостренный и держится прямо; лицо, уши и мозоли обнажены; иногда короткая перепонка, объединяющая первые фаланги переднего и среднего пальцев, а также второго и третьего пальцев.

Мех короткий, длиннее на плечах; на макушке головы, расходящийся от центра, короткий, прямой и обильный; шерсть ниже и на хвосте менее обильная, на животе очень редкая.

В черепе выступающая лицевая область пропорционально намного больше черепной области; глазницы большие и почти круглые.

Морда темно-телесного цвета; уши и мозоли такие же; общий цвет меха оливковый, волосы у основания серые, выше обрамлены чередующимися черными и желтыми полосами, преобладание одной полосы над другой придает окраске более яркий оливковый, даже желтый или темно-коричневый оттенок; макушка головы темно-коричневая или коричневаточерная, тянется вдоль середины спины, расширяется на крупе и прикорневой части хвоста. Бока лица черновато-серые; нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей серовато-белые; руки и ноги светлее спины; внешняя поверхность бедер оливково-серая; кисти и ступни оливково-коричневые.

Длина тела 18 с половиной дюймов; хвоста 8 дюймов.

Самки.— Похожи на самцов; детеныши обоих полов окрашены ярче, чем взрослые особи. Беременность у макаки с косичками длится, по словам доктора Блэнфорда, семь месяцев и двадцать дней. Уникальная разновидность самки из реки Барам в Сараваке, Борнео, имеет темно-красную окраску сверху, более темную по мезиальной линии, намного бледнее на нижней поверхности и становится почти белой в середине груди.

Распространение. Тенассерим, и главным образом в южных частях этой провинции; Южная Бирма, Малайский полуостров, Бангка, Суматра, Ява и Борнео.

Привычки.— Свинохвостая макака обитает в густых джунглях в нижней части страны, живя большими компаниями и питаясь фруктами, семенами и насекомыми. "В молодом возрасте этих обезьян легко приручить, - пишет м-р Чарльз Хоуз, - и в некоторых местах их используют для лазания по кокосовым деревьям, чтобы сбрасывать орехи, поскольку обезьян научили бросать только спелые". Это наблюдение относительно сбора какао-орехов было также сделано много лет назад сэром Стэмфордом Раффлзом на Суматре. В старости самцы становятся очень свирепыми и нападают на Собаку, если их спровоцировать.

VIII. ЛЬВИНОХВОСТАЯ МАКАКА. *MACACUS SILENUS*.

Симия силенус, Linn., Sist. Nat., i., стр. 35 (1766); Шребер, Säugeth., i., стр. 87, pl. xi. (1775).

Cercopithecus veter, Erxl., Sist. Regn. An., стр. 24 (1777).

Симия ферокс, Шоу, генерал. Зоол., i., стр. 30, стр. xvi. (1800).

Раро silenus, Geoffr., Ann. Mus., xix., p. 102 (1812); Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 18 (1820).

Macacus silenus, Desm., Mamm., стр. 63 (1820); Anders., Зоол. Ускоритель. Юнь-нань, стр. 93 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., мама., стр. 16, рис. 5; Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 109 (1876).

Силен ветер, Серый, Кот. Обезьяны, брит. Муз., стр. 32 (1870).

Персонажи. Голова круглая; морда широкая; шерсть на макушке очень короткая; лицо окружено длинными волосами, скрывающими уши и сходящимися под подбородком; уши голые; лицо, кисти, ступни и мозоли голые; хвост тонкий, от половины до трех четвертей длины тела и покрыт волосным хохолком. Длина 24 дюйма; хвост 10 дюймов.

Череп округлый; морда широкая спереди, суженная у основания, вогнутая под глазницами; глазничные выступы большие, а лобная кость сильно вдавлена за ними; предмолары и коренные зубы маленькие. Строение этого животного по существу аналогично строению обычных макак, хотя оно сильно отличается от них по внешней физиономии. (Андерсон).

Тело, конечности и хвост темно-черные; пучок длинных волос вокруг головы темно-серый; грудь сероватая или белая; кончик хвоста сероватый или белый; лицо, кисти и ступни черные; мозоли телесного цвета.

Распространение.— "Львинохвостая макака обитает в Западных Гатах от подножия Гоа до мыса Коморин, но нет достоверных свидетельств о ее существовании в диком состоянии на Цейлоне". (Андерсон.) Обитает на значительной высоте над морем.

Привычки. Этот вид, по словам Джердона (которому, как отмечает доктор Блэнфорд, мы обязаны единственным достоверным описанием этого животного в диком состоянии), населяет самые густые и редкие леса на холмах близ Малабарского побережья стадами от двенадцати до двадцати и более особей. Она застенчива и настороженна. В неволе она угрюмая и дикая, и ее нелегко обучить. Говорят, что зов самца напоминает голос Мужчины.

IX. ГИМАЛАЙСКАЯ МАКАКА. *MACACUS ASSAMENSIS*.

Macacus assamensis, Макклелл.; Хорсфилд, P. Z. S., 1839, с. 148; Блит, Дж. А. Сок. Бенг., xiii., стр. 746 (1844); Андерсон, Зоол. Опыт. Юньнань, стр. 64 (1878; с синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., М., стр. 15 (1888).

Macacus pelops, Hodgs., J. A. S., Beng., ix., стр. 1213 (1840); Серый, Кат. Обезьяны, Брит. Муз., стр. 30 (1870).

Macacus problematicus, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз., стр. 128 (1870); Склейте, P. Z. S., 1871, стр. 222.

Macacus rheso-similis, Scl., P. Z. S., 1872, стр. 495, стр. xxv. (Юв.)

Macacus erythræus, Сл., Муз. Pays-Bas., vii, стр. 112, 1876; (часть).

Персонажи.—Крупнее и крепче сложены, чем *M. rhesus*. мех умеренно длинный, волнистый, пушистый (у некоторых особей) и без колец; шерсть на макушке расходится от центра лба кнаружи и назад; шерсть вокруг лица и на подбородке довольно длинная; шерсть на плечах и между ними, а также по бокам груди длиннее, чем на задней части тела; шерсть на нижней части боков довольно длинная; хвост примерно или менее половины длины тела, без хохолка, но длиннее, мельче и покрыт гораздо менее густым мехом, чем у *M. rhesus*; мозоли, окруженные шерстью; уши с хохолками и опушены изнутри; борода хорошо развита; лицо и уши темного цвета. Длина 26½ дюйма; хвост 9¼ дюйма.

Мех сверху отличается от такового у *M. rhesus* тем, что передняя половина однородного темно-коричневого цвета с отсутствием пепельно-серого оттенка; а задняя часть коричневая, без рыжины, характерной для *M. rhesus*; внешняя сторона передних конечностей, задняя часть шеи и область между лопатками коричневые с желтоватым или золотистым оттенком; верхняя поверхность головы бледно-желтовато-коричневая; бока, передняя часть передних конечностей, внешняя сторона бедер, задняя часть лап и хвост темнее; нижняя поверхность туловища и внутренняя сторона конечностей желтовато-серая или серовато-желтая; за уголками рта, ниже и за ушами, а также на подбородке волосы желтовато-серые, с черными кончиками; лицо и мозоли бледно-телесного цвета.

Череп и скелет очень похожи на таковые у *M. rhesus*, но несколько крупнее. Клыки длинные, с глубокими бороздками спереди.

Распространение.—Эта макака обитает в гималайских хребтах вплоть до Масури на запад или, возможно, дальше, от подножия холмов до значительной возвышенности (*Блэнфорд*); она простирается на восток от непальского региона Гималаев через Ассам и северо-восточную часть Бенгалии до верхней или холмистой части долины Иравади. (*Андерсон*.) Говорят, что этот вид обычно обитает на высоте от 3000 до 6000 футов над уровнем моря. Доктор Андерсон обнаружил на Иравади, в 25 милях ниже Бхамо, самку из большой колонии, "живущую под огромным известняковым утесом, облицованным дэвами, у подножия которого находится маленькая пагода Сессунган. Экипажи проплывающих мимо лодок и благочестивые посетители обычно бросают этим обезьянам рис и фрукты в знак благодарности".

Привычки.—Этот вид, вероятно, представляет гимало-бирманскую расу или подвида *M. rhesus*. Его повадки во многом такие же, как у представителей этого вида, но, по словам Блэнфорда, у него немного другой голос и он более вялый.

Х. БЕНГАЛЬСКАЯ МАКАКА. МАКАК-РЕЗУС.

Обезьяна-резус, вар. Аудеб., Хист. нац. Сингес, Фам. ii., разд. i., стр. 5, pl. i. (1797).

Simia erythræa, Шребер, Согет, Дополнение, стр. 8, рис. в.

Macacus erythræus, Кюв., Hist. Nat., Mamm., стр. xxxviii. (янг; октябрь 1819 г.); пожалуйста. xxxix. (1821) и xl. (1825; мужчина); Герв., Hist. Nat., Mamm., стр. 91 (рис. ♂ и ♀; главы; 1834); Суинхо, P. Z. S., 1870, с. 226; Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 112 (1876).

Macacus rhesus, Десм., Мамм., стр. 66, стр. vii, рис. 2 (1820); Андерс., Зоол. Ускоритель. Юньнань, стр. 55, стр. iii. (с синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., Мамм., стр. 13.

Персонажи. Тело коренастое, с мощными конечностями; лицо длинное и узкое, морда несколько выступающая; несколько коротких и жестких волосков на губах, подбородке и щеках; глаза довольно овальной формы; уши несколько большие и покрыты редкой шерстью. Мех умеренно длинный и прямой; шерсть на голове грубая, не расходящаяся, начинающаяся на глазничном гребне, покрывающая лоб, и направленная назад; пальцы рук покрыты шерстью до кончиков первых пальцев; ногти скорее когтистые; пальцы ног покрыты шерстью; мозоли, окруженные полуобнаженной частью ягодиц; хвост сужающийся, почти на половину длины тела. Длина самцов 22 дюйма, с хвостом 10 дюймов; самок 16-18 дюймов, с хвостом 7-8 дюймов, шерсть выступает на 1½ дюйма за пределы позвоночного столба.

Морда телесного цвета, покрыта короткой, шелковистой шерстью светло-желтого цвета; общая окраска шерсти на передней и верхней поверхности туловища и рук серовато-коричневая, волосы у основания пепельные, окаймлены желтоватыми или светло-коричневыми кольцами, а на кончиках темно-коричневые или даже черные, что придает им насыщенный рыжевато-желтый или даже черный оттенок, что придает им насыщенный рыжевато-желтый оттенок; задняя часть и внешняя сторона бедер рыжевато-желтые, волосы заканчиваются этим цветом; нижние части бледно-желтовато-белые или бледно-рыжевато-желтые; основание хвост желтовато-каштановый, остальная часть более коричневая; мозоли телесного цвета; глаза желтовато-коричневые.

Распространение. Бенгальская обезьяна в изобилии распространена по всей Северной Индии вплоть до реки Годавери на юге с одной стороны и Бомбея с другой, и долгое время считалась характерным видом Бенгалии и Верхней Индии. Однако, как отмечает доктор Андерсон, это происходит в долинах горных систем к северу и востоку от Акьяба, и может быть прослежено по всему горному хребту, отделяющему Арракан от Бирмы, а также далеко на восток, до левого берега Иравади ниже Мандалая. Он был получен в Ассаме и доктором Андерсоном в Юньнани во время экспедиции в эту страну. Говорят, что в Кашмире она поднимается на высоту 10 000 футов. Мистер Свинхоу добыл эту обезьяну также на Хайнани и в провинции Киунг Чоу в Китае.

Привычки. Бенгальская макака, или бандар, как ее называют индусы, живет группами значительного размера в джунглях или низколесье, и очень часто в скалистых местах, питаясь насекомыми, плодами и листьями. По словам доктора Блэнфорда, его очень часто можно увидеть на земле в поисках пищи, а также вблизи сельскохозяйственных угодий, особенно вокруг резервуаров или среди деревьев на берегах ручьев. Он хорошо плавает и охотно ныряет в воду. Это очень сварливый вид, постоянно кричащий и дерущийся. Если это и не действительно священный вид для индусов, то, по крайней мере, они редко его домогаются. Доктор Боудлер Шарп сообщает настоящему автору, что он наблюдал стаю этих макак по дороге в Симлу, когда приближался к последнему месту. Они бежали по дороге, и когда "тонга" приблизилась, они вскарабкались на камни и громко залопотали, особенно самки, которые вынашивали своих детенышей. В 1885 году на Джако была большая стая этих животных, и они нанесли значительный ущерб огородам горных резиденций, так что садовникам приходилось быть настороже и время от времени стрелять в них. Когда он останавливался в прекрасном доме мистера Хьюма в Симле в 1885 году, часто приходилось

отгонять обезьян, и так как одна или две были ранены старшим садовником, факир, живший на вершине Джако, был очень обижен. Этот человек приручил обезьян до такой степени, что, когда он позвал их, деревья мгновенно начали двигаться во всех направлениях при приближении множества этих животных, спешащих к нему за горохом, который он приготовил для них. Они столпились вокруг него и, хотя не позволяли незнакомцам гладить себя, подошли на расстояние вытянутой руки и взяли свою еду. Одного патриарха, который оставался еще некоторое время после того, как племя скрылось в деревьях, звали "Субадар", и у него был довольно почтенный вид. М-р Р. Суинхо в "Трудах Лондонского зоологического общества" привел следующие любопытные китайские наблюдения, извлеченные из "Китайского справочника", в отношении этого вида, который часто называют хайнаньской скальной обезьяной: "Как (или Обезьяна). В She-Show ("Заметки о животных") говорится, что у Обезьяны нет желудка, но она переваривает пищу, прыгая вокруг. Согласно древним авторам, Киунг-Чау изобилует обезьянами, и его жители занимаются торговлей, продавая детенышей".

"В джунглях Нихоу (Южный Хайнань) эти обезьяны, - говорит м-р Суинхо, - были очень распространены. Высадившись на берег рядом с кораблем, мы увидели их большую группу на пляже, но они сразу же удалились в рощу выше отметки прилива. Мы наблюдали, как они бегают по ветвям деревьев и перепрыгивают с ветки на ветку. Выстрел из охотничьего ружья вскоре заставил их юркнуть в чащу, но время от времени их головы появлялись из более высоких кустов, наблюдая за передвижениями врага. Наконец, когда они заметили, что наше присутствие сопряжено с реальной опасностью для них самих, они взобрались на холмы и расположились около приметных скал, где болтали и хрюкали, спасаясь от опасности. Их крики очень похожи на крики *Macacus cyclopis* с Формозы".

Детеныш прижимается к животу матери примерно на две недели после рождения, и она ухаживает за ним с величайшей заботой; по истечении этого времени он способен передвигаться самостоятельно и с тех пор быстро начинает в полной мере использовать свои силы.

Мистер Дарвин отмечает, что лицо *М. резуса*, когда он сильно разгневан, становится красным. Наблюдая за этим видом в Зоологическом саду, он говорит: "Другая обезьяна напала на резуса, и я увидел, как ее лицо покраснело так же отчетливо, как у Человека в ярости. В течение нескольких минут после битвы лицо этой Обезьяны восстановило свой естественный оттенок. В то же время, когда покраснело лицо, обнаженная задняя часть тела, которая всегда красная, казалось, стала еще краснее, но я не могу с уверенностью утверждать, что это было так".

XI. ВОЛОСАТОУХАЯ МАКАКА. *MACACUS LASIOTIS*.

Macacus lasiotis, Серый, P. Z. S., 1868, стр. 61, стр. vi.; id., Кат. Обезьяны, Брит. Муз., стр. 129 (1870); Андерс., Зоол. Экспед. Юнь-нань, стр. 83 (1878; с синонимией).

Macacus rhesus, Склэйтер, P. Z. S., 1871, стр. 222.

Macacus erythræus (некр.), Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 112 (1876).

Персонажи.—Очень близок к *макаку-резусу*, от которого отличается более крупными размерами, более волосатыми ушами и более насыщенно окрашенным мехом, в котором желтые кольца имеют насыщенно-оранжевый или кирпично-красный цвет, особенно на задних конечностях.

Мех длинный, тонкий и шелковистый, самый длинный на плечах, шее и верхней поверхности лап; шерсть на макушке головы не лучеобразная; уши волосатые; мозоли, окруженные шерстью; голое красное пятно у внешнего угла глаз; хвост длиной около одной четвертой части тела.

Самец. Темно-насыщенный оливково-желтый; морда бледно-телесного цвета; бока морды, шея и передняя часть тела оливково-серые; задние части тела кирпично-красные; сланцевый цвет передних конечностей и передней поверхности ног становится черным на кистях и ступнях; уши телесного цвета; мозоли малиновые; горло, грудь и внутренняя сторона передних конечностей сероватые, с рыжиной над запястьями; живот и внутренняя сторона задних конечностей сероватые, с оранжево-красным оттенком.

Женский. — Палевый окрас с рыжиной, особенно на нижней части спины. Морда окрашена ярче, чем у самцов. Хвост составляет одну четвертую длины тела.

Череп более массивный, короткий, заметно шире и с более вертикальной мордой, чем у *M. rhesus*.

Распространение. — Провинция Сычуань, Западный Китай: горы Дюпле, 13 000 футов. (*Бонвало*.)

Привычки. — Мало что известно о повадках этого китайского представителя Бенгальской макаки. Зимой, как говорят, у него великолепная шерсть насыщенного коричневого цвета, очень длинная и густая. Он очень свирепый и мощный.

XII. МАКАКА ЧЕЛИ. *MACACUS TCHELIENSIS*.

Macacus tcheliensis, Милн Эдвардс, Речь. Мамм., стр. 227, pls. xxxii. и xxxiii. (1868-1874); А. Дэвид, журнал. Северо-Китайское отделение As. Soc., 1873, стр. 230.

Macacus rhesus (nec Audeb.), Scl., P. Z. S., 1871, стр. 222.

Macacus erythræus, Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 112 (1876).

Macacus lasiotis, андерсон, Зоол. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 83 (1878 гт.).

Персонажи. — *The Macacus tcheliensis* — еще один вид, имеющий очень близкое родство с *M. rhesus* и с *M. lasiotis*. Доктор Андерсон, действительно, объединил чели и волосатоухих макак под одним видом; в то время как доктор Склейте не готов рассматривать ни одну из них, ни *M. cyclopis* в дополнение, как нечто отличное от *M. rhesus*.

У *M. tcheliensis* хвост длиной всего с заднюю лапу и густо покрыт длинной шерстью. Мех довольно длинный, мягкий и шелковистый, и более густой, чем у обычного *M. rhesus*. Общий окрас ярко-рыжевато-палевый, особенно на задней части спины и на хвосте; бока щек и плечи сероватые, желтые кольца шерсти отсутствуют; нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей серые; кисти и ступни серовато-палевые.

Череп *M. lasiotis* и *M. tcheliensis* практически не отличаются друг от друга.

Распространение. Северный Китай. Доктор Бушелл из Миссии Его Величества в Пекине, который первым отправил эту редкую обезьяну в Европу, пишет в письме от 17 января 1880 г.: "Она была получена мной в горах близ Юнг-линга, или Восточного мавзолея, правящей династии Маньчжуров, расположенного примерно в 70 ли от Пекина, на 40 ° Северной широты. Он покрыт густым мехом, приспособленным для того, чтобы выдержать суровую зиму в этой части Северного Китая, где столбик термометра часто опускается до 10 ° ниже нуля".

Привычки.—О повадках этой макаки в естественном состоянии пока ничего не зарегистрировано.

XIII. МАКАКА СВЯТОГО ИОАННА. *MACACUS SANCTI-JOHANNIS*.

(Фото XXVI.)

Inuus sancti-johannis, Сунхо, P. Z. S., 1866, стр. 556.

Macacus sancti-johannis, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз. Приложение., стр. 129 (1870; частично); Склейте, P. Z. S., 1871, стр. 222; Андерсон, Зоол. Экспед. Юнь-нань, стр. 86 (1878).

Макака-резус, pt. Склейте, P. Z. S., 1871, с. 222.

Macacus erythræus, pt. Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 112 (1876).

Персонажи.—Мужчина неизвестен.

Молодая самка.— По-видимому, наиболее близка к *M. lasiotis*. Морда узкая и несколько выступающая; глаза ярко-карие; морда и уши телесного цвета; черный, похожий на усы хохолок на обеих щеках; кожа верхней части тела окрашена в голубой цвет и редко покрыта светло-серыми волосками; шерсть на животе светло-коричневого цвета; мех верхней части тела серовато-коричневый, с оттенком охры, который светлее на голове и кирпично-рыжий вокруг крестца. Хвост длиной 4 с половиной дюйма, черноватый; мозоли телесного цвета. (Свинхое.)

Распространение.—Китай; остров Северная Лена и большинство небольших островов недалеко от Гонконга.

Привычки.—О повадках макаки Сент-Джонса ничего не известно. "Высушенные тела этого животного, - пишет мистер Свинхоу, описывающий его, - разделенные надвое, часто выставляются подвешенными к потолку в аптеках Кантона и Гонконга; а его кости используются в медицинских целях".

XIV. ФОРМОЗАНСКАЯ СКАЛЬНАЯ МАКАКА. *MACACUS CYCLOPIS*.

Macacus cyclopis, Swinh., P. Z. S., 1862, стр. 353, pl. xiii., 1864, стр. 380; Склейте, P. Z. S., 1864, стр. 711 (гравюра на дереве); Андерсон, Зоол. Дополнение. Юнь-нань, стр. 87 (1878; с синонимией).

Macacus sancti-johannis, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз. Приложение., стр. 129 (1870; частично); Scl., P. Z. S., 1871, стр. 222.

Macacus rhesus, Scl., P. Z. S., 1871, стр. 222.

Macacus erythræus, pt. Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 112 (1876).

Персонажи.—Родственны *M. rhesus*, но голова круглая; лицо плоское и округлое; надорбитальная область голая, как у других видов; щеки с темными бакенбардами; уши маленькие и покрытые шерстью; сильная борода, похожая на ерш; хвост толстый, густо покрытый шерстью и хохолком, длиной 12 дюймов. Мех густой и пушистый; шерсть за пастью, а также ниже и за ушами обрамлена кольцами; на плечах шерсть не длиннее, чем на остальном теле.

Общий окрас оливково-серый или сланцеватый; шерсть мелко усыпана желтыми веснушками; на нижней части спины и задних конечностях нет рыжего налета; ноги темные, а на вершине хвоста отчетливая черная линия.

Особенности головы, морды, усов, бороды и толстого хвоста, а также отсутствие рыжевато-окраса отличают его от *M. rhesus*. *M. assamensis* краснее, чем *M. rhesus* или *M. cyclopis*, и имеет длинную голову, выступающую морду и короткий хвост.

Самка.— Мельче и несколько светлее окрашена, чем самец. В период любви обнаженные задние части тела, включая бедра и хвост, становятся чрезмерно раздутыми и краснеющими.

Распространение.—Остров Формоза, где это единственный известный вид обезьян.

Привычки.—Покойный консул Суинхо был первооткрывателем этого интересного животного. Он дал отчет о ее повадках в "Трудах Зоологического общества", из которого мы цитируем следующее: "Формозанская скальная макака обитает на скалах и откосах, нависающих над морем, и в уединенных пещерах устраивает себе пристанище. На безлесной горе на юго-западе, называемой Обезьяньим холмом, когда-то его было особенно много, но с тех пор он почти полностью исчез. В горах севера и востока он по-прежнему многочислен, его часто можно увидеть играющим и болтающим среди отвесных скал, за много миль от любого дерева. Это, по-видимому, довольно любящее камни животное, большую часть дня ищущее убежища в пещерах, а в сумерках собирающееся группами и питающееся ягодами, нежными побегами растений, кузнечиками, ракообразными и моллюсками. Летом он появляется в большом количестве ночью и совершает набеги на поля сахарного тростника, а также на фруктовые деревья, проявляя пристрастие к маленьким, круглым, гроздевидным ягодам лонгана (*Nephelium longanum*). В пещерах среди этих холмов они пасутся стадами; и в июне самок часто можно увидеть в уединенных частях холмов с их одиноким детенышем у груди. Эти животные проявляют большое беспокойство при приближении человека, мгновенно исчезают и прячутся в своих норах, пока незваный гость не пройдет мимо. Они, по-видимому, также обладают избытком самодовольства и находчивости; ибо я часто видел Обезьяну, одиноко сидящую на камне, болтающую и плачущую просто для собственного развлечения и утешения. Что бы ни говорил м-р Уотертон о склонности обезьян к дереволюбию в целом, совершенно очевидно, что этот вид проявляет явное предпочтение голым скалам, покрытым только травой и кустарником; ибо, если бы он предпочел лес, он мог бы очень легко удовлетворить свое желание, удалившись на несколько миль дальше вглубь материка, где он мог бы найти его в изобилии. Но, напротив, в лесу он лишь случайный нарушитель, прибегающий туда, когда ему не хватает пищи на поросших травой холмах у моря, где он любит устраивать свой дом. У китайцев есть причудливая идея, что хвост обезьяны - это карикатура на татарский кулон, в который они закручивают свои длинные черные волосы, и они неизменно отрубают его у любой Обезьяны, которая попадает в их распоряжение. Отсюда и трудности с приобретением в Китае обезьян с идеальными хвостами".

XV. МАКАКА, ПОЕДАЮЩАЯ КРАБОВ. *MACACUS CYNOMOLOGUS*.

Simia cynomologus, Linn., Sist. Nat., i., стр. 38 (1766); Шребер, Согет, i., стр. 91, стр. xiii. (1775).

Макака, Ф. Кюв., Хист. Нац., Маммиф., livr. xxx., xxxi. (1819).

Macacus carbonarius, F. Cuv., Hist. Nat., Mamm. livr. xxxii. (Октябрь 1825 г.).

Золотистый макакус, Джеффри. in Belang. Путешествие, Зоол., стр. 58 (1834).

Macacus philippensis, Is. Geoffr., Кат. Книга приматов, стр. 29 (1851).

Inuus (Macacus) palpebrosus, Вагнер в черепае. Саугет, Дополнение, v., стр. 54 (1855).

Мех макака, Обвисший, Прос. Акад. наук Филадельфии, 1867, стр. 36, табл.

Macacus cristatus, Серый, Кошка. Обезьяны, Брит. Муз., стр. 30 (1870).

Macacus assamensis, Серый, т. н., стр. 31.

Cercocebus cynomologus, Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 101 (1876).

Macacus cynomologus, Андерсон, Зоол. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 73 (1878; с синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Индия Мам., стр. 21 (1891).

Персонажи. Тело большое и массивное; голова большая и широченная; ноги короткие и крепкие; поясница тонкая; задняя часть тяжелая; хвост толстый у основания, почти равный длине тела; морда длинная; нос не выделяется над лицом; глаза большие; уши стоячие, заостренные, почти безволосые; лобные гребни не сильно нависают над глазами.

Морда бледно-коричневая или багровая с голубовато-белым пятном внутри глаз, веки голубовато-белые; уши, кисти и ступни черные; мозоли ярко- или темно-телесного цвета; мех прямой; шерсть на темени не удлиненная, направлена назад, иногда лучистая или слегка хохлатая; общий цвет верхней поверхности темный или серовато-коричневый, варьирующий от красноватого до золотисто-коричневого; нижняя поверхность тела и внутренняя поверхность конечностей от коричневато-серой до белой, волосы темные у корней и выше. обведен желтыми, коричневыми или черными кольцами; мошонка коричневая, с синевато-бурыми пятнами. Длина 22 дюйма; хвост 19 дюймов. Самки меньше.

Этого вида существует несколько разновидностей или рас, у одной из которых ярко выраженный золотисто-рыжий окрас (*M. aureus*, Geoffr.); у другой (*M. carbonarius*, F. Cuv.) преобладает черновато-коричневый оттенок лица, голых рук, ступней и мозолей; у третьей расы светло-желтый мех (*M. cristatus*, серый); еще одна (*M. philippensis*) с Филиппинских островов почти белая.

Распространение.—Этот вид является одним из наиболее широко распространенных среди всех макак. Наиболее типичные экземпляры встречаются в Бирме и Аракане. В Сиаме встречается бледная разновидность с менее оранжевыми кольцами волосков. На Никобарских островах (возможно, интродуцированных, как предполагает доктор Блэнфорд), на Малайском полуострове, а также на Суматре, Яве, Бали, Ломбоке и Тиморе, по-видимому, преобладает более темная разновидность (или *M. carbonarius*). С острова Борнео — где он поднимается на высоту 5000 футов над уровнем моря, происходит хохлатая и, возможно, также золотисто-рыжая раса (истинная родина последней до сих пор неизвестна). На Филиппинском архипелаге — на Минданао, Басилане, Лусоне, Негросе, Самаре и других островах — встречается раса с очень светло-желтым окрасом.

Привычки. Макаки, питающиеся крабами, стадны, собираются в стаи по пятнадцать-двадцать особей обоего пола и всех возрастов. Они часто обитают в лесах у устьев рек и прибрежных мангровых болотах, где их постоянно можно увидеть бродящими по грязи, собирающими креветок и крабов, которые являются их любимой пищей. Тикелл говорит, что они хорошо плавают и ныряют. Самки легко поддаются дрессировке, как и молодые самцы; но они, состарившись, склонны становиться злыми и неуверенными в себе. Матери добры и нежны к своим детенышам, которые первые несколько недель крепко держатся ручками и ножками за волосы на груди или подмышках и животе.

Мистер Эверетт встречался с этим видом на островах Сирхассен и Bunguran в группе Natuna, где, по его словам, они были в изобилии. Он добавляет: "Они спускаются большими группами к морскому берегу, сидят группами на больших валунах или играют и охотятся за добычей на песке, когда начинается отлив. У взрослых животных лицо, кисти и ступни темно-коричневые; нижние веки более бледно-коричневые; верхние веки и верхние половины орбит беловатые. У очень

молодого самца голая кожа лица была мертвенно-коричневой, на веках несколько бледнее, а кисти и ступни были темно-коричневыми" (*Олдфилд Томас и Хартерт*, Ноябрьский зоол., i., стр. 654, 1894).

XVI. ТОКСКАЯ МАКАКА. *MACACUS PILEATUS*.

Обезьяна пилеата, Шоу, генерал. Зоол., i., стр. 53 (1800).

Cercocebus sinicus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 98 (1812).

Macacus sinicus, Desm., Mamm., стр. 64 (1820); Келаарт, Фауна Зейля., стр. 8 (1852).

Macacus pileatus, Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 1272 (1847); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 29 (1870); Андерсон, Зоол. Экспед. Юнь-нань, стр. 91 (1878; с синонимией); Бланф., Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 24 (1891).

Cercocebus pileatus, Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 98 (1876).

Персонажи.—Близкий родственник *M. sinicus*; морда узкая и выступающая; шерсть в целом длинная, волнистая, жесткая; на голове удлинённая, расходится лучами от центра макушки, спускается на лоб и иногда поднимается в прямой пучок; хвост равен длине тела; лоб покрыт тонкими волосами и морщинистый. Длина 13 дюймов; хвост 14½, у некоторых достигает 21 дюйма; хвост 18 дюймов.

По окраске Тока очень напоминает шляпную макаку, но верхняя часть тела более рыжеватая, волосы данного вида (хотя и окольцованы, как у *M. sinicus*) над серыми корнями рыжевато-коричневые или золотистые с каштановым оттенком на кончиках. Однако его легко отличить по тому, что морда бледно-телесного цвета, с редкими черными волосками, а край верхней губы черный; пространство вокруг ушей беловатое; руки, ступни и уши черноватые; нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей беловатые; верхняя поверхность хвоста коричневая, его вершина светло-коричневая или серая; мозоли бледно-телесного цвета.

Самка.—конечности краснее, чем у самца; внутренняя сторона рук и пятна на груди и животе цвета индиго.

Молодые. Волосы на макушке не так сильно приплюснуты книзу или так расходятся лучами, как у взрослых особей; лицо более старомодное и изысканно комичное; хвост почти голый; а щеки, ладони, подошвы и мозоли бледно-розоватого цвета. (*Темплтон.*)

Распространение. Макака Тока занимает на Цейлоне то же место, что и шляпочная макака в Южной Индии.

Привычки.—*Macacus pileatus* по размеру, повадкам и форме очень напоминает шляпную макаку. Он известен сингальцам под названием Рилава. "Маленькая грациозная гримасничающая *рилава*, - пишет сэр Дж. Эмерсон Теннент, - является всеобщим любимцем как местных жителей, так и европейцев. Тамильские фокусники учат его танцевать и в своих странствиях переносят его из деревни в деревню, одетого в гротескное платье, чтобы показать его живые представления. Он не возражает против курения табака ". Нокс в своем интересном рассказе об острове дает точное описание рилавас: "у них нет бород, белые лица и длинные волосы на макушке, которые разделяются пробором и свисают вниз, как у мужчин, и которые причиняют много вреда кукурузе и настолько дерзки, что приходят в их сады и едят те фрукты, которые там растут".

XVII. ШЛЯПНЫЙ МАКАК. *MACACUS SINICUS*.

Simia sinica, Линн., Мантисса, Растение., стр. 521 (1771).

Cercocebus radiatus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 98 (1812).

Le Toque mâle, F. Cuvier, Hist. Nat., Mamm., livr. xviii. (Juin, 1820).

Macacus sinicus, Blyth, J. A. S., Beng., xvi., стр. 1272 (1847); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 28 (1870); Андерсон, Зоол. Экспед. Юньнань, стр. 91 (1878; с синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., М., стр. 23 (1891).

Cercocebus sinicus, Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 99 (1876).

Персонажи. Лицо обнаженное; лоб покрыт редкими волосами и морщинами; щеки впалые; морда узкая и выпуклая; уши голые и довольно выпуклые; хвост почти такой же длины, как тело.

Волосы в целом умеренно длинные, прямые и гладкие, на макушке удлинённые и расходящиеся во все стороны от макушки, но не закрывающие лоб, на котором короткие и редкие волосы разделены пробором посередине. Длина 27 дюймов; хвост 24 дюйма, но часто пропорционально длиннее.

Общий цвет спины и верхней стороны хвоста коричневато-оливковый; внешняя сторона конечностей сероватая — волосы у корней серые, выше окаймлены тусклыми желтыми и черными полосками; нижняя поверхность тела, внутренняя сторона конечностей и нижняя сторона хвоста беловатые; лицо, уши, мозоли и другие обнаженные части тела мертвенно-бледного телесного цвета.

Череп длинный, ниже, чем у *M. rhesus*; поперечный диаметр орбит больше вертикального.

Распространение. — Обитает по всей Южной Индии, совпадая с *M. rhesus* на восточном и западном побережье, причем последний вид заходит так далеко на юг, а шляпная макака не заходит дальше на север, чем река Годавери с одной стороны и Бомбей с другой. (См. стр. 23.)

Привычки. — Шляпная макака сходна по повадкам с уже описанными видами. Он живет стаями в лесах и джунглях повсюду на своем ареале. Его часто содержат в неволе из-за его послушания и замечательной способности к мимикрии.

МАНГАБЕИ. РОД *CERCOCEBUS*.

Церкоцебус, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 97 (1812).

Этот род был создан для получения небольшой и малоизвестной группы обезьян, которая обитает только в Западной Африке. Они почти родственны макакам, с одной стороны, и еще более близки к роду *Cercopithecus*, который будет описан следующим, с другой стороны. Все они имеют овальную голову и по форме более стройны, чем макаки; у них также менее удлинённая морда, менее развитые надглазничные гребни, седалищные мозоли крупнее, а конечности пропорционально длиннее. Они сходны с макаками и отличаются от *церкопитеков*, или генонов, наличием пятого заднего выступа заднего нижнего коренного зуба на каждой челюсти; и отличаются от обоих тем, что волоски на теле редко обрамлены полосами разного цвета, как в случае с видами обоих только что упомянутых родов. Нос расположен за концом морды. Однако их наиболее очевидным внешним признаком, от которого они получили свое общее название обезьян с "Белым веком", являются их чисто белые верхние веки, причем белая полоска более отчетлива на внутренней половине века, чем на внешней. Этим обезьянам нужны гортанные воздушные мешочки, как у макак; но у них большие щечные мешки и простой желудок, как у

последних. Их хвост всегда длинный, почти равный длине тела. На руках есть перепонка между каждым из пальцев, причем перепонка между большим и указательным пальцами очень короткая; на ногах большой палец, который широко распространен, имеет короткую перепонку, соединяющую его с соседним; второй и третий пальцы соединены почти по всей длине, четвертый перепончатый и соединен с третьим и пятым до их средних суставов.

Мангабей обитают только в Западной Африке. Как и их родственники, макаки и геноны, они ведут древесный образ жизни, живут группами в лесной стране и питаются в основном фруктами.

I. ЗАКОПЧЕННЫЙ МАНГАБЕЙ. CERCOCEBUS FULIGINOSUS.

Cercocebus fuliginosus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 97 (1812); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 27 (1870); Сл., муз. Пайбас, vii., стр. 95 (1876).

Le мангабей, F. Cuv., Hist. Nat., mammif., livr. vi. (май 1819 г.).

Simia fuliginosa, F. Cuv., Mamm., livr. xxxv. (Декабрь 1821 г.).

Cercopithecus fuliginosus, Мартин, P. Z. S., 1838, стр. 117.

Персонажи. Волосы на макушке не удлинены, а направлены назад; бороды нет; брови выпуклые. Лицо, уши и руки обнаженные; хвост длинный и перекинут через спину; усы маленькие, направлены назад, ниже и за ушами. Лицо мертвенно-бледного коричневатого цвета; уши, кисти и лапы темнее; мех на верхней части тела и внешней стороне конечностей угольно-черный; подбородок, горло, грудь, усы на щеках ниже ушей, нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей пепельно-серые; усы иногда того же цвета, что и спина; хвост темно-серый.

Распространение. Западная Африка: Либерия.

Привычки. Описывая этот вид, Фредерик Кювье отмечает, что он обладает счастливым нравом, нежен и компанейский, но довольно капризный. Непрестанно активный, он позволяет себе самые гротескные выходки и позы, так что считалось (конечно, ошибочно), что у них в теле больше суставов, чем у других видов. У самцов особенно есть постоянная привычка гримасничать, обнажая свои длинные клыки. Самки еще более нежны и любят, когда их ласкают.

Г-н Бюттикофер обнаружил, что этот вид довольно редок в Либерии. Иногда его видели на невысоких деревьях, но в основном на земле, где он ищет опавшие плоды.

II. МАНГАБЕЙ С БЕЛЫМ ВОРОТНИЧКОМ. CERCOCEBUS COLLARIS.

Мангабей а. кольер Блан, Буффон, История нации, xiv, стр. 256, стр. 33; Ф. Кювье, М., ливр. xxxv. (Декабрь 1821 г.)

Cercocebus ethiops, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 97 (1812), (нек *Simia ethiops*, Linn.).

ТАБЛИЧКА XXVII.



МАНГАБЕЙ С БЕЛОЙ КОРОНОЙ.

Cercopithecus ethiops, Кул. Beitr. Зоол., стр. 97 (1820, nec *S. ethiops*, Linn.).

Cercopithecus ethiopicus, Ф. Кювье, Мамм., livr. xxxv. (Декабрь 1821 г.).

Cercocebus collaris, Серый, Листовой моллюск. Брит. Муз., стр. 7 (1843); ид., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 27 (1870); сл., Муз. Пайбас, стр. 96 (1876 г.)

Персонажи. Волосы на макушке не удлинённые, а направлены назад; бакенбарды маленькие, направлены назад; бороды нет. Лицо, уши, руки и мозоли обнажены; хвост длинный, перекинут через спину.

Лицо, уши и руки черные; макушка головы насыщенно красновато-коричневая; вся верхняя сторона тела, задняя часть плеч, спина, внешняя поверхность обеих пар конечностей, ступни и хвост серовато-грифельного цвета; горло, грудь, вся нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей белые, как и затылок, боковые стороны лица, передняя часть плеча и передняя сторона рук до макушки предплечья; у многих видов несколько широкая полоса грифельно-серый цвет пересекает половину лица от щек до нижней части уха.

Распространение. — Западное побережье Африки.

III. МАНГАБЕЙ С БЕЛОЙ КОРОНОЙ. *CERCOCEBUS ETHIOPS*.

(Фото XXVII.)

Simia ethiops, Linn., Sist. Nat., i., стр. 39 (1766).

Cercocebus ethiops, Джеффри Кат. Мэ́тх. Приматы, стр. 25 (1851); Грей, Список мам. Брит. Муз., стр. 7; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 27 (1870); Сл., муз. Пайбас, vii., стр. 95 (1876).

Cercopithecus lunulatus, Темм., Эсквисс. Гуин., стр. 37 (1853).

Персонажи. — Этот вид очень похож на *C. collaris*, но отличается тем, что он немного темнее сверху и имеет пятно на затылке, а также узкую серовато-белую полосу вдоль спины.

Распространение. — Западная Африка.

IV. СЕРОЩЕКИЙ МАНГАБЕЙ. *CERCOCEBUS ALBIGENA*.

Пресвитер альбигойский, Грей, P. Z. S., 1850, стр. 77, стр. xvi; Мюри, P. Z. S., 1865, стр. 740.

Cercocebus albigena, Pucher., Rev. Zool., 1857, стр. 241; Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 97 (1876).

Церкоцебус (Semnocebus) альбигенский, Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 27 (1870).

Персонажи. Лицо обнаженное, за исключением нескольких коротких волосков на щеках и губах; пучок длинных жестких волос, выступающих над каждым глазом; шерсть на теле удлинённая на передней четверти и руках; на макушке и затылке волосы длинные и направлены назад, образуя гребень; руки и ноги короткие, хвост длинный, большой палец маленький, а большой палец большой и широкий; лицо черное.

Общий цвет тела черный; щеки, горло, пятно за ухом, бока шеи, плечо и передняя часть груди сероватые; шерсть на морде и над глазами черная; хвост черный; мозоли черные.

У более молодого экземпляра, погибшего в 1865 году в Зоологическом саду Лондона, горло, бока шеи и передняя часть груди были грязно-коричневыми; волосы на щеках того же цвета, а некоторые и черные.

Распространение. — Западная Африка.

V. ЧЕРНЫЙ МАНГАБЕЙ. *CERCOCEBUS ATERRIMUS*.

Cercopithecus aterrimus, древний. Зоол. Гарт., xxxi., стр. 267 (1890).

Cercocebus aterrimus, Scl., P. Z. S., 1893, стр. 256 (примечание).

Персонажи.—Близкий родственник *C. albigena*, но обычно отличается темно-черным окрасом, за исключением плеч и затылка, которые черновато-коричневые или коричневато—серые - шерсть здесь не длиннее, чем на остальном теле; волосы на щеках тонкие, бархатистые и беловатые; усы густые, серовато-коричневые; борода очень редкая, беловатая.

Распространение.—Юго-западная Африка: водопад Стэнли в Конго.

Привычки.—Неизвестно.

VI. ХОХЛАТЫЙ МАНГАБЕЙ. *CERCOCEBUS GALERITUS*.

Cercocebus galeritus, Петерс, М. В. Ak. Berl., 1879, стр. 830, pls. i.B и iii. (Череп).

Персонажи.Плоский гребень из черновато—коричневой шерсти, расходящийся от макушки головы по всей окружности и надо лбом; вся верхняя поверхность покрыта длинным рыхлым мехом, волосы у основания серые, а выше обрамлены серовато-зелеными и черновато-коричневыми кольцами; передние конечности, кисти, ступни и прикорневые три четверти хвоста черновато-коричневые; бока головы и вся нижняя поверхность желтоватые; внутренняя сторона конечностей желтовато-серая; шерсть на концевой части хвоста светлее, чем на остальной, и окаймлена белыми волосками. желтый; лицо иссиня-черное.

Распространение.—Е. Африка; Митола, в устье рек Оси и Тана.

Привычки.—Этот вид был обнаружен живущим в лесах на побережье небольшими стаями численностью от пяти до шести человек.

ГЕНОНЫ. РОД *CERCOPITHECUS*.

Церкопитек, Эркслебен, Sist. Regn. Аним., стр. 22 (1777).

Род *Cercopithecus* включает большее количество видов, чем любой другой из *Anthropoidea*. Его представители характеризуются довольно круглой головой, стройными, но мускулистыми телами, узкой поясницей и длинными задними конечностями. Хвост у них длинный, хотя и короче, чем у описываемых далее родов, а именно у лангуров и гerez. Лицо у них короткое, морда менее вытянутая, щечные мешки больше, чем у макак. Нос не выпуклый, ноздри округлые, в то время как бакенбарды, как правило, развиты, а также борода длиннее или короче. Мозоли у них менее обширные, чем у макак. У них удлинённые руки с пальцами, соединёнными перепонкой у основания; их большие пальцы, хотя и отчетливо различимы, менее развиты по сравнению с большими пальцами. Мех густой и мягкий, и у большинства видов он окаймлен полосами разного и часто ярко окрашенного цвета.

У *церкопитеков* череп вдавленный, без ярко выраженного надбровья, поскольку надбровные дуги менее выпуклые и угловатые, а их внешний край менее выступает вперед по сравнению с черепами уже описанных родов. Орбиты значительно приближены. Их коренные зубы сильно заострены, а задний нижний коренной зуб имеет только четыре выступа, а не пять, как у макак; но, как и у этих животных, два передних выступа соединены вместе поперечным гребнем, а два задних - вместе.

Геноны полностью ограничены Африканским континентом, где они распространены от Гамбии до Конго и от Абиссинии до Замбези; но каждый из этих видов ограничен небольшими ограниченными территориями. Будучи по существу древесными, они обитают исключительно в лесных районах, собираясь в большие стаи. Они могут с большой скоростью перебираться с

дерева на дерево и с удивительной быстротой взбираться даже по вертикальным поверхностям. Они резки и энергичны в своих движениях, беспокойны и шумны, беспрестанно болтают и корчат гримасы. Последняя привычка настолько характерна для них, что они получили от нее название *генон*, под которым они теперь так широко известны, данное им французами. Их пища состоит из листьев, птичьих яиц и меда, но преимущественно из фруктов, в то время как они особенно губительны для спелых зерновых полей туземцев вблизи лесов, в которых они живут. Они жадно питаются и уносят все, что может вместиться в их набедренных карманах, даже после того, как насытятся, или если их остановит предупреждающий крик часового, который, как говорят, всегда стоит на страже в какой-нибудь выгодной точке, когда стая занята своими грабежами. Геноны не только непоседливы, но и очень любознательны; поэтому в молодости их очень легко приручить, и, как следствие, их часто можно увидеть в качестве исполнителей в цирках и на выставках. В возрасте они становятся ненадежными по характеру и часто очень вспыльчивыми. Говорят также, что они будут отражать ракетами любое вторжение в регион, в котором они находятся, в любом количестве.

Известные виды, которых насчитывается около сорока, были для целей описания и легкой последующей дискриминации разделены на группы (на основе нескольких их более или менее заметных признаков) разными зоологами. Из них можно особо упомянуть г-на Исидора Жоффруа Сент-Илера из Парижа и профессора Шлегеля из Лейдена; расположение последних образует очень удобный ключ для определения вида. Среди зоологов, которые совсем недавно пересмотрели этот род, есть хорошо известный секретарь Лондонского зоологического общества доктор П. Л. Склейте, который в некоторой степени последовал и улучшил классификацию рода профессором Шлегелем. Таким образом, в настоящем обзоре многочисленных видов этого рода были приняты шесть групп, предложенных доктором Склейте. Это (I.) Геноны с носовыми пятнами - *Cercopithecus rhinosticti*; (II.) Зеленые геноны — *C. Хлороноту*; (III.) Геноны с рыжеватой спинкой — *C. erythronoti*; (IV.) Геноны с черными конечностями - *C. melanochiri*; (V.) Геноны с хохлатыми ушами — *C. auriculati*; (VI.) Бородатые геноны — *C. barbati*; и, наконец, Трехзубые геноны - *C. trituberculati*.

Группа I. *Cercopithecus Rhinosticti*.

У представителей этой группы отчетливое пятно на носу белого, красного или синего цвета.

I. МАЛЫЙ БЕЛОНОСЫЙ ГЕНОН *CERCOPITHECUS PETAURISTA*.

Simia petaurista, Schreb., Säügeth., i., p. 103, pl. xix. B (1775).

Блан-нез, Буфф., История. Нац., Дополнение, vii., стр. 67 (1789).

Cercopithecus petaurista, Erxl., Sist. Regn. A.H., стр. 35 (1777); Мартин, Маммиф. А. Н., стр. 539 (1841); Вагн. в книге Шребера "Säügeth", Дополнение, v., стр. 250 (1855); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 20 (1870); Шлег., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 86 (1876); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 244.

Аскань (cercopithecus ascanius), Ауд., Хист. Нац. Сингес, Семья. iv., раздел ii., рис. xiii.; Ф. Кювье, Нац. История., Мама., i., ливр. xiv. (Февраль, 1820).

Персонажи. Голова круглая, лоб довольно приподнят; нос широкий; лицо и переносица покрыты короткими волосками; бакенбарды короткие; подбородок бородатый. Голова, спина, верхняя сторона хвоста оливково-зеленые, с седыми у основания волосками, обрамленными более темными или светлыми желтыми и черными кольцами; лицевые волоски черные, слегка рыжеватые на щеках; кожа под ними синевато—красная или фиолетовая; нижняя часть носа и половина верхней губы белые; усы и борода белые; линия на лбу над глазами и ушами и , опоясывающая макушку сзади, черные; пучок волос ниже ушей, направленный назад, белый;

горло, грудь, нижняя сторона тела, внутренняя сторона конечностей и нижняя сторона хвоста белая; задняя сторона передних конечностей серая с оливковым оттенком; обнаженные части подбородка, ушей и кистей рук пурпурно—черные.

Распространение.— Западная Африка: Золотой берег и Сьерра-Леоне.

Привычки.— Аскань, как также называют это животное, является наиболее распространенной из генонов, встречающихся в зверинцах. Это нежный, грациозный и живой вид. Они постоянно находятся в движении, резвятся со своими товарищами и преследуют их в припадке игривости. В то же время они послушны и фамильярны, но не любят, когда их берут в руки или вмешиваются в их дела ". (Мартин.) Алламанд говорит, что его особь, которая в целом была очень нежной, разозлилась, когда ее прервали во время еды или над ней подшутили, но ее раздражение длилось недолго.

II. ГЕНОН ДЖЕНТИНКА. *CERCOPITHECUS SIGNATUS*.

Cercopithecus signatus, Джентинк, Заметки, Лейб. Музей, viii., стр. 55 (1886); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 257.

Персонажи.— Очень похож на *C. petaurista*. Бока головы седые — волосы обрамлены белыми, желтоватыми и черными кольцами — и резко отделены от красноватой верхней части головы черной полосой от уха до уха над глазами, но не огибающей макушку; уши несколько крупнее, чем у *C. petaurista*.

Черепная часть черепа выше, а лицевая часть более развита, чем у *C. petaurista*; челюсти длиннее, а глаза круглее и шире.

Распространение.— Предположительно из Западной Африки, но его среда обитания с уверенностью неизвестна.

III. КРАСНОБРЮХИЙ ГЕНОН. *CERCOPITHECUS ERYTHROGASTER*.

Cercopithecus erythrogaster, Грей, P. Z. S., 1866, стр. 169, pl. xvi., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 128 (1870); Murie, P. Z. S., 1866, стр. 380; Schleg., Муз. Пайбас, vii., стр. 69 (1876); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 252, 1894, стр. 1.

Персонажи. Мех черноватый, с желтыми крапинками, особенно на голове, шерсть черная с желтыми кольцами; морда черная; пятно на носу белое; усы и лобная полоса от виска до ушей черные; на каждой щеке по беловато-желтому пятну; усы, борода, горло и бока шеи желтовато-белые; грудь и нижняя поверхность тела рыжеватые; внутренняя сторона передней поверхности бедер и нижняя сторона хвоста серовато-белые; внешняя сторона бедер и задних ног серые с черными крапинками. Длина тела 13 с половиной дюймов; хвоста 16 дюймов.

У молодой самки верхняя часть головы желтоватая, этот цвет распространяется к затылку.

Распространение.— Западная Африка. Этот вид был только однажды выставлен в Зоологических садах Лондона, а именно в 1866 году, но недавно, по словам доктора Склейте, экземпляр недолго жил в Зоологических садах Роттердама.

Привычки. Ничего не известно о повадках краснобрюхого генона в естественном состоянии; но доктор Мюри писал о том, что он прожил два месяца в Зоологическом саду: "Его характер казался мягким и безобидным, ни в коем случае не серьезным или степенным, на самом деле он скорее склонен быть живым и игривым, но с небольшой склонностью к драчливости. Сторож заметил, что

она казалась робкой и несколько недоверчивой к своим более резвым товарищам, но свободно подошла к нему, а когда брала еду у него из рук, казалась довольной и нежно играла с его пальцами, не пытаясь откусить".

IV. BÜTTIKOFER'S GUENON. CERCOPITHECUS BUETTIKOFERI.

Cercopithecus buettikoferi, Джентинк, Заметки, Лейб. Музей, viii., стр. 56 (1886); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 244.

Персонажи.—Генон Бюттикофера во всех отношениях согласен с *C. petaurista*, но хочет, чтобы черная полоса проходила от уха до уха вокруг макушки. От этой группы "нет и следа в серии из восьми экземпляров, содержащих взрослых и детенышей, самцов и самок" (Джентинк). Ириды коричневые.

Распространение. Западная Африка: Либерия.

ГЕНОН В. МАРТИНА. CERCOPITHECUS MARTINI.

Cercopithecus martini, Waterh., P. Z. S., 1838, стр. 58; 1841, стр. 71; Мартин, Маммиф. Аним., стр. 542 (1841); Грей, Кат. Monkeys Brit. Mus., стр. 21 (1870); Scl., P. Z. S., 1884, стр. 176, pl. xiv.; 1893, стр. 245.

Cercopithecus nictitans, Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 89 (1876).

Описание.—Связан с *C. petaurista*. мех относительно длинный, но неплотно прилегающий к телу. Морда голая; усы густые; борода короткая; хвост очень длинный; мозоли небольшие. Длина тела (типовой экземпляр) 22 дюйма; хвоста 26. Длина самки 19 дюймов; хвоста 24. Общий цвет головы, спины и верхней стороны прикорневой части хвоста оливково-зеленый, отчетливо кольцевидный, волосы у основания седые, вверху окаймлены несколькими полосами желтовато-зеленого и черного цветов. Лицо голубое; пятно на носу, начинающееся в середине хребта и простирающееся по бокам, а также над верхней и нижней губами, желтовато-белое; черная линия, идущая вверх по хребту носа от конца белого пятна до бровей и окружающая глаза; черная полоса, пересекающая лоб от уха до уха; бакенбарды зеленые; борода белая; горло, грудь, нижняя сторона тела, внутренняя сторона конечностей и нижняя сторона трех четвертей хвоста серовато-белые; передние конечности черные; ноги черные; руки и бедра белого цвета. того же цвета, что и спина; верхняя сторона хвоста за базальной областью и его концевая часть черные; руки и ступни черные.

Как указал доктор Склейте (лок. cit.): "Его сразу отличить от *C. petaurista* по черным передним конечностям и ступням, зеленоватому окрасу хвоста над ними; зеленоватым щекам без какой-либо белой полосы под ушами и голубоватой коже лица".

Распространение.—Генон Мартина обычно завозят в Европу с острова Фернандо-По, где он, вероятно, является местным. Он также может обитать на соседнем побережье Западной Африки.

VI. ЛЮДИО ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ЛЮДИО.

Cercopithecus ludious, Грей, P. Z. S., 1849, стр. 8, стр. ix., рис. 1; id., P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 21 (1870), Вагнер, в Шреб., Согет. Дополнение., v., стр. 51 (1855); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 245.

cercopithecus ascanias, Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 87 (1876).

Характеры.—Пятно на нижней половине носа большое, продолговатое, выше, чем широкое. Общий цвет меха черный или темно-зеленовато-оливковый, с мелкими серовато-желтыми крапинками. Лицо и губы черновато-голубые, пятно на носу белое; кончик носа над белым

пятном, надбровная полоса, макушка головы, плечи и передние конечности черные; внешняя и внутренняя стороны задних конечностей и кончик хвоста черные; подбородок, грудь, внутренняя сторона верхней части рук и нижняя сторона тела беловатые; усы черные; крестец и нижняя сторона основания хвоста рыжеватые.

Отличается от *C. petaurista* черными конечностями, красноватым крестцом и основанием хвоста.

Распространение.—Западная Африка: Камерун и дельта Нигера.

VII. ЧЕРНОЩЕКИЙ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК МЕЛАНОГЕНИС.

Cercopithecus melanogenys, Серый, Апп. и Маг. Нац. История, xvi., стр. 212 (1845); ид., P. Z. S., 1849, стр. 7, стр. ix., рис. 2; id., P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. музей, стр. 21 (1870); Scl., P. Z. S., 1860, стр. 246; Монтейро, P. Z. S., 1860, стр. 112; Джентинк, Заметки, Лейденский музей, x., стр. 11 (1888); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 245.

Cercopithecus picturatus, Сантос, Журн. наук. Лисб., xi., стр. 98 (1886).

Персонажи.Белое пятно на носу сердцевидной формы; полоса на лбу над глазами, проходящая назад над ушами и над нижней частью щек, черная; область между глазом и ухом беловатая; спина с мелкой проседью черного и оранжевого цветов; середина спины окрашена в темно-рыжий цвет; внешняя сторона ног темно-серая, переходящая в черную на руках и ступнях; хвост темно-рыжий. Длина тела 15½ дюйма; хвоста около 17 дюймов.

Черные нижние щеки и белая область между глазом и ухом отличают *C. melanogenys* от *C. nictitans* и *C. stampflii*.

Распространение.Западная Африка: Ангола. - Его очень много в Энкоже, в трех днях пути к югу от Бембы. (*Monteiro*.)

VIII. ГЕНОН СТАМПФЛИ. ЦЕРКОПИТЕК СТАМПФЛИЙ.

Cercopithecus melanogenys, Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 90 (1876, nec Gray).

Cercopithecus stampflii, Джентинк, Заметки, Лейденский музей, x., стр. 10 (1888); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 257.

Персонажи.Пятно на носу белое, с нижней его широкой частью и острием вверх; макушка головы, затылок, ноги и задняя часть хвоста черные; пятно на нижней губе черное; подбородок, грудь, передняя часть живота и внутренняя сторона передних конечностей белые; лоб, щеки, спина, бока тела и прикорневая часть хвоста рыжегато-зеленые, волосы окаймлены черными и рыжегато-желтыми кольцами. Длина тела 25½ дюйма; хвоста 38½ дюйма.

Отличается от *C. nictitans* белой нижней поверхностью.

Распространение.—Западная Африка: Либерия. Получено в стране Песси господами. Büttikofer and Stampfli.

IX. ГЕНОН ШМИДТА. ЦЕРКОПИТЕК ШМИДТИ.

cercopithecus ascanias (?), Scl., P. Z. S., 1887, стр. 502.

Cercopithecus schmidtii, Matschie, Zool. Anz., стр. 161 (1892); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 245, стр. xvi.

Персонажи.—Тесно связан с *C. melanogenys*, сердцевидным белым пятном на носу. Лицо и надбровная область голубые; нос над белым пятном черный; полоска между носовым пятном, доходящая до усов, с каждой стороны черная; верхняя и нижняя губы телесного цвета; усы белые, бросающиеся в глаза, с очень узкой черной полосой по их нижнему краю; борода белая; над надбровной областью и между ушами телесного цвета черная лобная полоска; макушка головы, спина, внешняя сторона рук, бедер и прикорневой трети хвоста оливково-зеленые и более точечные, чем у *C. melanogenys*; горло, нижняя сторона тела и внутренняя сторона верхней части конечностей белые; передние конечности, кисти, голени и ступни черные; задние две трети хвоста рыжие.

Распространение.—Этот вид был получен преподобным У. К. Уиллоуби в 1883 году в Юниамвези, в Восточной Экваториальной Африке, и, как говорили, был завезен туда из страны Маньюэма, расположенной на западном берегу озера Танганьика. Его экземпляр прожил в Зоологическом саду в Лондоне почти три года. Он также был получен в Уганде, дальше на север.

Х. ХОШЕ ГЕНОН. *CERCOPITHECUS NICTITANS*.

Simia nictitans, Linn., Sist. Nat., i., стр. 40 (1766).

Cercopithecus nictitans, Erxl., Сист. Règne Anim., p. 35 (1777); Martin, Mammif. An., p. 536 (1841); Wagner, in Schreber's Säugeth. Дополнение., v., стр. 50 (1855); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; ид., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 21 (1870); Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 89 (1876); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 246.

Cercopithecus nictitans (Hocheur), Ф. Кювье, История нац., Mamm. i., стр. 17 (1825); Одеберт, История нац. des Singes, Семейство iv., раздел i., стр. 9, стр. 2.

Персонажи. Голова круглая; лоб приподнят; лицо вдавленное; нос широкий, коротко стриженный. "Очень густая растительность на голове; сильно покрывающая глаза, закрывающая уши и увеличивающая ширину и возвышенность макушки головы". (*Мартин*.) Мочка носа узкая вверху, начинается между глазами, широкая внизу; губы и широкое кольцо вокруг глаз голые или очень короткошерстные, в других местах покрытые шерстью; усы пушистые; мозоли, покрытые шерстью; большие пальцы очень короткие; морда короче, чем это обычно бывает у представителей рода; бороды нет; хвост длинный, тонкошерстный, сужающийся.

Общая окраска по всему телу черная с белыми или желтоватыми крапинками, у корней волосы седые, затем черные, с белыми или желтовато-белыми кончиками; морда пурпурно-черная; пятно на носу чисто белое; на губах белого нет; уши черные; на морде черных полос нет, что отличает ее от всех других пятнистоносых обезьян; нижняя поверхность тела и прикорневая часть хвоста черновато-серая, внутренняя сторона конечностей менее отчетливая.

Некоторые экземпляры не такие черные, но более серые, особенно с нижней стороны, которая может быть окрашена в коричневый цвет.

Белый цвет носа, не переходящий на верхнюю губу, отличает этот вид от *C. petaurista* независимо от общей окраски.

Распространение.—Западная Африка. Хотя "Hocheur" не редкость в европейских зверинцах, до сих пор неясно, в какой именно части этого обширного региона он обитает.

Привычки.—О повадках этого вида ничего не известно, за исключением того, что наблюдалось на примерах, живущих в неволе. В зрелом возрасте этот вид отличается мягким нравом, очень активен и имеет привычку постоянно трясти головой - привычка, от которой он получил свое французское название "Hocheur".

XI. КРАСНОУХИЙ ГЕНОН. *CERCOPITHECUS ERYTHROTIS*.

Cercopithecus erythrotis, Waterh., P. Z. S., 1838, стр. 59; 1841, стр. 71; Мартин, Маммиф. An., стр. 535 (1841); Фрейзер, Зоол. Тип., pl. iv. (1848); Wagn., in Schreb. Säugeth. Дополнение, v., стр. 49 (1855); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 21 (1870); Шлегель, Муз. Пайбас, vii., с. 70 (1876); Сл., P. Z. S., 1884, с. 176, 1893, с. 246.

Персонажи. Общая окраска спины, боков и внешней стороны задних конечностей: черные, с желтовато—серыми или золотисто-желтыми пятнами на задней части спины - волосы черные, окаймленные соответственно желтым или золотым; лицо почти обнаженное, за исключением нескольких коротких волосков в верхней части носа; область вокруг глаз светло-голубая; нос красный; подбородок белый; черная полоса от глаза до уха; ниже нее широкая белая полоса в виде усов на щеках, под которой из уголков рта и щек снова появляется другая полоса. черный, с желтыми кольцами, пучок шерсти; уши изнутри ржаво—красные; внешняя сторона передних конечностей черноватая; горло, нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей серовато-белые; хвост ярко-рыжий, за исключением темной линии вдоль его верхней поверхности; анальные волоски ярко-красные. Длина тела 17 дюймов; хвоста 23 дюйма.

Распространение.—Эта редкая и очень красивая обезьяна обитает на острове Фернандо-По.

XII. УСАТЫЙ ГЕНОН. *ЦЕРКОПИТЕК ЦЕФУС*.

Simia cephus, Linn., Sist. Nat., i., стр. 39 (1766).

Cercopithecus cephus (Мустак), Ф. Кювье, Hist. Nat., Mamm., i., livr. xxvi. (1821); Мартин, Маммиф. An., p. 532 (1841); Wagner, in Schreber's Säugeth. Дополнение, v., стр. 49 (1855); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 20 (1870); Шлег., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 91 (1876); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 246.

Ле мустак, одебер, историк. Нац. Сингес, Семейство iv., Раздел ii., стр. 19, рис. xii.

Персонажи. Лицо и нос голые; морда короткая; усы густые и пушистые, направлены назад и книзу. Лицо, за исключением губ, фиолетово-голубое; край верхней губы черный, этот цвет продолжается полосой обратно к бакенбардам; между этим черным краем и носом находится белая полоса, проходящая также через щеку к бакенбардам; нижняя губа и подбородок черные; усы между глазами и ушами золотисто-желтые, более бледные ниже ушей и белые на нижней челюсти; уши черные, с желтовато-белыми волосками. Голова зеленоватая, сзади темнее, чем спереди; шея, спина, плечи, внешняя сторона рук, бока, ягодицы и верхняя сторона основания хвоста зеленовато-коричневые - шерсть у корней серая, а сверху окаймлена желтыми и черными или коричневыми кольцами, преобладание того или другого придает коричневую, более яркую или бледно-зеленую окраску; на внешней стороне бедер зеленый оттенок более глубокий. Остальная внешняя сторона конечностей серая с желтизной; кисти и ступни темно-коричневые или тускло-черные; нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей темно-серые, светлее на горле, груди и передней части брюха; нижняя сторона основания хвоста темно-серая; остальные две трети рыжеватые. Длина тела - 19 дюймов; хвоста - 26 дюймов.

Распространение. Западная Африка: от Габуна до Конго.

Привычки.—Этот вид совсем не редкость в зверинцах. Многочисленные экземпляры время от времени выставались в Зоологических садах Лондона. Однако мало что известно о повадках

Усатой обезьяны в ее родных лесах. В неволе он умен, подвижен и добродушен, но очень застенчив. Его хрупкое строение не может долго противостоять суровости нашего климата.

II. Cercopithecini Chloronoti.

У этой части генонов мех сверху более или менее оливково-зеленый; нижняя сторона и усы белые, а руки и ноги серые.

XIII. ГЕНОН МАЛЬБРУК. CERCOPITHECUS CYNOSURUS.

Simia cynosurus, Скоп. Деликатес. Флор. и фавн. Инсубр., i., стр. 44, стр. xix. (1786).

Cercopithecus cynosurus (Мальбрук), Ф. Кювье, Hist. Nat., Mamm., i., livr. ii. (Janvier, 1819); Десмарест, Mamm., стр. 60 (1820); Мартин, Mammif. An., стр. 515 (1841); Джеффри, Диктант. d'Hist. Nat., iii., p. 306 (1849); Wagner, in Schreber's Säugeth. Дополнение., v., стр. 38 (1855); Шлегель. Муз. Пайбас, vii., стр. 72 (1876); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 247.

Cercopithecus tephrops, Беннетт, P. Z. S., 1833, стр. 109.

Хлороцебус цинозурус, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз., стр. 26 (1870).

Персонажи.—Голова широкая и закругленная сверху; морда толстая. Лицо голое, телесного цвета; нос и щеки покрыты черной шерстью; уши голые, черные; руки короткие, большие пальцы рудиментарные; волосы по бокам головы не образуют усов. Верх головы и верхняя поверхность тела оливково-зеленые— волосы у корней седые и окаймлены черным и желтым; внешняя поверхность передних конечностей и ног седовато-серая, волосы с черными и белыми кольцами; бока шеи, нижняя поверхность тела, внутренняя сторона конечностей и нижняя сторона хвоста белые; нечеткая полоса на лбу над глазами белая; хвост темно-серый сверху; мозоли алые; область мошонки у самца темно-синего цвета; волосы под хвостом и вокруг области мошонки рыжие. Длина тела около 18 дюймов; хвоста - 16 дюймов.

Распространение.—Западная Африка. Вероятно, Сенегамбия, но точное место обитания пока неизвестно.

Привычки.О повадках мальбрука в его собственном доме ничего не известно; но мистер Мартин отмечает, что в неволе он сочетает в своем характере определенную медлительность с диким и мстительным нравом. Один из экземпляров, по его словам, "в зверинце Зоологического общества, взрослый самец, был нежным, фамильярным и радовался, когда его замечали или ласкали; но в то же время он не был ни живым, ни игривым. Другой был лжив и, хотя внешне спокоен, очень подозрителен; он возбуждался при малейшем поводе к гневу и набрасывался на своего обидчика с предельной злобой, изображенной на его лице, прилагая все возможные усилия, чтобы напасть на него, обнажая зубы и пристально глядя ему в лицо.... В целом, леность и свирепость формируют характер взрослого человека, по крайней мере, в неволе".

XIV. ГРИВСКИЙ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК САБЕЙСКИЙ.

Simia sabæa, Linn., Syst. Nat., i., стр. 38 (1766).

Cercopithecus griseus (Ле Гриве), Ф. Кювье, Mamm., i., livr. vii. (Juin, 1819).

Cercopithecus griseo-viridis, Десмарест, мама., стр. 61 (1820); Мартин, Мама. An., p. 518 (1841); Rüppell, Neue Wirbelth. Säugeth., стр. 8 (1835); Блэнфорд, Зоол. Бездна. Ехр., стр. 224 (1870); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 248.

Cercopithecus sabæus, Джеффри, Кат. Méth. Приматы, стр. 22 (1851); Глава, Муз. Пайбас, vii., стр. 74 (1876).

Chlorocebus engythis, Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 26 (1870).

Персонажи. Голова более пирамидальная, чем у *C. cynosurus*, а морда тоньше; угловатые участки шерсти в уголках каждого глаза направлены назад; усы образуют длинные и густые ушные пучки, направленные назад и частично скрывающие уши; уши маленькие; руки короткие и невеликие. Морда, уши и губы темно-фиолетовые; область вокруг глаз мертвенно-бледного телесного цвета; надбровная полоса, соединяющая бакенбарды, белая; макушка головы, спина до крестца, плечи и руки серовато—оливково-зеленые, волосы обрамлены серовато-черными и бледно-желтыми кольцами; бакенбарды, подбородок, грудь, нижняя поверхность тела, передняя часть плеч, внутренняя сторона конечностей и нижняя сторона хвоста белые; предплечья, крестец и бедра серые, слегка окрашенные в оливковый цвет; кисти и ступни полностью серые; верхняя часть сторона хвоста серовато-черная, кончик более светлый. Область мошонки медно-зеленого цвета, покрыта оранжевыми волосками.

Отличается от мальбука формой головы, более седым оттенком волос и цветом области мошонки; а от *C. callitrichus*, описанного ниже, более темным цветом волос, белой надбровной полосой и длинными белыми бакенбардами. Длина тела около 19 дюймов; хвоста 22 дюйма.

Распространение.—Северо-восточная Африка: по всей Абиссинии, Сеннаару и Кордофану, до 4000 футов.

Привычки.—По словам доктора Блэнфорда, этот вид является настоящей древесной обезьяной, и его очень редко можно увидеть, кроме как в лесу. "На высокогорье Абиссинии, - говорит он, - я только однажды видел стадо - это было недалеко от Дилди, к югу от озера Ашанги. Я встречал более крупные стаи на Ансебе, где они обитали на высоких деревьях по берегам ручья. Замеченные стаи были небольшими, не превышающими двадцати-тридцати особей. У меня было мало возможностей понаблюдать за их повадками, но они, по-видимому, мало отличались от повадок *Macacus* или *Inuus*, за исключением того, что *Cercopithecus* более тихое животное и менее вредное. В неволе они хорошо известны как чрезмерно послушные, с хорошим характером и довольно умные".

XV. ГЕНОН ВЕРНЕРА. ЦЕРКОПИТЕК ВЕРНЕРИ.

Cercopithecus werneri, Джеффри., С. R., xxxi., стр. 874 (1850); id., Arch. Mus., v., стр. 539, pl. xxvii. (1851); Вагнер, в Schreb. Säugeth. Дополнение., v., стр. 42 (1855); Склейте, Р. Z. S., 1893, стр. 258.

Персонажи.—Почти родственен *C. sabæus*, но все части тела оливково-зеленые, тогда как у этого вида серовато-зеленые — волоски обрамлены рыжевато-палевыми и черными кольцами; первые заменяют зеленые кольца в волосках *C. sabæus*, а черные намного шире; морда черная; хвост на кончике желтый, как у *C. sabæus*.

Распространение.—Точная среда обитания этого вида неизвестна.

XVI. ЗЕЛЕНый ГЕНОН. CERCOPITHECUS CALLITRICHUS.

(Фото XXVIII.)

Singe Verte, Adanson, Voy. Sénégal., p. 178 (1735).

Cercopithecus sabæa (нек. Linn.), Erxleb., сист. Ренье А. Н., стр. 33 (1777).

Церкопитек сабейский, Вагнер в Шребе. *Säugeth.*, v., стр. 40 (1855); Мартин, *Маммиф. Ан.*, стр. 519 (1841).

Le Callitriche, F. Cuv., *Hist. Nat., Mamm.*, i., livr. iv. (Марс, 1819).

Симия сабея, Одеберт, Сингес, Семейство iv., раздел ii., стр. 7, рис. iv. (1797).

Cercopithecus callitrichus, Is. Geoffr., Кат. Méth. Приматы, стр. 23 (1851); Шлег, *Мус. Пайбас*, vii., стр. 73 (1876); Склейтер, *P. Z. S.*, 1866, стр. 79; 1893, стр. 248, 616.

Chlorocebus sabæus, Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз., стр. 25 (1870).

ФОТО XXVIII.



ЗЕЛЕНый ГЕНОН.

Характеры.—Морда довольно длинная; уши большие, голые и несколько заостренные сзади; волосы по бокам головы длинные, густые, напоминающие оборки и направлены назад, к ушам; кисти и ступни длинные, но ступни длиннее кистей. Морда, уши, ладони и подошвы черные; надбровная полоса ярко-желтая или белая; голова, спина, плечи, руки и верхняя часть предплечий, бедра, верхняя часть ног и верхняя сторона хвоста насыщенно—желтовато-зеленые, с более широкими желтыми и более узкими черными полосками; внешняя поверхность нижней части передних и задних конечностей серая, с белыми или очень бледно-желтыми и черными кольцами; щеки, горло, нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей, белый, с желтизной на щеках, горле и вдоль средней линии живота. Хвост увенчан длинным хохолком ярко-желтого цвета; нижняя сторона хвоста серовато-зеленая; волосы под хвостом и в области мошонки ярко-желтые; голая кожа частей мошонки зеленая. Длина тела 24 дюйма; хвоста 29 дюймов.

Распространение. Западная Африка: от Сенегамбии до Нигера. Говорят, что в настоящее время он в изобилии встречается в диком виде на острове Сент-Китс в Вест-Индии, а полковник Фейлден идентифицировал его на Барбадосе. На оба этих острова он был завезен из Африки таким же образом, как и на Сен-Яго, один из островов Зеленого Мыса.

Привычки.— Зеленые обезьяны часто встречаются на высоких деревьях в больших лесах, живут небольшими группами или сидят поодиночке. Они передвигаются очень бесшумно и, казалось бы, лишены голоса, оставаясь безмолвными даже при нападении или ранении; хотя они хмурят брови, скрежещут зубами и проявляют все признаки досады и гнева. Этот вид является одной из самых распространенных обезьян, завезенных в Европу, поскольку он, по-видимому, лучше, чем большинство других представителей рода, переносит северный климат. Он даже размножался в Зоологических садах Лондона. Он очень активен и умен, и в молодости у него нежный и хороший нрав, но с возрастом он становится коварным, злобным и свирепым.

XVII. ГЕНОН ИЗ ВЕРБЛЮДКИ. *CERCOPITHECUS PYGERYTHRUS*.

Cercopithecus pygerythra (Ле Верве), Ф. Кювье, История. Нац. Мама., iii., ливр. xxiv. (Janvier, 1821).

Cercopithecus pygerithraeus, Десмарест, Мамм., Дополнение, стр. 534 (1820).

Cercopithecus pygerythrus, Урок, Спец. по маммологии. Bimanes et Quadrup., p. 83 (1840); Geoffr., Dict. История. Nat., iii., стр. 305 (1849); id., Cat. Méth. Приматы, стр. 21 (1851); Вагнер, в книге Schreb. Säugeth., v., p. 39 (1855); Peters, Reis. Моссамб. Согет., стр. 4; Мартин, Маммиф. An., p. 521 (1841); Schl., Mus. Пайс Бас, vii., стр. 76 (1876); Томас, P. Z. S., 1885, стр. 219; Х. Х. Джонстон, Экспедиция Килиманджаро, стр. 352 (1886); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 249 (нек Мартин, нек. Schl.).

Cercopithecus pusillus, Делаланд в Десмуре, округ Колумбия. Класс., vii., стр. 568.

Cercopithecus lalandii, Джеффри, диктант. история. Nat., iii., стр. 305 (1849); Вагнер в "Säugeth." Шребера, v., стр. 39 (1855); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 248 и 615.

Cercopithecus rufo-viridis, Is. Geoffr., C. R., xv., стр. 1038 (1842); Scl., P. Z. S., 1860, стр. 420.

Chlorocebus pygerythrus, Серый, Кошачий. Британские обезьяны. Mus, стр. 25 (1870).

Персонажи.—Очень близок к гривету (*C. sabæus*), мальбруку (*C. cynosurus*) и последнему виду, Зеленому генону. Отличается от гривета тем, что подбородок, кисти и ступни ниже лодыжек и

запястья очень черные, а не серые; и кончик хвоста (или его по всей длине) черный, а не серый или желтый, как у мальбрука. Он отличается как от мальбрука, так и от гривета наличием, по словам Мартина, длинного грубого меха, более серого сверху, с более слабым оливковым отливом (= *C. lalandii* из Жоффруа); или более красновато-желтого или желтовато-зеленого сверху (настоящий *C. pygerythrus*); также наличием заметной надбровной щетины. Менее толстая и тяжелая морда и зеленая область мошонки отличают его от мальбрука; ржаво-рыжая шерсть на участке ниже корня хвоста отличает его от гривета. Длина тела 22 дюйма; хвоста 27 дюймов.

Самка немного меньше самца.

Распространение.—Южная Африка: Капская колония. "Верветка распространена в лесах вдоль реки Грейт-Фиш и других ручьев между заливом Алгоа и Кейптауном. Его ареал простирается также вдоль побережья Натала, по всей стране Амакози и Каффрелии в целом". (Мартин.) Замбезия. На Килиманджаро. Мистер Х. Х. Джонстон наблюдал, что это обычное явление на высоте 5000 футов в возделанных садах вокруг деревни Моши и в лесах ниже, в Тавеите.

Привычки.—Их пища состоит из фруктов, и особенно из смолы, выделяемой из различных видов акации. Говорят, что в заключении, когда они раздражены, они издают лающий звук, обнажают зубы и смотрят с ненавистью в глаза. Они очень коварны, свирепы и дерзки, и к их клетке нужно подходить с большой осторожностью. Мистер Джонстон, живя на склонах Килиманджаро, обнаружил, что они чрезвычайно фамильярны и озорны, склонны воровать фрукты и т. Д. Они совершенно не боятся Человека.

Эту обезьяну очень часто можно увидеть живой в европейских зверинцах, где она, по-видимому, довольно хорошо переносит северный климат. На заседании Зоологического общества в ноябре 1893 года доктор Склейтеер отметил, что *Cercopithecus callitrichus* (= *C. pygerythrus*) недавно расплодился в Садах. Что касается последнего рождения, то зрители наблюдали любопытный факт, о котором сообщили: молодая обезьяна, прожившая около двух месяцев, имела привычку сосать оба материнских соска сразу.

XVIII. ТАНТАЛ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ТАНТАЛ.

Cercopithecus tantalus, Ogilby, P. Z. S., 1841, стр. 33; Sclater, P. Z. S., 1893, стр. 258; Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 73 (1876).

Церкоцебус танталус, var. f., Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 26 (1870).

Персонажи.—Голова более круглая, а морда короче, чем у *C. callitrichus*. Лицо покрыто очень короткими волосками; нос выдающийся и узкий между глазами, более плоский и широкий к кончику. Голова, спина и бока - смесь желтовато-коричневого и зеленого, того же оттенка, который преобладает в верхних частях *C. callitrichus* и *C. pygerythrus*; внешняя поверхность конечностей более ясная, пепельно-серая; усы, горло, грудь, нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей желтовато-белые; хвост коричневый у основания, бледно-серый на кончике; тыльная сторона кистей и ступней светло-серая; лицо мертвенно-бледного телесного цвета вокруг глаз, короткие волоски на носу и щеках черные; губы светло-каштановый; брови черные, увенчанные широкой белой полосой поперек лба; область мошонки покрыта желтоватыми волосками. (Огилби.)

Распространение.—Африка, но точное место обитания неизвестно.

Привычки.—Неизвестно.

III. Cercopithecini Erythronoti.

Следующие три вида составляют группу Жоффруа и Склатера с рыжим мехом, которые сверху ярко-рыжие, а снизу белые.

XIX. ГЕНОН ПАТАС. ЦЕРКОПИТЕК ПАТАС.

Simia patas, Schreber, Säugeth., i., p. 98, pl. xvi. (1775).

Cercopithecus patas, Erxleb. Система. Règne An., p. 34 (1777); Schleg., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 84 (1876); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 249.

Simia rubra, Gm., Syst. Nat., i., стр. 34 (1788); Фишер, Синописис. Мама., стр. 24 (1829).

Cercopithecus ruber, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 96 (1812); id., Диктант. d'Hist. Nat., iii., стр. 307 (1849); Desmar. Mamm., стр. 59 (1820); Мартин, Маммиф. An., p. 509 (1841, pt.); Wagner, in Schreber, Säugeth. Дополнение., v., стр. 42 (1855); Сл., P. Z. S., 1874, стр. 664.

Le Patas et Le Patas à bandeau noir, F. Cuvier, Hist. Mamm. i., ливр. xv. (Аврилль, 1820).

Хлороцебус рубер, Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 25 (1870).

Персонажи. Голова широкая и приплюснутая; нос вдавленный; морда короткая; мех длинный и шелковистый на затылке, в других местах короткий. Глазницы узкие; щеки и морда голые; усы густые и пушистые, далеко заходящие на щеки и спускающиеся назад ниже ушей; подбородок с несколькими волосками, но без бороды. Голова, спина, бока и задняя часть рук и передних конечностей, а также бедер и голеней, верхняя и нижняя стороны основания и верхняя сторона остальной части хвоста - лисье-рыжие; плечи, грудь, передняя и остальные части передних конечностей, вся нижняя сторона тела, а также конечная часть хвоста и внутренняя сторона конечностей, со всеми кистями и ступнями, серые или серовато-белые, с черно-белыми кольцами шерсти. Обнаженные части лица и ушей, кисти и ступни фиолетово-телесного цвета; отчетливо выраженная черная надбровная дуга; белая полоса от глаза до заушья; черная полоса от надбровной дуги, идущая вниз по мочке носа и расширяющаяся на кончике; на верхней губе короткие усы из черных волосков; бакенбарды серовато-белые с желтым оттенком. Этот вид значительно различается по размеру и окраске.

У молодых животных серый цвет часто окрашен в рыжий.

Распространение. Западная Африка: Сенегал.

Привычки. — Патас в своем родном лесу живет большими отрядами, которые объединяются вместе, как записал Де Лабрю, против общего врага. Он рассказывает, что, когда он плыл по реке в своей лодке, пата из любопытства спустились к кончикам ветвей, но, понаблюдав за отрядом некоторое время, они бросали в них сухие ветки и другие подручные предметы, пока, наконец, некоторые из них не были застрелены. Это так разъярило выживших, что они удвоили свои атаки камнями и другими метательными средствами, издавая при этом самые ужасные крики. Мистер Мартин, от которого мы получили краткий отчет Де Лабрю, говорит, что этот вид живой в неволе, но очень злобный и капризный, его характер с возрастом ухудшается.

XX. НИСНАС ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ПИРРОНОТУС.

Cercopithecus pyrrhonotus, Конопля. et Ehrenb., Symb. Phys., pl. x. (1838); Джеффри., под ред. История. Nat., iii., стр. 307 (1849); Вагнер в "Säugeth." Шребера, v., стр. 42 (1855); Склейте, P. Z. S., 1871, стр. 623; 1893, стр. 250; Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 84 (1876).

Cercopithecus ruber, Rüpp., Neue Wirb. Säugeth., стр. 8 (1835); Мартин, Маммиф. An., стр. 509 (1841) (частично).

Ле Ниснас, Ф. Кювье, История. Нац. М., i., стр. 27 (1830).

Хлороцебус рубер, Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 25 (1870).

Characters.—Того же размера, что и *C. patas*, и очень похож на него. Мех над и на нижней части конечностей рыжеватый, а также на нижней части спины и нижней стороне хвоста, намного более темный и рыжеватый, чем в других местах; нос белый, а не черный, как у предыдущего вида; плечи и внешняя сторона рук рыжеватые, как и все остальное тело, а не серые, как у *C. patas*.

Распространение.—Северо-восточная Африка: Кордофан и Дарфур, до высоты 3000 футов над уровнем моря. Было заявлено, что экземпляр, обитавший в Зоологическом саду в 1882 году, был привезен из Сомали.

Родственным патам и ниснам является генон Петерса (*Cercopithecus ochraceus*, Peters, Reis. Моссамб. Säugeth., стр. 2, стр. 1a), из Керимбы, Мозамбик, у которого верхняя сторона желтоватая и, вероятно, он является разновидностью *C. pyrrhonotus*.

XXI. КРАСНОВАТО-ЗЕЛЕНый ГЕНОН. CERCOPITHECUS RUFO-VIRIDIS.

Cercopithecus rufo-viridis, Джеффри., C. R., xv., стр. 1038 (1842); id. Диктант. Hist. Nat., iii., p. 307 (1849); Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 78 (1876); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 258.

Хлороцебус руфовирусный, Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 25 (1870).

? *Cercopithecus flavidus*, Петерс, Рейс. Моссамб., стр. 3, стр. i.b.

Персонажи.Морда черная; большая лобная полоса белая; голова выше оливково—зеленая; спина зеленая с рыжиной, постепенно становящаяся ярко-рыжеватой, слегка испещренная черными пятнами по бокам тела между передними и задними конечностями; плечи и бедра серые с зелеными пятнами; остальная внешняя сторона конечностей серая; нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей белые; руки в черные крапинки; лапы сероватые; хвост темно-серый сверху, бледно-серый снизу.

Распространение и привычки.—Неизвестно. Форма, описанная Петерсом как *C. flavidus*, происходит из Мозамбика.

IV. Cercopithecini Melanochiri.

Виды, к описанию которых мы сейчас переходим, принадлежат проф. Раздел v. Шлегеля и *Cercopithecini melanochiri*доктора Склейте, у представителей которого руки и ноги черные или темно-серые, а от внешнего уголка глаз до ушей проходит черная полоса.

XXII. МОНА ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК МОНА.

Simia mona, Schreber, Säugeth., i., p. 97, pl. xv. (1775).

Cercopithecus mona, Erxleb. Система. Ренье А. Н., стр. 32 (1777); Джеффр., Диктант. История. Нац., стр. 304 (1849); Мартин, Маммиф. Ан., стр. 527 (1841); Вагнер, в сборнике Schreb. Säugeth. Дополнение, v., стр. 47 (1855); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 22 (1870); Шлег., Муз. Пайбас, vii., стр. 80 (1876); Склейте, Р. Z. S., 1893, стр. 250.

Ламон, Ф. Кювье, История. Нац. Мамм., i., livr. ix. (Août, 1819).

Персонажи. Макушка головы блестящая золотисто—зеленая, волосы у корней черные, кверху желтые и на концах черные; спина, бока тела, плечи и ляжки каштаново-коричневые с черными крапинками, у основания волосы серые, с красными или коричневыми и черными кольцами; лобная полоса бледно-зеленоватая; крестец, за исключением характерной эллиптической белой полосы с каждой стороны, у основания хвоста, черный; кисти и ступни, а также внешняя сторона ног, бедра и передние конечности черные. нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей чисто белые, отделенные резкой линией от цвета внешней поверхности; поперечная черная полоса над бровями, проходящая от внешнего уголка глаз до ушей; обнаженные части лица, уши и кисти бледно—телесного цвета; густые усы, покрывающие большую часть щек, спускающиеся по бокам и нижней части шеи, бледно-желтые, с черными отметинами.

Белые полосы по бокам хвоста, на крупе и белая лобная полоса отличают этот вид от всех остальных.

Распространение. Западная Африка: Камерун.

XXIII. ГЕНОН САЙКА. *CERCOPITHECUS ALBIGULARIS*.

Semnopithecus albogularis, Сайкс, Р. Z. S., 1831, стр. 106.

Cercopithecus albigularis, Сайкс, Р. Z. S., 1832, стр. 18; Оуэн, Р. Z. S., 1832, стр. 18 (анатомия); Мартин, мамм. Ан., стр. 512 (1841); Фрейзер, Зоол. Тип., pl. ii. (1848); Wagner in Schreb. Säugeth. Дополнение, v., стр. 45 (1855); Грей, Кат. Обезьяны брит. Муз., стр. 24 (1870); Шлег., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 79 (1876); Правда. Пр. США, нац. Mus., xv., стр. 448 (1893); Sclater, Р. Z. S., 1893, стр. 251; Matschie, S.B., нац. фр. Берл., 1893, стр. 215; Thomas, Р. Z. S., 1894, стр. 137.

Cercopithecus erythrarchus, Петерс, Рейс. Mossamb. Säugeth., p. 1, pl. i.; Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 77 (1876); Кирк, Р. Z. S., 1864, стр. 649; Реувенс, Зоол. Гарт., xxx., стр. 207 (1889); Аудем, указ. соч., xxxi., стр. 267 (1890); Scl., Р. Z. S., 1893, стр. 249 (женский).

? *Cercopithecus monoides*, Джеффри, арх. du Mus., ii., стр. 558, стр. 31 (1841); id., С. R., xv., стр. 1038 (1842); id., Дикт. История. Nat., iii., стр. 303 (1849); Scl., Р. Z. S., 1893, стр. 256.

Персонажи. — Мужчина. Голова округлая, короткая; уши маленькие, округлые и почти скрытые длинной шерстью на голове; глаза глубоко посаженные; волосы на надбровных дугах длинные; усы густые и пушистые; бороды нет; лицевой угол большой; щечные мешки маленькие, но отчетливые, не заметны даже при наполнении, скрыты густыми бакенбардами; большие пальцы короткие; большие пальцы ног длинные; очень маленькие мозоли; хвост вдвое длиннее тела. Гортань с обычными двумя широкими боковыми мешочками и средним мешочком, выступающим вперед примерно на три дюйма под кожей шеи и сообщающимся с гортанью большим отверстием.

Вся верхняя поверхность черная с примесью желтого, волоски черные, окаймленные коричневатожелтыми полосками. Лицо, щеки и губы черные; плечи, передние и задние конечности (окрашенные в желтоватый цвет) черные из-за отсутствия желтых полос, которые

преобладают на спине и боках; нижняя сторона тела черная с белыми крапинками; подбородок и горло белые; на бедрах белых пятен нет; хвост черный.

Самка.— Отличается от самца меньшими размерами и тем, что крестец, верхняя и нижняя стороны основания хвоста, область вокруг заднего прохода и задняя сторона верхней части бедер и рук сильно окрашены в красновато-коричневый цвет. Нижняя сторона тела и внутренние стороны конечностей беловатые— волоски на концах окаймлены черными и серовато-желтыми кольцами. Он был описан как *Cercopithecus erythrarchus* Питерсом и другими авторами.

Распространение.— Западная Африка: Золотой берег (*Pel*); также говорят, что добыт в Конго. Восточная Африка: Мозамбик; считается, что их много около мыса Корриентес (*Петерс*). Доктор Питерс и сэр Дж. Кирк также указали Килиман и Нижнюю Замбези в качестве местообитаний. Мистер Х. Х. Джонстон, его Превосходительство комиссар в земле Ньяса, отправил его с плато Миланджи, где он находится на высоте от 3000 до 6000 футов над уровнем моря. Одно время предполагалось, но совершенно ошибочно, что этот вид происходит с Мадагаскара.

ФОТО XXIX.



"ГЕНОН" БУТУРЛИНИ.

Привычки.—Эту обезьяну очень часто привозят живой в Европу, и почти все, что мы знаем о ее повадках, было получено из наблюдений за ней в неволе. Полковник Сайкс, который первым завез этот вид в Англию и описал его, говорит, что "его манеры в неволе серьезны и степенны. Характер у него мягкий, но не привязчивый; и хотя он лишен той капризной капризности и озорной вспыльчивости, характерных для столь многих африканских видов, все же он быстро обижается на раздражающее обращение и выказывает свое негодование очень ловкими ударами передних рук. Он никогда не кусал никого на борту корабля, но так серьезно разорвал трех обезьян, своих попутчиков, что две из них скончались от полученных ран. Он охотно поедает мясо

и предпочитал обгладывать кости, даже когда их обильно снабжали овощами и сухофруктами ". Другая особь, замеченная мистером Огилби, проявляла такую же антипатию к другим обезьянам.

XXIV. ГЕНОН БУТУРЛИНИ. ЦЕРКОПИТЕК БУТУРЛИНИЙ.

(Фото XXIX.)

Cercopithecus boutourlinii, Джильоли, зоол. Anz., x., стр. 510 (1887); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 256, 441.

Cercopithecus albigularis, Джильоли, Ann. Mus. Генов. (2), vi., стр. 8 (1888).

Персонажи.—**Мужчина.** Шерсть на теле длинная и грубая; верхняя поверхность черная, с бледно-красноватыми кольцами, за исключением линии между лопатками, которая почти черная; уши почти обнаженные, с внутренним волосистым обводом; нос, верхняя губа, подбородок и горло чисто белые; остальная нижняя поверхность, конечности и хвост черные, за исключением основания хвоста, на котором, как и на спине, по всей окружности волоски в кольцах. Длина тела 21 дюйм; хвоста 24 дюйма. (Склейте.)

Женский.—Почти такой же, но меньшего размера, и у него волосы менее окольцованы на спине и голове. (Склейте.)

Отличается от *C. albigularis* белым носом и верхней губой, черной нижней поверхностью и более черными конечностями.

Распространение. Северо-восточная Африка: Каффа, провинция к югу от Шоа; и Гимма, провинция в Центральной Абиссинии, к югу от Годжана.

XXV. ГЕНОН КЭМПБЕЛЛА. ЦЕРКОПИТЕК КАМПБЕЛЛИ.

Cercopithecus campbelli, Waterh., P. Z. S., 1838, стр. 61; Фрейзер, Зоол. Тип., стр. iii. (1848); Мартин, Маммиф. An., p. 544 (1841); Wagner in Schreber Säugeth. Дополнение, v., стр. 47 (1855); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 24 (1870); Шлегель, Муз. Пайбас, vii., стр. 82 (1876); Джентинк, Заметки, Лейденский музей, x., стр. 9 (1888); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 251.

Cercopithecus burnetti, Грей, Ann. N. H., x., стр. 256 (1842).

Персонажи.—Мех длинный, на задней части спины длиннее, чем спереди, разделен вдоль спины — волосы черные с широкими желтыми кольцами. Морда иссиня-черная; губы телесного цвета; полоса на лбу белая, с рыжевато-черными волосками на концах; голова до затылка желтовато-коричневая; передняя часть спины коричневатая-черная, нижняя часть спины, внешняя сторона задних конечностей, передние конечности и прикорневая треть хвоста оливково-черные, с желтыми краями; длинная шерсть на щеках и боковой стороне шеи, которая частично скрывает уши, серовато-белая, с кольцами на кончиках с черным и желтым; внутренняя сторона ушей покрыта длинными серыми волосками с желтыми крапинками; грудь, горло, нижняя сторона тела, внутренняя сторона конечностей и передняя часть бедер белые; задние две трети хвоста желтовато-серые, волосы окаймлены черным и блекло-желтым, волосы с нижней стороны коричневые и серые; кончик хвоста с небольшим черным хохолком.

Распространение. Западная Африка: от Сьерра-Леоне до Золотого побережья.

Привычки.— Это самая распространенная обезьяна как во внутренних районах, так и на побережье этого региона Африки. Он часто обитает на небольших деревьях в лесу стоями по пятьдесят и более особей, а иногда даже по собственной воле забирается в воду.

XXVI. ГЕНОН САМАНГО. ЦЕРКОПИТЕК САМАНГО.

Церкопитек саманго, Сундев. Офверс. К. Вет.-акад. Förh. Stockh., i., p. 160 (1844); Wagner in Schreber Säugeth. Дополнение, v., стр. 44 (1855); Петерс, Рейс. Mossamb., Säugeth., стр. 4; Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 24 (1870); Шлегель, Муз. Pays-Bas, vii., стр. 79 (1876; частично); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 251.

Характеры.— Отличается грязно-белым оттенком вдоль прикорневой половины хвоста, за исключением средней линии верхней стороны, которая черная; конец хвоста черный. Спина полностью черновато-оливковая — волосы желтовато-оливковые, окаймленные черным; внутренняя сторона конечностей и вся нижняя поверхность от рук до подбородка грязно-белые; внешняя поверхность рук черная, ног серая; ступни черные; уши покрыты беловатыми волосками.

Распространение,— Южная и Восточная Африка: Натал и Мозамбик; простирается до Анголы на западе.

XXVII. БЕЛОГУБЫЙ ГЕНОН. *CERCOPITHECUS LABIATUS*.

Cercopithecus labiatus, Джеффри., C. R., xv., стр. 1038 (1842); id., Диктант. d'Hist. Nat., iii., стр. 302 (1849); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 256.

Cercopithecus samango, Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 79 (1876; частично).

Персонажи. Густой мех; пучок длинных волос, направленных назад на щеках; внутренняя сторона ушей покрыта рыжевато—серыми волосками; верхняя сторона тела темно-серая с бледно-оливково-желтыми крапинками; макушка головы черная с желтовато-зелеными крапинками; лоб и челюсти зеленовато-желтые с черными крапинками; черное пятно на морде над впадиной губ; остальные губы и область рта белые; внешняя сторона передних конечностей, кистей и ступней черные; внешняя сторона задних конечностей серовато-коричневый; нижняя сторона тела блекло-белая; внутренняя сторона конечностей пепельно-серая; вокруг заднего прохода и большей части нижней стороны хвоста бледно-желтовато-коричневые; верхняя сторона хвоста на том же расстоянии красновато-черная; остальная часть черная.

Распространение и привычки.—Неизвестно.

XXVIII. ПЕСТРЫЙ ГЕНОН. *CERCOPITHECUS OPISTHOSTICTUS*.

Cercopithecus opisthostictus, Scl., P. Z. S., 1893, стр. 725.

Персонажи. Спина черная с бледно-серыми крапинками; голова темнее; задняя часть шеи, плечи, внешняя сторона рук и ног и хвост (кроме его основания) черные; по небольшому пятну на нижней части спины с каждой стороны хвоста рыжевато-коричневого цвета; нижняя сторона черноватая. Длина тела 24 дюйма; хвоста 25 дюймов. (*Склейте*.)

Распространение.—Британская Центральная Африка: недалеко от озера Мверу.

Привычки.—Неизвестно. Кожа этой обезьяны используется местными жителями для изготовления одежды, и по образцам, собранным мистером А. Шарпом, вице-консулом Х.Б.М. в Южной части страны Ньяса, во время его путешествия от северной оконечности озера Ньяса к озеру Мверу и Луапуре, этот вид был описан доктором П. Л. Склейте.

XXIX. ГЕНОН ЛЕСТНИЧНЫЙ. CERCOPITHECUS STAIRSI.

Cercopithecus stairsi, Sclater, P. Z. S., 1892, стр. 580, pl. xl.; 1893, стр. 252, 443 и 612.

Персонажи.—**Взрослый мужчина.** Лицо черное, за исключением кольца вокруг глаз, которое телесного цвета; кончик носа и полоса над глазами от уха до уха черные, увенчанные другой полосой длинных стоячих желтовато—белых волос; уши голые; бакенбарды пушистые, серовато-белые, с зеленовато-желтым оттенком; по бокам лба за ушами проходит ярко-каштановая полоса; затылок, затылок и передняя часть спины серые, с черными полосами и с желтоватым оттенком; задняя часть плеч темная. серый; спина, особенно нижняя часть, желтовато-серая, с рыжеватым пятном на крупе над хвостом; внешняя поверхность рук черновато-серая; кисти черные; внешняя сторона ног серая; ступни не такие черные, как кисти; анальная область и примерно три дюйма основания хвоста рыжевато-желтые; мошонка темно-индигово-синяя; горло, нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей молочно-белые; вся шерсть на верхних частях слегка поседела. Длина тела 18 дюймов; хвост поврежден. (*Склейтер.*)

Молодая самка.— Отличается от самца более светлой окраской; спина ниже затылка, бока, бедра, голени и верхняя поверхность прикорневой трети хвоста охристо-желтого цвета с рыжеватым оттенком; плечи и передние конечности серые; кисти и ступни черные, нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей и горло (где длинные волоски) молочно-белые; конечные две трети хвоста черновато-серые, более темные на кончике.

Каштановые ушные пятна у обоих полов этого вида отличают его от всех остальных.

Распространение.—Дельта Замбези. Типичный экземпляр (которым является описанная выше самка) был передан, как сообщает нам доктор Склейтер в своем первоначальном отчете об этом прекрасном виде, мистером Хильером из Чинди доктору Молони (лейтенант. Экспедиция Лестера). Последний привез его домой живым и подарил в 1892 году в сады Зоологического общества, где он жил до начала 1893 года. Типовой экземпляр сейчас находится в Британском музее. Второй экземпляр, взрослый самец (описанный выше), был представлен Обществу в июне 1893 года мистером Ф. Хинцем, чей брат привез его из Мозамбика и содержал в неволе восемь лет.

Привычки.—Неизвестно.

XXX. ГЕНОН МОЛОНИ. CERCOPITHECUS MOLONEYI.

Cercopithecus moloneyi, Sclater, P. Z. S., 1893, стр. 252, стр. xvii.

Персонажи.—Родственник *C. samango*, но крупнее; шерсть сверху длинная, оливкового цвета, с черными крапинками; голова темнее; широкая полоса, покрывающая середину и поясницу, и основание верхней части хвоста рыжевато—волосистая с черными кольцами; руки снаружи от плеч до кистей и внутри нижней части передней руки черные; внешняя сторона бедер и голеней черновато-серая, кзади желтоватая; хвост, за исключением самого кончика, темно-черный; лицо, губы, и уши голые и черные; рыжеватая полоса на лбу над глазами; бока головы рыжеватые, в черные крапинки; горло кремово-желтое; нижняя сторона тела бледно-рыжеватая, волосы окаймлены черными кольцами; внутренняя сторона рук, бедер и верхняя часть ног серовато-рыжеватые; ступни черные. Длина тела 28 дюймов; хвоста 26 дюймов.

Распространение.—Британская Центральная Африка. Добыто у туземцев Н-Конде и привезено из Каронги, на северной оконечности озера Ньяса, доктором Молони.

Привычки.—Неизвестно.

XXXI. SCHLEGEL'S GUENON. CERCOPITHECUS NEGLECTUS.

Cercopithecus leucocampyx (некроз Фишера), Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 22 (1870).

Cercopithecus neglectus, Schlegel, Mus. Пайбас, vii., стр. 70 (1876); Джильоли, Зоол. Anz., x., стр. 510 (1887); Scl., P. Z. S., 1893, стр. 253.

Персонажи. Общая окраска серовато-коричневая, с мелкой проседью; нижняя сторона тела черная; макушка, внешняя сторона конечностей и основание хвоста черные; передняя сторона бедер и полоса на бедрах белые.

Отличается от настоящего *C. leucampyx* по цвету передней поверхности бедер и окаймленному бедру.

Распространение. — Белый Нил, где его добыл консул Петерик.

XXXII. ДИАДЕМА ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ЛЕВКАМПИКС.

Simia leucampyx, Фишер, Syn. Mamm., стр. 20 (1829).

Le Diane femelle, F. Cuv., Hist. Nat., Mamm., livr. xlii. (Июнь 1824 г.).

Cercopithecus diadematus, Джеффри. in Bélanger, Voy. Зоол. стр. 51 (1834).

Cercopithecus leucampyx, Мартин, мама. An., стр. 529 (1841); Джеффри., под ред. Унив. Hist. Nat., iii., p. 304 (1849); Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 83 (1876); Джильоли, Зоол. Anz., x., стр. 510 (1887); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 253 (♀).

Cercopithecus pluto, Грей, P. Z. S., 1848, стр. 56, стр. iii.; 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 23 (1870); Вагнер в "Шребе". Säugeth. Дополнение., v., с. 48 (1855); Склейте, P. Z. S., 1870, с. 670, 1871, с. 36, 1892, с. 97.

Персонажи. Лицо, нос и губы черные; бакенбарды округлые и пушистые; бороды нет; мех длинный и жесткий; телосложение крепкое и мощное; бакенбарды седеют, волосы обрамлены черным и белым; на лбу, над глазами широкая белая полоса (или диадема); спина за плечами, бока и ляжки, а также задняя сторона бедер серо—серые, волосы обрамлены многочисленными зеленовато-белыми и черными полосками; хвост у основания серый, остальное черное; несколько желтоватых волосков на мозолях, но все остальное тело темно-черного цвета. Длина тела - 23 дюйма; хвоста - 21.

Распространение. — Западная Африка: Ангола и Конго до земли Ньяса.

Привычки. — Неизвестно.

V. *Cercopithecus Auriculati*.

Следующие три вида образуют пятую группу генонов, отличающихся желтоватыми или рыжеватыми ушными пучками и тремя черными линиями на лбу.

ТАБЛИЧКА XXX.



"ГЕНОН" ЭРКСЛЕБЕНА.

XXXIII. ГЕНОН ЭРКСЛЕБЕНА. ЦЕРКОПИТЕК СЕРЫЙ.

Серый церкопитек, Фрейзер, Кошка. Знает. Coll., стр. 8 (1850); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 22 (1870); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 256.

Cercopithecus erxlebenii, Дальб. et Puch., Rev. et Mag. de Zool., 1856, с. 96; 1857, с. 196; Дальб., Зоол. Stud., стр. 109, стр. 5 (1856); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Monkeys Brit. Mus., стр. 23 (1870; частично); Склейте, P. Z. S., 1871, стр. 36; 1893, стр. 254; 1894, стр. 484.

Cercopithecus pogonias, Schlegel, Mus. Pays-Bas, vii., стр. 82 (часть).

(Фото XXX.)

Персонажи. Морда и уши голые, телесного цвета; усы, начинающиеся под глазами, пушистые, желтые; уши с рыжеватым или желтым хохолком внутри; голова желтая, но прерываемая тремя широкими черными полосами, идущими над каждым глазом и от носа к затылку; спина, передняя сторона бедер и бока желтовато—рыжие, к нижней части спины темнее - волоски в черно-желтых кольцах, верхняя поверхность и вся конечная треть хвоста черные. Нижняя поверхность тела, внутренняя сторона конечностей, передняя поверхность бедер и голеней и нижняя сторона двух третей основания хвоста желтые или рыжевато-желтые; область заднего прохода белая; внешняя сторона передних конечностей черная; кисти и ступни черные.

Самка этого вида, которая несколько лет жила в зверинце лорда Дерби в Ноусли и умерла в 1836 году, сейчас находится в музее Дерби в Ливерпуле. Это вид *C. grayi*, с которым идентичен *C. erxlebeni*.

Распространение. Западная Африка: река Конго.

XXXIV. БОРОДАТЫЙ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ПОГОНИАС.

Cercopithecus pogonias, Bennett, P. Z. S., 1833, p. 67; Wagner in Schreber Säugeth. Дополнение., v., стр. 43 (1855); Урок, Спец. Мама., стр. 74 (1840); Мартин, Маммиф. Ан., стр. 543 (1841); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 23 (1870); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 254; Шлегель, Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 82 (1876).

Характеры.—Похож на *C. grayi*, но отличается тем, что желтый лоб прерывается посередине всего несколькими черными волосками, а не полосой; усы бледнее; задняя часть головы, передняя часть спины и бока седые, волосы черные, окаймленные белым; в то время как по середине спины до основания хвоста проходит широкая черная полоса.

Распространение.—фернандо По.

XXXV. ЧЕРНОНОГИЙ ГЕНОН. CERCOPITHECUS NIGRIPES.

Cercopithecus nigripes, Du Chaillu, Пр. Бост. N. H. Soc., vii., стр. 360 (1860); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; Scl., P. Z. S., 1893, стр. 254.

Cercopithecus erxlebenii, вар. *черно-полосатый*, Серый, кошачий. Обезьяны, брит. Муз., стр. 23 (1870).

Cercopithecus pogonias, Schlegel, Mus. Pays-Bas, vii., стр. 182 (1876).

Персонажи.—Очень похож на *C. pogonias*, но отличается более темным цветом и более широкой спинной полосой внизу. Вероятно, это всего лишь разновидность предыдущего.

Распространение.—Габун, где он был обнаружен Дю Шайю.

XXXVI. ВОЛЧИЙ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ВОЛЬФИ.

Cercopithecus wolffi, Мейер, Заметки, Лейденский музей, xiii, стр. 63 (1891); id., P. Z. S., 1894, стр. 83, стр. vii.; Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 258.

Персонажи. Лицо, за исключением губ, телесного цвета, а виски серовато-черные; желтовато-белая полоса поперек лба от уха до уха; усы серовато-желтые; хохолки на ушах красновато-коричневые; верхняя поверхность темно-грифельно-серая; бока сине-серые, волосы окаймлены несколькими светлыми кольцами и с черными кончиками; спинная полоса, сужающаяся к хвосту, оливково-желтоватая, ярче на макушке и коричневато-желтая к хвосту; прикорневая половина хвоста вверху пепельно-серая, внизу белая; оранжево-желтые пятна по бокам; подбородок, боковые стороны шеи, нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей белые; живот слегка окрашен в оранжевый цвет; плечи и внешняя сторона передней конечности черные - волосы обрамлены сединой; на заднем крае передних конечностей полоса цвета охры; внешняя сторона бедер и голеней ярко-красно—коричневая, становящаяся оранжевой по переднему и заднему внутреннему краю. Длина тела 18 ¼ дюйма; хвоста 24 дюйма.

Распространение.—Западная Африка: точная местность неизвестна.

VI. Cercopithecus Barbati.

Представители этой группы отличаются наличием бороды и лобного гребня.

XXXVII. ДИАНА ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ДИАНА.

Симия диана, Линн., Сист. Нац., i., стр. 38 (1766).

Церкопитек дианский, Erxleb., Sist. Regne An., стр. 30 (1777); Desmar., Mamm., стр. 60 (1820); Martin, Mammif. An., стр. 523 (1841); Джеффр., Диктант. Hist. Nat., iii., стр. 304 (1849); Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение, v., стр. 48 (1855); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 22 (1870; pt.); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 92 (1876; pt.); Джентинк, Заметки, Лейд. Музей, x., стр. 12; Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 254.

Cercopithecus diana, var. *ignita*, серая, Кошка. Обезьяны Брит. Муз., стр. 22 (1870).

Персонажи.—Лицо черное. Стороны лица с длинными густыми бакенбардами, заканчивающимися на подбородке заостренной белой бородкой длиной в несколько дюймов; поперек лба проходят две дугообразные линии прямых волос, нижняя черная, верхняя белая; макушка головы, задняя часть шеи, плечи, бока, середина живота пепельно-серые — волосы в белых и черных кольцах и с белыми кончиками; внешняя сторона конечностей более темная, кисти черные; хвост серый, кончик черный; шея, грудь и передняя часть рук белые; от середины спины глубокое каштановое пятно. вытягивается и расширяется к основанию хвоста; от основания хвоста внешняя сторона бедер белая; задняя часть нижней стороны тела и внутренняя сторона бедер оранжево-желтые, или оранжево-красные, или ярко-рыжие гнедые (*C. ignita* серого цвета). Длина тела - 18 дюймов; хвоста - 24 дюйма.

Распространение.—Западная Африка: от Либерии до Конго.

Привычки.—Эта красивая и грациозная обезьяна не редкость в неволе, и почти все, что мы знаем о ее повадках, было получено от таких особей. "Как и остальные представители его племени, - пишет мистер Мартин, - в молодости он нежен, оживлен, активен и фамильярен, но с возрастом становится замкнутым и вероломным.... Его хохолок из седых волос на лбу и белая остроконечная борода "официальной стрижки" придают необычный вид его физиономии. По словам мистера Огилби, было замечено, что это последнее украшение тщательно поддерживается в чистоте; собираясь выпить, оно с поразительной серьезностью берет бородку в руку и придерживает ее, чтобы она не опустилась в жидкость".



"ГЕНОН" ДЕ БРАЗЗЫ.

XXXVIII. ПАЛАТИНСКИЙ ГЕНОН. ЦЕРКОПИТЕК ПАЛАТИНСКИЙ.

Le Roloуэй ou la Palatine, Буфф., Хист. Нац. Дополнение, xv., стр. 77 (1789).

Cercopithecus roloway, Erxleb., Sist. Régn. An., стр. 42 (1777); Жоффр., Под ред. Hist. Nat., iii., p. 304 (1849); Fisch., Synop. Мама., стр. 20 (1829).

Палатинский церкопитек, Вагнер, в Шребе. *Säugeth. Дополнение.*, v., стр. 47 (1855); Сл., P. Z. S., 1893, стр. 257.

Церкопитек диана, Серый, Кошка. Обезьяны Брит. Муз., стр. 22 (1870; пт.); Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 92 (1876; пт.).

Персонажи.—Очень похож на *C. diana*, но отличается тем, что спина очень темно-коричневая, почти черная, вместо каштановой; голова, бока, бедра, конечности темно-серые; там, где брюхо у *C. diana* черное, у *C. palatinus* оно белое.

Распространение.—Золотой берег.

XXXIX. ГЕНОН ДЕ БРАЗЗА. ЦЕРКОПИТЕК БРАЗЗА.

(Фото XXXI.)

Cercopithecus brazzae, Милн-Эдвардс, Rev. Sc. (3), xii., стр. 15 (1886); Склейте, P. Z. S., 1893, стр. 255, 443, pl. xxxiii.

Персонажи.Верх головы, спина, бока морды, внешняя сторона бедер и основание хвоста светло—рыжие, с густыми черными кольцами; лобная полоса из густых стоячих волос, каштановая, с белыми кончиками, окаймленная сзади широкой черной полосой от уха до уха; уши почти голые; верхняя часть носа и узкая линия над глазами, перед каштановой полосой, черные; нижняя часть носа и верхняя губа белые; длинноватая белая борода на подбородке и горле; живот темно-рыжий, волосы в густых черных кольцах; руки и ноги черные. Внутренняя сторона бедер, руки и полоса вдоль задней поверхности бедер белые; хвост, за исключением основания, черный. Длина 21 дюйм; хвост 22 дюйма. (Склейте.) Близкий родственник *C. neglectus*.

Распространение.—Западная Африка: Верхняя часть Конго.

VII. *Cercopithecus Trituberculati*.

Эта секция семейства содержит всего один вид, отличающийся тем, что задние нижние коренные зубы имеют только три бугорка на коронках вместо четырех. По этой причине некоторые систематики рассматривали его как тип отдельного рода, *Miopithecus*.

XL. ТАЛАПОИН. *CERCOPITHECUS TALAPOIN*.

(Фото XXXII.)

Талапойн, Бүфф., Hist. Nat., xiv., стр. 287, pl. xl. (1766).


Cercopithecus talapoin, Erxleb., Сист. Rég. Anim., стр. 36, № 15 (1777), Джеффр., Ann. Mus., xix., стр. 93 (1812); Десм., Мамм., стр. 56; Мартин, Mammif. Anim., p. 534 (1841); Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 71 (1876).

Симия талапойн, Gm., Sist. Nat., i., стр. 101 (1788); Шребер, *Säugeth.*, i., стр. 101, № 18, стр. 17; Фишер, Синописис. Мама., стр. 21 (1829).

Cercopithecus pileatus, Desm., Mamm., стр. 57 (1820; нек Шоу).

Miopithecus talapoin, Джеффри., Диктант Нац. История., iii., стр. 308 (1849); Грей, Кот. Обезьяны Брит. Муз., стр. 20 (1870).

ТАБЛИЧКА XXXII.



ТАЛАПОЙН.

Miopithecus capillatus, Джеффри., С. R., xv., стр. 720 (1842)

Обезьяна мелархинус, Шинц, Краткое описание. Мамм., i., стр. 47 (1844).

Персонажи. Небольшого размера; голова шаровидной формы; морда очень короткая; глаза большие; уши очень расширенные; нос, но слегка выступающий, с продолговатыми ноздрями, открывающимися с боков, перегородка толстая; руки короткие, пальцы соединены перепонкой.

Череп крупный; надбровные дуги и орбиты также большие; задние коренные зубы на обеих челюстях маленькие; на нижней челюсти только трехзубчатые (два острия спереди, один сзади); передние и средние нижние коренные зубы четырехзубые.

Обнаженная кожа вокруг глаз оранжевая; верхняя губа желтая; усы направлены книзу, ярко-соломенно-желтые; верхние веки белые; нос черный; уши голые, черные; волосы на лобной части стоячие, образующие отчетливый изогнутый гребень. мех оливково-зеленый в крапинку — волосы седые у корней, оливково-зеленые в середине и с черными кончиками; мех на теле темнее, бледнее и более желтоватый на внешней стороне тела и верхней стороне рук и ног. Нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей белые; хвост пепельно-серый. Длина тела 13 с половиной дюймов.

Распространение. Западная Африка: Габун.

Привычки. — Ничего не известно о повадках этого редкого вида, который является самым маленьким из генонов.

ГЕРЕСЫ И ЛАНГУРЫ. — ПОДСЕМЕЙСТВО СЕМНОПИТЕКОВЫХ.

Внешне представители этого подсемейства характеризуются удлинённым стройным телом, задней парой конечностей длиннее передней и очень длинным хвостом. Внутренне их пищеварительные органы отличаются от таковых у *церкопитековых*, желудок в три раза больше,

чем у любого генона того же размера. Вместо того, чтобы быть простым округлым мешком, он удлинённый и состоит из нескольких мешочков. Однако эти отделения сильно отличаются от тех, которые можно увидеть в желудке жвачных животных, например, быка. У последнего каждый из различных отделов устроен по-разному, и его слизистая оболочка своеобразно изменена; у генона она разделена на две части, левая из которых образует очень значительную полость, в то время как правая длинная и узкая. Две большие, сильные мышечные полосы проходят по всей его длине, одна вдоль большей, другая вдоль меньшей кривизны, подобно мышцам толстого кишечника, образуя ряд крупных клеток. (*Отто.*) В дополнение к этому весь орган закручивается на себя, так что входная и выходная области оказываются близко друг к другу. Его слизистая оболочка на всем протяжении имеет одинаковый характер и форму. У цекума нет *червеобразного отростка*, или червеобразной трубки, которая является представителем (как у человека) удлинённой цекумы, встречающейся у лемуroidов, как и у большинства млекопитающих. Морда у представителей этого подсемейства очень короткая, а нос, как правило, слегка выступающий. У лангуров есть седалищные мозоли, но нет щечных мешочков, хотя у некоторых герез (*Colobus*) были описаны небольшие мозоли. При наличии гортанных мешочков они сформированы из единого мешка со срединным отверстием в трахее, в пространстве ниже ее верхнего отверстия; он может иметь большие продолжения по передней поверхности шеи вплоть до подмышечных впадин.

Лобная часть черепа округлая, а лицевой угол сравнительно большой. Восходящая часть задней части каждой половины нижней челюсти высокая, а ее самый задний коренной зуб с каждой стороны имеет по пять острых выступов на коронке. Грудная кость у них очень узкая. Позвонки, образующие хвост, сильно удлинены. У всех есть центральная кость (*os centrale*) в *запястье* (или лучезапястье).

Задние доли головного мозга выступают за пределы мозжечка и скрывают его; у лангуров они очень короткие. Представлены основные бороздки и складки, наблюдаемые в человеческом мозге, и совершенно отчетливо виден *малый гиппокамп*— возвышение в полости задней доли, которое долгое время считалось признаком, присущим человеческому мозгу, и наличие или отсутствие которого когда-то было известной причиной разногласий между некоторыми выдающимися анатомами.

Пища *семнопитековых*, которую они потребляют в большом количестве за раз, состоит в основном из листьев и молодых побегов деревьев. С этой целью их мешковатый желудок образует необходимоеместилище и запас для пищи во время ее поспешного сбора.

Подсемейство практически состоит всего из двух родов -*Colobus* и *Semnopithecus*. Один вид, образующий третий род (*Nasalis*), тесно связан с последним. *Колоби* обитают только в Африке, а *семнопитеки*, которых существует большое количество видов, населяют материковую часть Индии, полуостров Малайя и соседний архипелаг, простирающийся на восток только до *линии Уоллеса*, которая проходит между островами Бали и Ломбок, и на север, к востоку от Борнео.

ГЕРЕСЫ. РОД COLOBUS.

Колобус, Иллигер, Продр. Система. Мама., стр. 69 (1811).

Гересы - группа обезьян, полностью обитающая на африканском континенте. Особенностью, которая особенно отличает их от лангуров, которые (за исключением монотипичных носатых обезьян Борнео) образуют остальных представителей подсемейства, является состояние их больших пальцев. У этих животных большой палец практически отсутствует, будучи либо совершенно невидимым внешне, либо представляя собой просто бугорок, на котором может быть ноготь, а может и не быть. Кисти длинные и прямые, ногти на пальцах сжатые и заостренные. У

этих животных тело стройное, хотя и несколько более крепкое, чем у *семнопитеков*. Лицо голое или покрыто только редким и мягким пушком, ноздри разделены широкой перегородкой. Из-за этой особенности некоторые натуралисты описали этих обезьян как платириновых или мегарриновых. Уши закруглены сверху, с заостренным или квадратным задним верхним углом, и обычно голые, но иногда покрыты шерстью или хохолком внутри. Все гересы имеют особенно удлинённый хвост, который часто с хохолком на конце. Их мех длинный и немного более жесткий, чем у лангуров, но он не обрамлен полосами другого цвета. Их мозоли большие и голые.

Череп у *колобусов* и *семнопитеков* очень похожи по форме; но череп первых часто длиннее, крупнее и обладают большей вместимостью черепа, чем у *семнопитеков*. Морда короткая, а на заднем коренном зубе нижней челюсти пять бугорков. Большие пальцы, даже когда они явно отсутствуют, представлены под кожей единственной костью - фалангой пальца, которая сочленяется непосредственно с пястной костью. Гересы отличаются от генонов тем, что у них очень маленькие щечные мешочки и нет гортанных мешочков. Их желудок имеет поперечную мешковатость, как верхняя часть толстого кишечника в организме человека.

Гересы, которые представляют азиатских лангуров, населяют Тропическую Африку, простирающуюся от Абиссинии и Занзибара на востоке до Сенегамбии, Анголы и, возможно, острова Фернандо-По на западе - примерно между 15 ° Северной широты. с восточной и 12° с западной стороны, до 10° южной широты. Они живут небольшими отрядами в лесах, как на равнинах, так и в горах, их пища состоит из фруктов, но главным образом из листьев, которые они едят в больших количествах, на что указывает своеобразная и вместительная форма их желудка, похожего на хранилище, вместо щечных мешочков.

Об их привычках в их родном штате действительно известно очень мало, поскольку они предпочитают держаться на больших деревьях в лесах вдали от человеческого жилья; в то время как из-за их очень хрупкого телосложения, позволяющего им очень короткое время противостоять суровым условиям климата, более холодного, чем их собственный, о них в неволе почти ничего не известно. Прекрасные шкуры многих представителей этого вида являются важным предметом торговли в Европе и Америке для украшения костюмов самых утонченных и культурных дам, которые соперничают за обладание ими с полуобнаженными воинами-варварами Экваториальной Африки, которые также используют их в качестве украшений для своей персоны и для украшения своего оружия.

ГЕРЕЗА И. ВАН БЕНЕДЕНА. НАСТОЯЩИЙ КОЛОБУС.

Настоящий колобус, Van Bened., Бычок. Acad. Sc., Brux., v., стр. 344, стр. 13 (1838); Менше., Спец. Мамм., стр. 70 (1840); Мартин, Маммиф. Anim., стр. 503 (1841); Джеффр., Кат. Méth. Приматы, стр. 17, № 4 (1851); Вагнер в "Шребере", Саутет. Дополнение, v., стр. 37 (1855); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 182; Сл. Pays-Bas, vii., стр. 28 (1876).

Семнопитек (Колобус) оливковый, Вагнер, в "Саутете" Шребера. Дополнение, i., стр. 309 (1840).

Colobus cristatus, Серый, Ann. and Mag. N. H. (3), xvii., стр. 77 (1866); id., P. Z. S., 1886, стр. 182, pl. xv.; id., Cat. Обезьяны Брит. Муз., стр. 19, и доп., стр. 128 (1870).

Procolobus verus, речебрюхий, фавн. Sénég., Мамм. Дополнение, стр. 97, стр. 1 (1887).

Персонажи. Тело крепкое; конечности крепкие; голова овальной формы, морда слегка выдающаяся; лицо и уши голые, коричневатые-черные; большой палец полностью отсутствует; мозоли большие. Шерсть на макушке, образующая срединный гребень, красновато-оливковая;

бакенбарды, направленные назад, бледно-желтые; над глазами фронтальная полоса того же цвета, сливающаяся с бакенбардами напротив глаз; верхняя часть тела до основания хвоста и до колен покрыта короткой темно-оливково-коричневой шерстью, с мелкими черными кольцами и рыжеватым отливом на задней поверхности шеи и на внешней стороне бедер; хвост длинный и тонкий, оливково-коричневый или коричневатого-серый; плечи, бока и внешняя поверхность конечностей, бледно-серовато-зеленый; верхние стороны кистей и стоп красновато-коричневые; горло, грудь (шерсть на которой удлинена), нижняя поверхность тела и внутренняя сторона конечностей пепельно-серые. Длина тела - 21 дюйм; хвоста - 24 дюйма.

Распространение.—Западная Африка. Леса Фанти и Ашанти.

II. КРАСНОХОХЛАЯ ГЕРЕСА. COLOBUS RUFOMITRATUS.

Colobus rufomitratatus, Питерс, М. Б. акад. Берл., 1879, стр. 829, стр. iA. и ii.

Tropicolobus rufomitratatus, рочебрюхий, фавн. Sénég., Mamm., Suppl., p. 102 (1887).

Персонажи. Тело коренастое и покрыто короткой шерстью; лицо и уши голые и коричневатого— черные, длинные надбровные волосы и поперечный гребень от уха до уха черные; передняя и задняя части головы до затылка коричневатого-красные; щеки и подбородок темно-серые; спина, начиная от затылка, бока, наружная и задняя поверхности конечностей и ступни темно-коричневатого-оливковые; передняя часть плеча, руки и часть предплечья, а также передняя часть бедер бледно-красновато-желтые; грудь, нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей того же цвета, но бледнее; хвост окрашен так же, как и спина, на кончике хохолок, коричневатого-черный. Длина тела - 26 дюймов; хвоста - 27

Распространение.—Этот очень редкий вид обитает в Восточной Африке. Леса в Муниуни, недалеко от Момбасы.

III. ГЕРЕЗА КИРКА. КОЛОБУС КИРКИ.

Colobus kirkii, Серый, Р. Z. S., 1868, стр. 180, стр. xv.; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 127 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 25 (1876); Кирк, Энн. и маг. Н. X. (5), xiii., стр. 307 (1884).

Гереса киркии, урожденная, консп. М., стр. 14 (1879).

Piliocolobus kirki, Rochebr., фавн. Sénég., Mamm. Дополнение, стр. 112, т. vi. (1887).

Персонажи. Лицо и уши голые, иссиня—черные; кончик носа серовато-белый; голова с длинными расходящимися волосами, образующими своего рода шапочку, загнутую назад надо лбом; макушка головы, спина и хвост красновато-коричневые, к концам более светлые; затылок, плечи, руки, внешняя и передняя поверхности передних конечностей, центр внешней поверхности бедер и голеней, кисти и ступни черные; лоб, щеки, грудь, передняя сторона плеч, вся нижняя сторона тела, и внутренняя сторона конечностей белые; передняя сторона нижней части рук, задний край передних конечностей, а также передняя и задняя стороны бедер и голеней серовато-белые. (Серый.) Длина тела 25 с половиной дюймов; хвоста 31 дюйм.

Распространение.—Остров Занзибар. Эта обезьяна была впервые отправлена в Европу сэром Джоном Кирком в 1868 году. Ее первооткрыватель, писавший в 1884 году, говорит, что даже в 1868 году обезьяна была редкостью, но ее еще можно было встретить во многих лесистых районах этого острова. Он пишет: "Я не знал, что он был найден на острове Пемба или на материке; а теперь я обнаруживаю, что он если и не вымер, то стал настолько редким, что его невозможно было добыть, даже когда я послал охотников по острову. У меня есть отчет, что оно все еще существует в одном месте, до которого они не смогли добраться. Я полагаю, что два

экземпляра были отправлены в Германию некоторое время назад; но, похоже, животное будет потеряно для науки. Это связано с уничтожением лесов и зарослей на острове".

"*Colobus kirkii*, - пишет мистер Х. Х. Джонстон в 1886 году, - исчез почти со всех уголков острова Занзибар, но ходили слухи, что он все еще обитает на лесной полянке, пока еще не посещенной охотниками. Туда сэр Джон послал своих егерей доложить о существовании Обезьяны. После недельного отсутствия они вернулись, их смуглые лица сияли торжеством. "Ну что, вы их нашли?" - спросил британский генеральный консул. "Да, - ответили мужчины с ликованием, - и мы убили их всех до единого!" после чего двенадцать обезьяньих трупов были брошены на пол, и *колобус кирки* присоединился к дронту, ауку, ритине и Моа в чистилище видов, уничтоженных деянием человека".

ТАБЛИЧКА XXXIII.



ЗАЛИВ ГЕРЕСА.

IV. ЗАЛИВ ГЕРЕСА. КОЛОБУС ЖЕЛЕЗИСТЫЙ.

(Фото XXXIII.)

Simia ferruginea, Шоу, род. Зоол., i., стр. 59 (1800); Десм., Мамм., стр. 53 (1820); Фишер, Синопс. М., стр. 13 (1829).

Colobus ferrugineus, Illiger, Продр. Система. М., стр. 69 (1811); Жерве, Х. Н. М., i., стр. 66 (1854); Грей, П. З. С., 1868, с. 181; Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 27 (1876); Рошбр., Фавн. Sénég., Mamm., стр. 25 (1883-5); Склейте, Р. З. С., 1890, стр. 590, pl. xlviii.

Железистый колобус, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 92 (1812); Мартин, Маммиф. Аним., стр. 498 (1841).

Colobus temminckii, Куль, Бейтр., Зоол., стр. 7 (1820); Десм., Мамм., стр. 53 (1820); Огилби, Р. З. С., 1835, стр. 99; Мартин, указ. соч., стр. 499 (1841).

Colobus pennantii, Waterh., Р. З. С., 1838, стр. 57; Мартин, указ. соч., стр. 501; Джеффри., Под ред. Х. Н., iv., стр. 209 (1849); Грей, Р. З. С., 1868, стр. 181, вариант 2.

Colobus ferruginea, Less., Спец. Мамм., стр. 68 (1840); Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 18 (1870).

Colobus fuliginosus, Огилби, Кошка. Мамм. Z. S., стр. 97 (1839); Is. Geoffr., Кат. Méth. Прим., стр. 17 (1851); Темм., Эсквис. Зоол., стр. 24 (1853); Дальб., Сообщ. Мам., стр. 95 (1857).

Colobus rufouliginosus, Огилби, Кат. Мамм. З. С., стр. 270 (1839).

Руфо-нигерский колобус, Огилби, Кат. Мамм. З. С., стр. 273 (1839); Мартин, указ. соч., стр. 500 (1841); Грей, П. З. С., 1868, стр. 181, вариант 1.

Piliocolobus ferrugineus, рочебрюхий, фавн. Sénég., Mamm. Suppl., p. 105, pl. iii. (1887).

Piliocolobus bouvieri, Rochebr., том. cit., стр. 108, стр. iv.

Piliocolobus tholloni, rochebr., том. цит. по, стр. 110, пл. v.

Персонажи. Тело крепкое, покрыто довольно длинными волосками; лицо голое, черновато—синее, за исключением кончика носа, уголков рта и края нижних губ, телесного цвета; уши голые, черновато-синие; нос короткий и несколько выпуклый; волосы на лобной части стоячие, направлены вперед, черные; макушка и затылок до самого затылка черные; спина, бока, внешняя сторона бедер, основание и верхняя поверхность хвоста голубоватые или оливково-черные, с беловатыми волосками вперемешку на плечах и бедрах; стороны лица от основания до основания хвоста. середина щеки в обратном направлении к точке позади (закрывающей уши), шея, подбородок и горло, нижняя поверхность тела, а также все конечности (за исключением внешней стороны бедер) и нижняя поверхность хвоста насыщенно-рыжего цвета; кончики пальцев рук и ног черные. Длина тела 29 дюймов; хвоста 31 дюйм. Все волосы равномерно окрашены. Большой палец часто довольно хорошо развит и может иметь ноготь.

Окраска меха этого вида чрезвычайно изменчива; спина у некоторых разновидностей рыжеватая, щеки и горло могут быть песочно-желтыми или белыми, а нижняя сторона беловатая или побелевшая, а внешняя сторона передних конечностей может быть черной или совпадать по цвету с внешней стороной бедер. Хорошо развитый *плод* не имеет признаков разнообразной окраски, характерной для более поздней жизни, но довольно белый.

Распространение.—Западная Африка. Не редкость на всем Западном побережье.

Привычки.—Как и многие другие виды рода, этот вид держится на верхушках самых высоких деревьев в лесу. Его пища состоит из плодов и листьев.

Против ЧЕРНОЙ ГЕРЕСЫ. КОЛОБУС САТАНАС.

Colobus satanas, Уотерхауз, P. Z. S., 1838, стр. 58; Мартин, Маммиф. Аним., стр. 497 (1841); Жерве, X. H. Мам., стр. 65 (1854); Склейте, П. З. С., 1860, стр. 246; Райхенб., Натург. Аффен, стр. 88 (1862); Is. Geoffr., Dict. H. N., iv., стр. 208 (1849); Грей, P. Z. S., 1868, стр. 181; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 17 (1870); Шлег, Муз. Pays-Bas, vii., p. 27 (1876); Matschie, S.B. Ges. Natur. О. Берлин (1892), стр. 226.

Semnopithecus anthracinus, Леконт, профессор. Акад. нац. наук. Филад. 1857, с. 10.

Гереса сатанас, Правда. Сообщ. М., стр. 10 (1879).

Stachycolobus satanas, Рочебрюхий. Фавн. Sénég. Дополнение. М., стр. 114, стр. vii. (1887).

Персонажи. Мех очень длинный, грубый; морда голая, черная; уши округлые, черные; волосы на надбровных и лобных волосках очень длинные; волосы на щеках длинные, очень жесткие и направлены назад; мех на теле и хвосте полностью и равномерно черный; волосы на хвосте короткие; на кончике не хохолок. Длина тела 40 дюймов; хвоста 59½ дюймов.

Распространение. — Западная Африка. Леса Сенегамбии, Сьерра-Леоне, Габуна и Конго. Это один из самых распространенных видов в Западной Африке.

VI. МЕДВЕДИЦА ГЕРЕСА. КОЛОБУС ОБЫКНОВЕННЫЙ.

? Обезьяна с полным дном, Вымпел, четверть., i., стр. 197, стр. 24 (1781).

? *Colobus polycom*, Illig., Prodr., стр. 69 (1811).

Colobus ursinus, Огилби, P. Z. S., 1835, стр. 98; Меньше. Спецификация. Мам., стр. 70 (1840); Мартин, Маммиф. Аним., стр. 495 (1841); Фрейзер, Зоол. Тип., pl. i. (1849); Is. Geoffr., Dict. H. N., iv., стр. 208 (1849); Sclater, P. Z. S., 1860, стр. 245; Reichenb. Naturg. Affen, p. 86 (1862); Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 24 (1876).

Colobus personatus, Temm., Mus. Лугд., fide Reichenb. т.н., стр. 88 (1862).

Colobus polycom, вар., Серый, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 18 (1870); Рошбр., Фавн. Sénég., Suppl. Мамм., p. 117, pl. viii. (1887), Matschie S.B. Ges. Natur. О. Берлин, 1892, стр. 227.

Гереса урсин, урожденная, консп. М., стр. 10 (1879).

Персонажи. Тело крупное; мех длинный и блестящий; морда и уши голые и черные; мех на шее, плечах и вдоль спины образует мантию; мех по всему телу и конечностям темно-черный; передняя и задняя части головы, ушная раковина, бока шеи и горла серовато-белые с примесью серовато-черного; хвост длинный, короткошерстный, на концах белый.

Молодые. — Белый, с несколькими редкими черными волосками; хвост покрыт густым хохолком.

Распространение. — Западная Африка: Сьерра-Леоне.

Примечание. Сино — самый восточный регион, откуда шкуры попадают на побережье.

Привычки. — Этот вид часто встречается поодиночке, а не большими стаями. В коллекциях встречается реже, чем *C. ferrugineus*.

VII. БЕЛОЛАПАЯ ГЕРЕСА. COLOBUS VELLEROSUS.

Semnopithecus vellerosus, есть. Джеффри. в Беланге. Voy. М., стр. 37 (1830).

Двухцветный семнопитек, Весмаэль, Бык. Acad. Sc. Brux., ii., стр. 236 (1835).

Colobus leucomeros, Огилби, Р. Z. S., 1837, стр. 69; Мартин, Маммиф. Аним., стр. 497 (1841).

Colobus ursinus, темм., Эсквис. Зоол. Гуин., стр. 21 (1853).

Colobus vellerosus, Is. Geoffr., Dict. Н. N., iv., стр. 116 (1849); id., Кат. Méth. Приматы, стр. 17 (1851); Жерве, Н. N. Мамм., i., стр. 65 (1854); Склейте, Р. Z. S., 1860, стр. 246; Райхенб., Naturg. Affen, р. 87 (1862); Matschie, S.B. Ges. Natur. О. Берлин, 1892, стр. 226.

Колобус двухцветный, Серый, Р. Z. S., 1868, стр. 181; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 18 (1870); Шлегель, Муз. Пайбас, vii., стр. 26 (1876); Рошбр., Фавн. Sénég., Мамм., р. 24 (1885).

Гереса веллеросус, Правда. Сообщ. М., стр. 10 (1879).

Pterocolobus vellerosus, Rochebr., указ. соч., Дополнение. М., стр. 125, стр. x (1887).

Персонажи. Шерсть на спине, боках и пояснице очень длинная и шелковистая; мех повсюду темно-черный, за исключением лобной полосы, которая сливается с длинной шерстью ушной раковины и боковых сторон шеи, которые белые, а также подбородка, горла, пятен с каждой стороны ягодиц, внешней и задней сторон бедер и короткошерстного хвоста, на кончиках которого есть хохолок; большие пальцы очень короткие, но отчетливые, с плоским ногтем. Длина тела 28½ дюйма; хвоста 31 дюйм.

Молодые особи похожи по окраске на взрослых, но шерсть у них не удлиненная.

Распространение.—Западная Африка: от Золотого берега до Сенегамбии, где это не редкость.

VIII. АНГОЛЬСКАЯ ГЕРЕЗА. КОЛОБУС АНГОЛЬСКИЙ.

Colobus angolensis, Sclater, Р. Z. S., 1860, стр. 245; Reichenb., Naturg. Affen, стр. 88 (1862); Грей, Р. Z. S., 1868, стр. 181; id., Кат. Обезьяны брит. Муз., стр. 18 (1870); Шл., Муз. Пайбас, стр. 24 (1876); Рошбр., Фавн. Sénég., Suppl. Мамм., стр. 119; Бокаж, Journ. Sc. Lisb., 1889, стр. 10; Matschie, S.B. Ges. Нац. фр. Берлин, 1892, стр. 226.

Colobus palliatus, Петерс, М. Б. акад. Berl., 1868, стр. 637; id., op. cit., 1879, стр. 830, pl. iv.A.; Грей, Ann. Mag. N. H. (4) iii., стр. 171 (1869); Склейте, Р. Z. S., 1880, стр. 68; Матчи, С.Б. Ges. Natur. О. Берлин, 1892, стр. 227.

Guereza angolensis et *G. palliatus*, Форель. Консп. Мама., стр. 10 и 20 (1879).

Персонажи. Лицо и уши голые, черные; волосы расходятся вокруг лица, длинные и направлены назад, особенно на висках и по бокам лица, а также на плечах, где они образуют длинную мантию; волосы на макушке короче, чем на спине. Общий окрас темно-глянцево-черный, за исключением лобной полосы над глазами, височных волос, усов и мантии, которые белые. Хвост длинный и черный, за исключением конечной трети, которая белая и имеет толстый хохолок на кончике; белое пятно на промежности. Длина тела 23½ дюйма; хвоста 34 дюйма.

Распространение. Восточная Африка: долина Пангани. Говорят, что он простирается до Анголы на юго-западном побережье.

IX. ГЕРЕСА РУППЕЛЛА. КОЛОБУС ГЕРЕСА.

Colobus guereza, Rüpp, Neue Wirbelth. Cayget., стр. 1, стр. 1 (1835); Урок, Спец. Мама., стр. 68 (1840); Мартин, Маммиф. An., стр. 494 (1841); Is. Geoffr., Dict. H. N., iv., стр. 117 (1849); id., Кат. Méth. Приматы, стр. 17 (1851); Temm., Esquiss. Зоол. Guin., стр. 23 (1853); Дальб., Зоол. Stud., i., стр. 95 (1857); Sclater, P. Z. S., 1860, стр. 246; Gray, P. Z. S., 1868, стр. 182; Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 25 (1876); Томас, P. Z. S., 1885, стр. 219; Матчи, С. Б. Гезелл. Natur. О. Берлин, 1892, стр. 225 и далее.

Гереса руппелли, Серая, Кошка. Обезьяны Брит. Муз., стр. 19 (1870); Рошбр., Фавн. Sénégalamb., i., Мамм., стр. 25 (1885); id., t.c., дополнение., стр. 129, pl. xi. (1887).

Гереса гереса, трус., консп. М., стр. 10 (1879)

Guereza occidentalis, Rochebr., op. cit., Suppl., p. 140, pl. xiii. (1887).

Персонажи. Лицо, тонко покрытое серовато—белыми волосками; нос и верхняя губа черные; уши голые, черные; полоса поперек лба, расширяющаяся по бокам головы, горлу, бокам шеи и подбородку, белые; от плеч мантия из длинных белых шелковистых волос, спускающихся по бокам и сходящихся на поясице, так что свисают по бокам тела, бедрам и ляжкам; внешняя сторона последних серовато-белая; задняя треть хвоста с хохолком, белая, каждый волосок окаймлен многочисленными тонкими коричневыми полосками; нижняя часть хвоста покрыта кисточками. все остальное тело глубокого блестящего черного цвета. Длина тела 28 дюймов; хвоста 28½.

Распространение.—Эта удивительно красивая обезьяна обитает в Северо-Восточной Африке, где она не редкость в провинциях Годжан и королевстве Шоа. Доктор Блэнфорд, однако, не слышал о ней во время своего путешествия с британской армией в Магдалу. Он встречается также в окрестностях горы Килиманджаро и был застрелен на лесистых равнинах недалеко от побережья мистером Х. Х. Джонстоном. Форма этого вида, которая была описана под названием *C. occidentalis*, более или менее ограничена югом Лулонго, в Верхней части Конго, между 6° Северной широты и 12° восточной долготы.

Привычки. "Гереса", как называют этот вид аборигены Абиссинии, живет небольшими стаями на самых высоких деревьях леса, по соседству с ручьями. Он очень активен и подвижен и довольно безбиден по нраву. Пища этого *колобуса* состоит из диких фруктов, насекомых и тому подобного, которых он ищет только в течение дня, удаляясь ночью. "Обезьяна колобус, - замечает м-р Х. Х. Джонстон, - почти единственная, которая совершенно избегает соседства с Человеком; другие роды часто обитают поблизости от местных плантаций и, несомненно, извлекают выгоду из обилия выращенной пищи". Шкура этой обезьяны пользуется большим спросом у воинов масаи как для пошива платьев, накидок и шапочек, длинная белая мантия этого существа образует наиболее декоративный костюм, а также для покрытия их щитов.

X. БЕЛОХВОСТАЯ ГЕРЕЗА. ХВОСТАТЫЙ КОЛОБУС.

Colobus guereza caudatus, Томас, P. Z. S., 1885, стр. 219, стр. xii.; Джонстон, Килиманж. Доп., стр. 174, 388, 389, рис. 72; Matschie, S. B. Gesell. Naturf. О. Берлин, 1892, стр. 225.

Guereza caudatus, рочебрюхий, фавн. Sénag. Дополнение, Мамм., стр. 136, pl. xii.

(Табличка XXXIV.)

ТАБЛИЧКА XXXIV.



БЕЛОХВОСТАЯ ГЕРЕСА.

Персонажи.—Очень похож на *C. guereza*, но "характеризуется тем, что белая кисточка на хвосте намного крупнее и тоньше, чем у настоящей абиссинской *C. guereza*". У последнего животного ближайшие 12-16 дюймов хвоста короткошерстные и совершенно черные, только конечные 8-12 дюймов белые и покрыты хохолком, так что белая мантия свисает с тела и скрывает только около одной трети черной части хвоста". (*Олдфилд Томас.*) У *хвостатого колобуса*, добавляет м-р Томас, только примерно три-четыре дюйма основания хвоста черные, а остальная часть (с волосками около 20 или 21 дюйма) развита в великолепную белую кисточку, отдельные волоски которой имеют длину от семи до девяти дюймов. Волоски белого тела—мантии, окрашенные, как и хвост, в желтовато-кремовый цвет, — полностью покрывают черный цвет у основания хвоста, причем белый цвет последнего и мантии совершенно непрерывный.

Распространение.— Восточная Африка; очень распространен у подножия горы Килиманджаро, как сообщает мистер Джонстон, открывший этот вид. На горе Кения доктор Грегори из Британского музея во время своего полного приключений и примечательного путешествия встретился с ним на большой высоте. Он также был найден в Кисонго, к юго-востоку от озера Виктория, и в Юниамуэзи, где его добыл сэр Ричард Бертон.

Привычки.—Повадки белохвостой гересы очень похожи на повадки предыдущей; но, по-видимому, это животное гораздо больше любит горы, чем последняя. Существо, столь поразительно — даже вызывающе—разукрашенное, могло бы считаться очень заметным объектом среди своих родных лесов. Доктор Грегори, однако, сообщил настоящему автору, что, несмотря на его характерную окраску при осмотре руки, ему было очень трудно обнаружить его в его жилище среди лесных деревьев на больших высотах, где все ветви покрыты длинными седобородыми лишайниками, с которыми его мех очень гармонирует. Мистер Х. Х. Джонстон, описывая солдат Мандары, говорит: "На их головах были полумесяцы, сделанные из страусиных перьев, или шапки из кожи обезьяны *колобуса*. Это последнее упомянутое животное также снабдило их мантиями из длинного черного и белого меха и снабдило хвостами с густым оперением, которые эти воины-чага прикрепили к той части своего тела, где хвосты должны были бы по праву появляться, если бы человек не отказался от таких придатков".

"Полумея", как называет этот вид доктор Ливингстон, в Юниамуэзи известна как "Мбега", и ею восхищаются из-за ее блестящей черной кожи и снежно-белой гривы. Это чистоплотное животное, всегда занятое чисткой своего прекрасного наряда, который, по словам арабов, оно разрывает на куски при ранении, чтобы им не воспользовался охотник. "Мбега" живет на деревьях, редко спускаясь на землю, и питается плодами и молодыми листьями." (*Бертон.*)

ЛАНГУРЫ. РОД SEMNORITHECUS.

Семнопитек, F. Cuv., Хист. Нац. Маммиф. (1821).

Presbytis, Eschsch. Коцебу. Внутренняя палуба. Рейс., iii., стр. 196 (1821).

Представители этого рода имеют тонкие и вытянутые тела, длинные конечности и очень длинный и тонкий хвост. Голова округлая и короче, чем у генонов; морда короткая, вдавленная и мало выступающая. Большой палец, хотя и короче, чем у генонов и макака, присутствует у всех видов и образует хороший хватательный палец с плоским ногтем. Кисти и ступни длинные и узкие, ногти на пальцах выпуклые; большой палец ноги толстый и хорошо развитый. Мозолистые места маленькие по сравнению с генонами; мех обильный, обычно длинный, мягкий и часто блестящий; а над глазами у них обычно имеется выступающий спереди гребень из жестких волосков. У представителей этого рода, как уже отмечалось, нет щечных мешочков; однако у них есть большой гортанный мешок, сформированный и расположенный так, как описано выше (стр. 84).

Череп круглый; глазницы большие, над ними выступает очень выступающий надбровный выступ; пространство между глазами широкое, а нижняя челюсть глубокая. Верхние коренные зубы четырехзубые, а задний нижний моляр пятизубый.

В молодости лангуры добродушны и легко приручаются; но в старости они становятся угрюмыми и злобными. Они живут главным образом в лесных районах, группами значительного размера.

"Этот род распространен почти по всему Восточному региону, везде, где леса обширны. Они простираются вдоль Гималаев до пределов Симлы, где на высоте 11 000 футов был замечен вид, играющий среди елей, увешанных снежными венками. На западной стороне Индии они не встречаются севернее 14-й параллели широты. На востоке они простираются до Аракана, а также до Борнео и Явы, но, по-видимому, не доходят до Камбоджи. Вдоль восточного продолжения Гималаев они снова встречаются в Восточном Тибете, замечательный вид (*S. roxellana*) был обнаружен в Мупине (около лат. 32° северной широты), в высокогорных лесах, где зимы суровы и где растительность полностью соответствует Палеарктическому региону". (Уоллес.)

Согласно последней переписи, общее количество обезьян, населяющих острова Восточного архипелага, выглядит следующим образом: на Суматре - 12; Банке - 4; Борнео - 14; Яве - 5; Целебесе - 2; Натуне, Бали, Ломбоке, Флоресе, Сумбаве и Тиморе - по 1; на Филиппинских архипелагах и Сулу - по 1.

ЛАНГУР I. БАРБЕ. SEMNORITHECUS BARBII.

Пресвитер Барбей, Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 734 (1847); id., Кат. Mamm. As. Soc. Mus., стр. 14 (1863); id., Mamm. Бирма, стр. 11 (1875).

Семнопитек барбей, Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 12 (1878); id., Кат. Муз. Calc., стр. 48; Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 39 (1891).

Персонажи.—Близкий родственник *S. obscurus*. Волосы по бокам головы и перед ушами длинные, выступающие наружу; волосы на макушке длинные и направлены назад; борода короткая; лицо почти обнаженное, иссиня-черное; губы покрыты тонкими короткими желтоватыми волосками. Общая окраска тела везде черная, за исключением плеч, передних конечностей до запястья, суставов ног, спины и боковых сторон головы и хвоста, которые окрашены в бледно-серый цвет. Длина тела 19 с половиной дюймов; хвоста 29 дюймов. Взрослая самка похожа по окраске на самца. В черепе орбиты округлены, а межорбитальная область удлинена. Доктор Андерсон отмечает: "Различия, которые существуют в определенных размерах между черепами хорошо идентифицированных представителей двух полов, намного больше, чем обычно обнаруживается у представителей одного и того же пола разных видов".

Распространение.— Северные холмы Типпера; Ассам; и гора Мулеит в Тенассериме. Доктор Андерсон наблюдал это в долине Тапенг, в центре холмов Качин в Верхней Бирме и в ущелье Иравади.

Привычки.—Этот вид обитает в густых лесах и встречается группами от тридцати до пятидесяти особей, распределенных, по словам доктора Андерсона, по трем или четырем высоким лесным деревьям, нависающим над горными потоками. Как правило, он ручной и бесстрашный.

II. ЛАНГУР В ШЛЯПКЕ. СЕМНОПИТЕК ПИЛЕАТУС.

Semnopithecus pileatus, Блит, J. A. S. Beng., xii., стр. 174 (1843); xiii., стр. 467 (1844); Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение., v., стр. 30, стр. xxvi., рис. 3 (1855); Хаттон, P. Z. S., 1867, стр. 946; Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 57 (1876); Андерсон, Зоол. Доп. Юньнань, стр. 13 (1878); ид., Кат. Муз. Calc., стр. 40; Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., Мама., стр. 37, рис. 9 (1891).

Presbytis pileatus, Blyth, J. A. S. Beng., xvi., стр. 735 (1847); id., Кат. Mamm. As. Soc. Mus., стр. 12 (1863); id., Mamm. Бирма, стр. 11 (1875).

Semnopithecus potenziani, Вр., C. R., xliii., стр. 412 (1856).

Presbytis chrysogaster, Лихт.; Петерс, P. Z. S., 1866, с. 429; Блит, Мам. Бирма, стр. 10 (1875).

Semnopithecus chrysogaster, Лихтенштейн; Петерс, М. Б. акад. Berl., 1879, стр. 830, pl. iv.b; id., P. Z. S., 1866, стр. 429; Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 38 (1891).

Персонажи.—Почти родственны *S. entellus*. Морда уплощенная и черная; морда длинная и широкая; голова без гребня; несколько длинных надбровных волос, выступающих спереди, черные; усы длинные, спускающиеся к подбородку и выступающие наружу и назад, частично скрывающие уши, красновато-желтого цвета; борода короткая, также красновато-желтого цвета; волосы на макушке длиннее, чем на затылке и висках, черные или темно-пепельно-серые, вымытые, особенно на передней части головы, с рыжинкой; шея, спина, верхняя часть рук, нижняя часть головы передняя часть, внешняя сторона бедер и хвост (кроме черного кончика хохолка) пепельно-серые — все эти части слегка окрашены в рыжий цвет; кисти и ступни черные; остальные конечности рыжие; горло, грудь и передняя часть нижней поверхности насыщенного оранжево-желтого цвета, более бледные в задней части брюха и на внутренней стороне конечностей. Длина тела 18 дюймов; хвоста 28½ дюйма, а с хохолком 31 дюйм. Череп шаровидный; надглазничные выступы не выступают.

У детенышей мех мягкий, шелковистый и довольно длинный, он намного бледнее взрослых особей и имеет нежно-серый оттенок, желтовато-белый заменяющий рыжий окрас взрослых особей. (Андерсон.)

Распространение.—Северный Ассам, Арракан, Верхняя Бирма и Тенассерим. Доктор Андерсон наблюдал стаю этого вида в Цингу Мио на левом берегу Иравади, в нижней части первого ущелья.

Привычки.—Этот вид обитает небольшими группами в лесу. В молодости у него мягкий нрав, но, став полностью взрослыми, самцы становятся злыми и свирепыми.

III. ХАНУМАНСКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК ЭНТЕЛЛУС.

L'entelle, Ауд., Сингес, семейство V., раздел ii., рис. 2 (1797).

Simia entellus, Дюфрейн, Бюлл. Соч. Филом., i., стр. 49 (1797).

Cercopithecus entellus, лат., Хист. Нац. Буфф., xxxvi., стр. 283 (1809).

Семнопитек энтеллус, Десм., Дикт. Класс. Н. Nat., vii., стр. 568 (1825); Сайкс, P. Z. S., 1831, стр. 199; Блайт, J. A. S. Beng., xii. (1843), стр. 169; xiii. (1844), стр. 470; Хаттон, P. Z. S., 1867, стр. 944; Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 14 (1870); Шлегель, Муз. Пайбас, vii., стр. 60 (1876); Андерсон, представитель зоол. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 15 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 27 (1891).

Semnopithecus anchises, Эллиот; Блайт, J. A. S. Beng., xiii. (1844), стр. 470; xvi. (1847), стр. 733.

Presbytis entellus, Грей, Рукописный список Brit. Mus., стр. 4 (1843; частично); Blyth., указ. соч., xvi., стр. 732, 1271, pl. liv., рис. 1, 1847; id., Cat. Mamm. As. Soc. Mus., стр. 11 (1863); Джердон, мака. Ind., стр. 4 (1867).

Semnopithecus albobularis, Müll. u. Schl., Verh. Nat. Gesch., 1839-44, p. 58 (*fide* Anderson).

Персонажи.—Близкий родственник *S. schistaceus*. Без хохолка; шерсть на макушке расходится во все стороны; уши большие, усы короткие, не скрывающие ушей; выступающие надорбитальные волосы черные; лицо, уши, руки и ступни черные. Голова, туловище, конечности и хвост, который на четверть длиннее тела, бледно—желтовато—коричневые, темнее на плечах и внешней стороне конечностей; нижняя поверхность более бледная.

Самка.—Меньше самца.

Распространение.—По словам доктора Андерсона, этот вид обитает от северного Декана до южного берега Ганга; его распространение на северо-запад, западнее и южнее неясно.

Привычки.— "Немногие дикие животные, если они вообще есть, - замечает доктор Блэнфорд, - предоставляют лучшие возможности для наблюдения, чем обезьяна Хануман из Северной и Центральной Индии. Обычно охраняемый и считающийся священным многими жителями Индии, он не боится Человека и может быть найден в рощах близ деревень или даже на деревенских деревьях, так же часто, как и в глубине леса. Во многих частях Индии этих обезьян часто можно увидеть на крышах домов. Они часто воруют продукты из лавок торговцев зерном, в то время как ущерб, который они наносят садам и полям, делает их большой помехой для местных жителей. Они питаются фруктами и зерном, но особенно листьями и молодыми побегами. Они живут на высоких деревьях в лесу, недалеко от воды или на каменистых холмах, группами среднего размера, состоящими из самцов, самок, детенышей и младенцев, прижимающихся к своим матерям. Старого самца иногда находят в одиночестве. Две общины часто вступают в смертельную схватку за обладание какой-нибудь фруктовой рощей, интересный отчет об одной из которых приводится мистером Дж. Хьюзом в "Трудах Азиатского общества Бенгалии" за 1884 год." Они всегда очень активны. "Их голос, - продолжает доктор Блэнфорд, чей отчет мы привели в сжатом виде, - громкий, и его часто слышно, особенно утром и вечером. Два самых распространенных звука, издаваемых ими, - это громкий, радостный, довольно музыкальный зов, своего рода клич, который обычно издается, когда они перепрыгивают с дерева на дерево, и резкая гортанная нота, обозначающая тревогу или опасность. Последний крик знаком охотнику на тигров, среди лучших друзей которого Хануман. Надежно укрывшись на высоком дереве или перепрыгивая с одного дерева на другое во время движения тигра, Обезьяна жестом и криком указывает на местонахождение своего смертельного врага в кустах или траве внизу и от души ругается на него".

Хануман очень нежного телосложения и не может противостоять резким изменениям климата и температуры и обязательно перепадам высот; поэтому он полностью ограничен теплыми низменными регионами. По словам капитана Т. Хаттона, настоящей миграции этого вида из верхних районов Бенгалии в нижние, как уже было заявлено, не существует. "Я склонен, - пишет этот наблюдатель, - ограничить его диапазон, возможно, несколько вольно, между 10° и 25 ° Северной широты. и от 75° до 88 ° восточной долготы, образуя вместе с линией, проведенной через всю страну от Аллахабада до Бунди, треугольный хребет полностью к югу от рек Джамна и Ганг".

IV. ГИМАЛАЙСКИЙ ЛАНГУР. SEMNORITHECUS SCHISTACEUS.

Semnopithecus entellus (nec Dufr.), Ходгс., P. Z. S., 1834, стр. 95; Огилби, мадр. Журн., xii., стр. 144 (1840).

Semnopithecus schistaceus, Hodgs., J. A. S. Beng., ix., стр. 1212 (1840); Schl., Mus. Пайбас, vii. стр. 6 (1876); Андерсон, Зоол. Доп. Юньнань, стр. 16 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Индия, М., стр. 30 (1891).

Семнопитек непальский, Hodg., J. A. S. Beng., ix., 1840, стр. 1212.

Presbytis entellus (некр.), Серый, Кат. Ходжс. Мамм. Непал, стр. 1 (1846); ид., Кат. Обезьяны брит. Муз., стр. 14 и 15 (1870).

Presbytis schistaceus, Блит, Кат. Мамм. As. Soc. Mus., стр. 11 (1863); Джердон, мама. Индия, стр. 6 (1867); Блэнфорд, J. A. S. Beng., xli., 1872, стр. 32.

Персонажи. Мех длинный; шерсть расходится лучами на макушке; длинная шерсть на щеках, скрывающая маленькие уши; хвост слегка покрыт хохолком; верх и бока головы бледно-желтые или беловатые; лицо и уши, ладони и подошвы черные; спина, бока, внешняя сторона конечностей, хвост, кисти и ступни темно-сери-коричневые, иногда с фиолетовыми оттенками.

У старых особей голова серая или белая; у молодых часто лапы темнее, чем у взрослых.

Лицевая часть черепа длиннее, а надбровные дуги менее выдаются вперед, чем у *S. entellus*. Носовые кости выступают за линию от надглазничного гребня до передней границы предчелюстных костей; у *S. entellus* они не выступают за ее пределы.

Распространение.—Гималаи, от Кашмира до Бутана, от 5000 до 12000 футов над уровнем моря, этот вид обитает на этих больших высотах низменности *S. entellus*.

Привычки.—Похожи на привычки ханумана. По словам доктора Блэнфорда, капитана. Хаттон наблюдал его недалеко от Симлы, на высоте 11 000 футов, резвящимся среди елей, которые в то время были увешаны снежными венками. "Но, - пишет доктор Андерсон, - нет никаких доказательств того, что какой-либо вид обезьян в Гималаях естественным образом обитает на тех высотах, на которых ежегодно лежит снег, как предполагал Ходжсон, и именно редкость их появления на этих высоких высотах и зимой привлекла так много внимания к их зимним блужданиям. Летом они распространены гораздо шире, чем зимой, когда, как правило, их загоняют на более низкие высоты и в более теплые долины".

V. МАДРАССКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК ПРИАМУС.

Семнопитек приам, Эллиот, рукопись.; Блит, J. A. S. Beng., xiii, стр. 470 (1844).

Semnopithecus pallipes, Blyth, Ann. and Mag. N. H., 1844, стр. 312.

Пресвитер приамус, Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 732, 1271, pl. liv. (1847); хх., стр. 313 (1851); id., Cat. Мамм. Как. Соч. Муз., стр. 12 (1863); Келаарт, произв. Фавн. Зейлан., стр. 3 (1852); Джердон, Мама. Индия, стр. 7 (1867).

Семнопитек альбипес, Is. Geoffr., Кат. Méth. Приматы, стр. 14 (1851); Грей, Кат. Обезьяны британского происхождения, стр. 15 (1870); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 18 (1878).

Семнопитек приамус, Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Мамм., стр. 31 (1891); Андерсон, Зоол. Экспед. Юнь-нань, стр. 19 (1878; с полной синонимией).

Пресвитер терсит, Теннент, Цейлон, стр. 132, табличка, рис. 1 (1860).

Персонажи.—Почти родственны *S. entellus*. Шерсть на голове нечетко разветвленная; на затылке продольный гребень; волосы над глазами очень длинные и выступают вперед; уши большие, не скрытые усами. Мех длинный; морда и уши черные; спина, бока, внешняя сторона передних конечностей, верхняя часть бедра и хвост пепельно-серые или землисто-коричневые, иногда слегка окрашенные в фиолетовый цвет; бока головы, затылок, нижняя половина бедер, кисти и ступни желтоватые, так же как нижняя поверхность тела и внутренняя поверхность конечностей. Длина тела 21 дюйм; хвоста 28 дюймов.

Распространение.— Коромандельское побережье Индии, поднимающееся на высоту 6000 футов; Цейлон с севера до холмов Кандиан на юге.

Привычки.— Такие же, как у *S. entellus* и *S. schistaceus*.

Этот вид обитает в северных и восточных провинциях Цейлона, а также на лесистых холмах, которые встречаются в этих частях острова. По внешнему виду он отличается как по размеру, так и по окраске от обыкновенного вандеру, будучи крупнее и более склонным к серому; а по повадкам он гораздо более сдержан. В Джафне и в других частях острова, где популяция сравнительно многочисленна, эти обезьяны настолько привыкают к присутствию Человека, что проявляют крайнюю смелость и безразличие. Их стая завладевает пальмировой пальмой; и они так искусно могут пригибаться и прятаться среди листьев, что при малейшей тревоге вся группа в одно мгновение становится невидимой. Присутствие Собаки, однако, возбуждает такое неумное любопытство, что, чтобы понаблюдать за ее передвижениями, они никогда не преминут выдать себя. Их часто можно увидеть собравшимися на крыше туземной хижины.

У сингалцев сложилось впечатление, что останки обезьяны никогда не встречаются в лесу; вера, которую они воплотили в пословице о том, что "тот, кто видел белую ворону, гнездо птицы падди, прямое кокосовое дерево или мертвую обезьяну, наверняка будет жить вечно". Этот фрагмент фольклора, очевидно, попал на Цейлон из Индии, где считается, что люди, живущие на месте, где была убита обезьяна Хануман, *Semnopithecus entellus*, умрут, и что даже ее кости приносят несчастье, и что ни один дом, построенный там, где они спрятаны под землей, не может процветать; и Бьюкенен замечает, что "возможно, из-за этого страха неудачи ни один туземец не признается, что видел мертвого Ханумана".

VI. МАЛАБАРСКИЙ ЛАНГУР. SEMNORITHECUS HYPOLEUCUS.

Semnopithecus hypoleucos, Блит, J. A. S. Beng., x., стр. 839 (1841); xiii., стр. 470 (1844); Андерсон, Отв. Зоол. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 20 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Индия, М., стр. 33 (1891).

Semnopithecus johnii, вар., Мартин, Маммиф. Аним., стр. 489 (1841); Грей, Кот. Обезьяны брит. Муз., стр. 14 (1870).

Semnopithecus dussumieri, Is. Geoffr., C. R., xv., стр. 719 (1842); id., Описание. Новая семья. des Singes, стр. 54, стр. XXX.; id., Кат. Méth. Приматы, стр. 13 (1851); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 62 (1876).

Пресвитер гиполев, Блит, J. A. S. Beng., xvi. (1847), стр. 733.

Пресвитер Иоанн (нек Фишер), Блит, J. A. S. Beng., xxviii., стр. 283 (1859); id., Кат. Мам. Как. Соч. Муз., стр. 12 (1863); Джерд., Мам. Индия, стр. 7 (1867).

Характеры.—Похожи на *S. entellus*. Гребня нет; шерсть расходится лучами на макушке; спина, бока, задняя сторона бедер и хвост темно-коричневые, темнее на середине спины; передняя часть рук, передняя часть бедер и нижняя часть ног черные; голова грязно-желтая; нижняя поверхность желтовато-белая; лицо, кисти и ступни черные. Длина тела - 21 дюйм; хвоста - 32 дюйма.

Молодые.—Сажисто-коричневый.

Распространение.—Леса и перелески вблизи сельскохозяйственных угодий вдоль Малабарского побережья Индии, ниже 1500 футов.

Привычки.—Такие же, как у Ханумана. Он, однако, более застенчивый.

VII. ЛАНГУР НИЛГИРИ. СЕМНОПИТЕК ДЖОНИ.

Simia johnii, Фишер, Syn. Mamm., i., стр. 25 (1829).

Семнопитек кукуллатус, есть. Джеффри в Беланге. Voy. Zool., pp. 38, 72, pl. i. (1834); Wagner in Schreber Säugeth. Дополнение, i., стр. 98 (1846); Грей, Кат. Обезьяны брит. Муз., стр. 14 (1870).

Semnopithecus johnii, Водный житель, Кошка. Мама. Муз. Зоол. Соч., стр. 5 (1838); Андерсон, Отв. Зоол. Доп. Юнь-нань, стр. 21 (1878; с синонимией); Блэнфорд, Фауна брит. Ind., Mamm., стр. 33 (1891); Schl., Mus. Pays-Bas, vii., стр. 50 (1876).

Semnopithecus jubatus, Вагнер в Шребе. Säugeth. Дополнение, i., стр. 305 (1840); Horsf., Кат. Mamm. E. Ind. Co. Mus., стр. 14 (1851).

Semnopithecus cephalopterus, Blyth, J. A. S. Beng., xiii., стр. 469 (1844; частично).

Пресвитер Иоанн, Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 734, 1272 (1847).

Presbytis cucullatus, Blyth, J. A. S. Beng., xxviii., стр. 283 (1859); id., Кат. Mamm. As. Soc. Mus., стр. 14 (1863).

Presbytis jubatus, иер., мам. Индия, стр. 7 (1867).

Персонажи. Шерсть длинная и блестящая, полностью черная или коричневато-черная; волосы на макушке и по бокам головы очень длинные, не расходящиеся в стороны, желтовато-коричневые; нижняя часть спины и основание хвоста серые. Длина тела 26 дюймов; хвоста 30 дюймов; измеренная очень крупная особь: тело 29 дюймов; хвост 37. (*Хорнадей*.)

Почти родственен следующему виду (*S. cephalopterus*) с Цейлона и *S. obscurus*, обитающему на восточной стороне Бенгальского залива.

Женский.—С желтовато-белым пятном внутри каждого бедра. (*Дэвисон*.)

Распространение.—В густых, резко очерченных лесах холмов Нилгири, к югу от мыса Коморин, выше 2500 футов.

Привычки.—Этот вид живет небольшими стаями по десять-двенадцать особей и отличается необычайными прыжками, которые он может совершать. "Это застенчивость и настороженность, результат, - как утверждает доктор Блэнфорд, - человеческих преследований. Это очень шумный, гортанный тревожный крик, используемый также для выражения гнева, и долгий громкий зов".

Джердон рассказывает, "что когда шло хребта Нилгири были избиты для охоты, эти обезьяны быстро и с громкими криками пробрались в самую нижнюю часть, а оттуда в соседний лес на более низком уровне. Из-за красоты их кожи и того обстоятельства, что определенные касты едят их мясо, этих обезьян отстреливают чаще, чем большинство представителей индийского вида: отсюда их застенчивость".

VIII. ПУРПУРНОЛИЦЫЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК ГОЛОВОНОГИЙ.

Cercopithecus vetulus, Erxl., Sist. Rég. An., Mamm., стр. 25 (1777; частично).

Cercopithecus senex, Erxl., т.н., стр. 24 (1777); Zimm., Geogr. Gesch., ii., p. 183 (1780); Blanford, Faun. Брит. Ind., Mamm., стр. 35 (1891).

Cercopithecus kephalopterus, Zimm., указ. соч. и т. д., стр. 185 (1780); Bodd., Elench. An., стр. 58 (1785); Фишер, Syst. Mamm., стр. 17 (1829).

Симия ветер, Шоу, генерал. Зоол., i., стр. 36 (1800).

Cercopithecus leucoprymnus, Отто, N. Acta. Акад. Цезарь. Леоп., xii., p. 505, pl. xlv. bis (1825).

Semnopithecus fulvo-griseus, Десмоул., Диктант. Класс. История. Nat., vii., стр. 570 (1825); Джеффри, C. R., xv., стр. 719 (1842).

Semnopithecus leucoprymnus, Desmaret, Dict. Sci. Nat., xlviii., стр. 439 (1827); Вагнер, в Schreber, Säugeth. Дополнение., v., стр. 25 (1825); Грей, Кот. Обезьяны брит. Муз., стр. 14 (1870).

Macacus silenus, вар. альба, Фишер, Syn. Mamm., 1829, стр. 28.

Семнопитек нестор, Беннетт, P. Z. S., 1833, стр. 67; Уотерх., P. Z. S., 1844, стр. 1.

Presbytes cephalopterus, Серый, Рукописный список Мамм., стр. 4 (1843); Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 734, 1271 (1847); Келаарт, Прodr. Фавн. Зейлан., стр. 1 (1852); Теннент, Цейлон, стр. 5, табличка, рис. 3 (1861); Блит, Кат. Мамм. Mus. As. Soc. Бенг., стр. 13 (1862).

? *Пресвитер Терсит*, Рукопись Эллиота.; Блит, J. A. S. Beng., xvi., стр. 1271, pl. liv., рис. 3 (1847); Блэнфорд, P. Z. S., 1887, стр. 626 (1891).

Пресвитер альбинус, Келаарт, Фавн. Zeylan., p. 7. (1852).

Семнопитек головоногий, Мартин, Маммиф. An., p. 482 (1841); Schlegel, Mus. Пайбас, vii., стр. 51 (1876); Андерсон, представитель Зоол. Ускор. Юнь-нань, стр. 22 (1878; полная синонимия); Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Мамм., стр. 34 (1891).

Semnopithecus kelaartii, Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 52 (1876).

Персонажи. Шерсть на темени не расходится; макушка и затылок темно-коричневые; спина и конечности более темные, дымчато-коричневые; нижняя часть спины, основание хвоста и верхняя задняя поверхность бедер варьируют от пепельно-серого до серовато-белого цвета, вымытые, у незрелых особей коричневые; кисти и ступни черные; надорбитальные волосы черные, выступают наружу, доходят почти до ушей; длинные и бросающиеся в глаза усы белые, скрывают основания ушей и образуют своего рода ерш, окружающий лицо; подбородок и горло белые — Морда пурпурно-черная. Хвост у основания темно-серый, с беловатым хохолком на кончике. Нижняя

поверхность темно-серая; внутренние стороны бедер перед мозолями бледно-желтые или белые. Длина тела 21 дюйм; хвоста 31 дюйм.

Молодые.—В целом похож на родителей. Молодая самка с Цейлона, обследованная доктором Андерсоном, была однородной бледно-желтоватой, макушка головы слегка окрашена в коричневатый цвет, а плечи и середина спины - в темный.

Иногда встречается белая разновидность (*S. senex*). "Не может быть никаких сомнений, - говорит доктор Андерсон, - что *S. cephalopterus*, *S. ursinus* и *S. johni* чрезвычайно тесно связаны друг с другом"; и действительно, сомнительно, не являются ли они местными расами одного и того же вида.

Распространение.—Остров Цейлон.

Привычки.Сэр Э. Теннент в своей "Естественной истории Цейлона" дал следующее описание этого вида:

"Хотя эта обезьяна распространена в южных и западных провинциях, она никогда не встречается на высоте более 1300 футов. Это активное и умное существо, немногим крупнее обыкновенной шляпчатой макаки и далеко не такое озорное, как другие обезьяны острова. В неволе он примечателен серьезностью своего поведения и оттенком меланхолии в выражении лица и движениях, которые полностью соответствуют его белоснежной бороде и почтенному виду. По характеру он нежен и доверчив, чувствителен в высшей степени к доброте и жаждет ласкового внимания, издавая низкий, жалобный крик, когда возбуждается его симпатия. Прирученный, он особенно чистоплотен в своих привычках и проводит большую часть времени за стрижкой своего меха и тщательным очищением шерсти от частиц пыли.

"Те, что я держал у себя дома недалеко от Коломбо, питались в основном бананами и бананами, но ни к чему они не проявляли большего пристрастия, чем к розовым цветкам красного гибискуса (*H. rosa-sinensis*). Их они поглощали с недвусмысленным аппетитом; точно так же им нравились листья многих других деревьев и даже кора нескольких наиболее сочных.

"Белую обезьяну, пойманную между Амбепуссе и Корнегалле, где, как говорят, их много, привезли ко мне в Коломбо. За исключением цвета, он обладал всеми характеристиками *Presbytes cephalopterus*. Его белизна была настолько поразительной, что его можно было бы принять за альбиноса, если бы не то обстоятельство, что его глаза и лицо были черными. Я слышал, что белых обезьян видели недалеко от Риди-галле Вихара в Семи Кораллах, а также в Тангалле; но я никогда не видел другого экземпляра. Туземцы говорят, что они не редкость, а Нокс утверждает, что они "молочно-белые как телом, так и лицом: но этого вида не так много". Преподобный Р. Спенс Харди упоминает в своей ученой работе о "Восточном монашестве", что по случаю своего посещения великого храма Дамбул он встретил стаю Белых обезьян на скале, в которой он расположен, которые, несомненно, были разновидностью Вандеру. Плиний знал о том факте, что белые обезьяны иногда встречаются в Индии.

"При наблюдении в их родной дикой природе группа из двадцати или тридцати этих существ обычно занята поиском ягод и бутонов. Их редко можно увидеть на земле, за исключением тех случаев, когда они спускаются, чтобы собрать семена или плоды, упавшие к подножию их любимых деревьев. Когда их потревожат, их прыжки невероятны; но, вообще говоря, они продвигаются вперед не столько за счет прыжков, сколько за счет перепрыгивания с ветки на ветку, попеременно используя свои мощные руки; а когда расстояние сбивает их с толку, они бросаются наискось, чтобы уцепиться за нижние ветви противоположного дерева, причем инерции, полученной при падении, достаточно, чтобы вызвать отскок от ветки, которая снова

уносит их вверх, пока они не смогут ухватиться за более высокую и удаленную ветку и таким образом продолжить свой стремительный полет. Эти опасные достижения вызывают удивление не столько непревзойденной ловкостью этих маленьких созданий, часто обремененных своими детенышами, которые цепляются за них на протяжении всей их карьеры, сколько быстротой их зрения и безошибочной точностью, с которой они, кажется, почти вычисляют угол, под которым спуск позволит им преодолеть заданное расстояние, и отдачу, чтобы достичь большей высоты ".

IX. ПАЙТАНСКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК САБАНУС.

Семнопитек сабанус, Томас, Анна и Маг. Нац. История. (6), xii., p. 230, pl. vii. (глава), (1893).

ТАБЛИЧКА XXXV.



ЛАНГУР ХОСА.

Персонажи.— Связан с *С. Хосии*, *С. эверетти* и *С. томази*. Тело, хвост и конечности серые; лоб с высоким вертикальным срединным гребнем, начинающимся на лбу, черный, с редкими белыми волосками; надбровные щетинки длинные, черные, выступают вперед над глазами; волосы на лбу по обе стороны от гребня, плотно прилегают к голове, белые по всей макушке (с несколькими

черными волосками), но на затылке имеют более темные кончики; стороны лица от орбит до ушей совершенно черные; затылочные волосы направлены назад, а не вперед, как у *S. thomasi*. Подбородок, боковые стороны шеи, горла и грудь сероватые, а не белые, как у родственных видов. Нижняя сторона тела и внутренняя сторона предплечий, а также ноги до лодыжек белые, становящиеся более серыми дистально; кисти и ступни блестяще-черные; передние руки до запястий и ноги до лодыжек серо-серые, как и хвост, сверху и снизу. Кожа лица, вероятно, телесного цвета между и поперек орбит и вокруг щек, в других местах черная. Длина тела 23½ дюйма; хвоста 30 дюймов.

Череп шире и круглее, чем у родственных видов; восходящий отросток верхнечелюстных костей сочленяется с лобными, закрывая прежние кости со стороны носовых. У родственных видов кожа лица почти или совсем черная по всему телу, а подбородок, боковые стороны шеи, горло и грудь чисто белые.

Распространение.—Пайтан, Северное Борнео. Открыт ветераном-путешественником с острова Борнео Альфредом Эвереттом.

ЛАНГУР Х. ХОСА. SEMNOPITHECUS HOSII.

(Табличка XXXV.)

Semnopithecus hosii, Томас, P. Z. S., 1889, стр. 159, стр. xvi.; Хозе, мама. Борнео, стр. 10 (1893).

Характерные признаки.—Макушка с продольным центральным гребнем, волосы равномерно зачесаны назад, без вывернутого пучка волос на затылке; общий цвет спины, плеч, внешних сторон конечностей и хвоста (хотя сверху темнее, чем снизу) седовато-серый, волосы с примесью черного и белого; гребень, центр макушки и затылок темно-глянцево-черные; вся остальная часть головы, лоб, виски, боковые стороны макушки и шеи, щеки, губы, носовая перегородка, подбородок с хохолком, передняя часть шеи, грудь, нижняя сторона тела и внутренняя сторона конечностей до середины предплечья и голени чисто белая; кисти и ступни темно-черные; лицо черное.

Носовые кости длинные и тонкие, профиль довольно прямой и переходит в линию лба. Длина тела 20 с половиной дюймов; хвоста 26 с половиной дюймов. (Томас.)

Этот красивый вид отличается от всех известных *семнопитеков* заметным контрастом окраски, представленным черным гребнем и белыми лбом и щеками.

Распространение.—Ниах, в округе Барам; Гора Дулит, гора Бату Сонг: все в Сараваке, Борнео.

Привычки.— "Вид этой обезьяны — Бангат из племени Кайанов - был застрелен, - пишет мистер Чарльз Хоуз (в честь которого назван этот вид), - в местечке под названием Ниах, в округе Барам. Я раздобыл несколько экземпляров в разных частях страны, но, хотя его часто можно увидеть в низменности, я думаю, мы должны рассматривать его как горный вид, который в определенное время покидает горы в поисках фруктов. Он поднимается на гору Дулит на высоту 4000 футов, но чаще встречается на высоте 2000 футов. Он часто посещает соляные источники, которые распространены во внутренних районах страны, взбивая грязь, и именно у этих соляных источников пунанцы добывают множество экземпляров с духовыми трубками и отравленными стрелами. От этой обезьяны получают безоаровые камни, которые находятся либо в желчном пузыре, либо в кишечнике. Звук, который издает животное, громкий и отчетливый — *Гагах, гагах*. Детеныши похожи цветом кожи на взрослых и чрезвычайно хорошенькие создания, но они недолго живут в заточении и никогда не перенесут путешествия в Англию, так как сильно страдают от морской болезни".

XI. ЛАНГУР ТОМАСА. СЕМНОПИТЕК ТОМАСИ.

Semnopithecus thomasi, Коллетт, P. Z. S., 1892, стр. 613, pl. xlii.

Описание.Центральный затылочный гребень, сначала наклоненный назад, обращенный вспять на затылке, черный на макушке; с нижними нечеткими гребнями по обе стороны белого лба. Общий окрас сверху темно-серый — каждый волос частично черный и частично белый; снизу белый; черная полоса от верхней челюсти до уха и черная центральная полоса на лбу; руки и ступни черные. (*Коллетт*.)

Очень старые самцы более темного окраса, верхняя часть головы коричневатая-черная, передняя часть беловатая. Старые самки меньше; молодые шелковистые и почти белые со всех сторон.

Близкородственный и очень похожий на *S. hosii*, но щеки не образуют единой белой области с белым лбом, пространство разделено черной полосой от края рта до уха (у молодого самца и у самки). У старого самца верхняя часть щек совершенно черная. Длина тела 24½ дюйма; хвоста около 32 дюймов.

Распространение.Нынешний вид был обнаружен в районе Лангкат на северо-востоке Суматры мистером Иверсеном, норвежским путешественником по этому острову, и назван в честь мистера Олдфилда Томаса, известного маммолога Британского музея.

Привычки.Эти обезьяны живут небольшими группами, состоящими из представителей обоих полов, на самых высоких деревьях в сухих местах леса, никогда по собственной воле не спускаясь на землю и не посещая рисовые поля, поскольку их пища, по-видимому, состоит исключительно из фруктов. По словам г-на Иверсена, первооткрывателя этого вида, их можно встретить в любое время года в одних и тех же частях леса. Они почти никогда не посещают более открытые места, но держатся на самых высоких верхушках деревьев и совершают самые удивительные прыжки с ветки на ветку. Наблюдаемые были очень застенчивыми и, будучи замеченными, пытались спрятаться в покрытых листвой верхушках деревьев, даже оставляя своих детенышей незащищенными на нижних ветвях. Мать носит своего детеныша под животом. Этот вид часто наблюдали в компании с сиамангом (*Hylobates syndactylus*), но не с другими обезьянами.


XII. ЛАНГУР ЭВЕРЕТТА. СЕМНОПИТЕК ЭВЕРЕТТИ.

Semnopithecus everetti, Томас, P. Z. S., 1892, стр. 582, pl. xli.; Шланг, мама. Борн., стр. 15 (1893).

(*Фото XXXVI.*)

Персонажи.—Очень близкий родственник и очень похожий на *S. hosii* по размеру и окраске, но белый цвет повсюду заменен тускло-кремовым, придавая желтоватый оттенок смешанному серому цвету спины и хвоста; плечи и середина спины более темные; нижняя поверхность тела и светлые части головы кремового цвета, а не белого; весь лоб и макушка головы черные, нижняя граница черного проходит через середину уха; вся задняя часть шеи черная; пятно в центре лба над тем местом, где сходятся брови, желтовато-белое. Цвет лица, щек и боковых сторон шеи, в отличие от темной макушки, отличает этот вид от *S. chrysomelas*. Длина тела 21½ дюйма; хвоста 25½ дюйма. (*Томас*.)

"С тех пор как мистер Томас описал эту обезьяну, - пишет мистер К. Хоуз в своей книге "Млекопитающие Борнео", - я получил несколько других экземпляров ... и маркировка довольно постоянна".



ЛАНГУР ЭВЕРЕТТА.

Распространение.—Борнео: гора Кина Балу. Гора Дулит и гора Бату Сонг в Сараваке, возвышающиеся на высоте от 3000 до 3500 футов над уровнем моря.

Привычки.—Этот вид является чисто горной формой и не спускается на равнины.

XIII. ЛАНГУР, НЕСУЩИЙ КРЕСТ. SEMNORITHECUS CRUCIGER.

Semnopithecus cruciger, Томас, Ann. N. H. (6), x., стр. 475 (1892); id., P. Z. S., 1893, стр. 3; Шланг, мама. Борнео, Стр. 15 (1893).

Персонажи. Шерсть длинная и мягкая на голове и плечах; волосы на макушке повсюду стоят торчком, но несколько длиннее по средней линии; макушка каштановая; бока тела от подмышечных впадин, бедер и внешней стороны ног до лодыжек ярко-красные, более бледные на голени; плечи и внешняя сторона передней конечности, кисти, затылок и средняя линия спины темно-глянцево-черные, иногда испещренные рыжими и черными волосками; брови черные; короткие волосы на лице, бакенбарды, волосы на ушах, по бокам шеи, подбородка и по бокам спины. вся нижняя сторона тела и линии вдоль внутренних сторон конечностей глянцевато-белые с желтым оттенком; хвост у основания вверх черный и более тусклый на кончике.

Детеныши помечены так же, как и взрослые.

Распространение. — Борнео; Бакам, в округе Барам в Сараваке, где он был обнаружен мистером Чарльзом Хосом. С тех пор он добыл его на реке Батанг Лупар в Западном Сараваке.

XIV. МЕДВЕЖИЙ ЛАНГУР. SEMNOPITHECUS URSINUS.

Presbytis ursinus, Блит, J. A. S. Beng., xx., стр. 155, 182 (1851); id., Кат. Мамм. Как. Соч. Муз., стр. 13 (1863); Келаарт, произв. Фавн. Zeylan., p. 2 (1852).

Semnopithecus ursinus, Андерсон, представитель зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 24 (1878); Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд. Мама., стр. 36 (1891).

Персонажи. — Очень близок к *S. cephalopterus*, но крупнее; шерсть по бокам очень длинная. Шерсть более рыжая на макушке; на затылке сероватая; нижняя часть спины и бедер не имеет серого цвета; усы, борода, шея и грудь беловатые; внизу того же цвета, что и спина.

Распространение. — Остров Цейлон, где он ограничен горами.

Привычки. Для описания повадок этого вида мы снова обращаемся к страницам этого замечательного историка, сэра Э. Теннента:

"Обитающий в низинах Вандеру, - записывает он, - заменяется на холмах более крупным видом, *P. ursinus*, который обитает в горной зоне. Туземцы, которые называют последний "Маха", или Большой Вандеру, чтобы отличить его от "Калу", или черного зверя, с которым они знакомы, описывают его как гораздо более дикого и могущественного, чем его сородичи из лесов низменности. Европейцы редко видят его, поскольку эта часть страны до недавнего времени была открыта лишь частично; и даже сейчас трудно наблюдать за его обычаями, поскольку он редко приближается к немногочисленным дорогам, которые вьются через эти глубокие безлюдные места. Ранним утром, перед рассветом, его громкий и своеобразный вой, состоящий из быстрого повторения звуков "Как, как!", часто можно услышать в горных джунглях, и он является одним из характерных звуков этих возвышенных мест. Впервые он был пойман доктором Келаартом в лесах близ Нуэра-Элли, и из-за его необычного внешнего вида мистер Блайт назвал его *P. ursinus*".

XV. СМУГЛЫЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК ОБСКУРУС.

Semnopithecus obscurus, Рейд, P. Z. S., 1837, стр. 14; Мартин, Маммиф. An., стр. 486 (1841); Murie, P. Z. S., 1865, стр. 742; Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 14 (1870); Шл., Муз. Пайбас, vii., стр. 49 (1876); Андерс., Зоол. RES. Yun-nan Exped., стр. 25 (1878; с полной синонимией); Томас, P. Z. S., 1886, стр. 66; Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Мамм., стр. 41 (1891).

Semnopithecus leucomystax, Müll. и Schl., Verhandl., стр. 59 (1839-44).

Semnopithecus albocinereus, Менше., Sp. Mammif., стр. 65 (1840).

Пресвитер обскура, Серый, Ручной. Список Мамм. Brit. Mus., стр. 3 (1843); Блит, J. A. S. Beng., xiii., стр. 467 (1844).

Semnopithecus halonifer, Кантор, Прок. Linn. Soc., 1845, стр. 235.

Персонажи.— Волосы на макушке не расходятся лучами; сзади длиннее, образуя желтовато-белый пучок. Тело черновато-коричневое, более темное на лбу, по бокам лица, по бокам туловища и конечностей; кисти и ступни черные; затылок и середина спины коричневатые; хвост коричневатый, без хохолка; нижняя поверхность и внутренняя сторона конечностей не такие темные, как спина или бока; лицо черное, но рот и веки беловатые; длина тела 21 дюйм; хвоста 32 дюйма.

Женский.— Немного коричневее, чем у самца.

Молодые.— Ярко-золотисто-красный, но очень скоро приобретающий окрас взрослой особи.

М-р Томас упоминает (P. Z. S., 1886, стр. 66) особь очень примечательной окраски, отличающуюся от всех остальных желтым цветом гребня, затылка, рук, ног и хвоста, заметно контрастирующим с темными оттенками лица, туловища и ступней. Однако к нему приближается экземпляр из Британского музея из Малакки, собранный доктором Кантором, у которого гребень желтый, а конечности и хвост светлее обычного. Однако его слуховые бугорки крупнее и более выступают, а зубы мельче, чем обычно у *S. obscurus*.

Распространение.— Сиам; Малайский полуостров; Тенассерим, гора Мулеит, на высоте 5000 футов.

XVI. ЛАНГУР АНДЕРСОНА. СЕМНОПИТЕК ГОЛОТЕФРЕЙ.

Semnopithecus holotephreus, Андер., зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 27 (1878).

Характеры.— "Однородный темно-сланцево-серый цвет, переходящий в черный на предплечье и кистях, а также на ступнях. Нижняя поверхность и внутренняя сторона передних конечностей и бедер бледно-желтовато-серые. Голова слегка вздернута на макушке, но со слабой тенденцией к боковому сжатию. Надорбитальные волосы умеренно длинные и черные. Усы довольно длинные, направлены назад и наружу, скрывая уши спереди. Лицо иссиня-черное; область вокруг глаз и губ белая. Длина тела 21½ дюйма; хвоста 24½ дюйма". (Андерсон.)

Распространение и привычки.— Неизвестно.

XVII. ЛАНГУР ЖЕРМЕНА. SEMNOPITHECUS GERMAINI.

Semnopithecus germaini, Милн-Эдвардс, Бюлл. Соч. Филом., Сеанс, 12 февраля 1876 г.; Андерсон, Зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 27 (1878); Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 34 (1876).

Персонажи. Тело черноватое, окрашено в бледно-серебристо-серый цвет; руки и ступни черные. Надглазничные волоски, выступающие наружу и назад, черные; усы длинные и серые; волосы на боках длинные и серые; хвост серый; нижняя поверхность серая.

Молодой.— "Ярко-оранжево-желтый; верхняя часть головы, передние лапы и лапы черноватые". (Андерсон.)

Распространение.—Кочин-Китай, где он был открыт М. Жерменом.

XVIII. НЕГРИТЯНСКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК МАУРУС.

Симия мора, Шребер, *Säugeth.*, i., стр. 107, стр. xxii. В. (1775); Шоу, Быт. Зоол., i., стр. 47 (1800).

Cercopithecus maurus, Эркслебен, *Syst. Régn. Аним.*, стр. 41 (1777).

Simia cristatus, Raffles, *Tr. Linn. Soc.*, xiii., стр. 245 (1822).

Semnopithecus maurus, F. Cuv., *Hist. Nat., Mamm.*, pl. xii. (1822); Wagner, in Schreber, *Säugeth. Дополнение.*, v., стр. 23 (1855); Грей, Кат. Обезьяны брит. Муз., стр. 15 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 54 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 27 (1878; с полной синонимией).

Semnopithecus pyrrhus, Хорсфилд, Зоол. Рез. Ява, табличка (1821); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 50 (1876).

Semnopithecus pruinosus, Desmar., Маммолог., 1820, Дополнение, стр. 333; Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 58 (1876); Джентинк, Примечания Лейб. музея, xi., стр. 215, стр. ix (1887); ид., указ. соч., xiii., стр. 207 (1891).

Цейлонская обезьяна, Десмоул., Диктант. Класс. История. Нац., vii., стр. 572 (1825).

Семнопитек кристатус, Müll., *Tijds. V. Нац. Gesch.*, ii., p. 316 (1835); Müll. et Schl., *Verhandl.*, стр. 61, 77, стр. 12, рис. 1 (молодой; 1839-44); Серый, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 15 (1870); Андерсон, Зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 29 (1878); Хосе, мама. Борнео, стр. 15 (1893).

Персонажи.—Волосы, расходящиеся от центра или по всему лицу, красновато-черные; длинные и пушистые бакенбарды по бокам лица и переходящие за уши. Шерсть обычно длинная. Общая окраска по всему телу темно-черная, у пожилых особей волосы на кончиках становятся серебристо-серыми; пятно на нижней стороне основания хвоста белое. Длина тела 17½ дюйма; хвоста 23½ дюйма.

Молодые.— Однородный красновато-коричневый, вскоре переходящий в цвет взрослой особи; рыжий оттенок исчезает с усов в последнюю очередь. Говорят, что окраска детенышей особенно характерна только для самок и сохраняется на протяжении всей жизни; но, как отмечает доктор Андерсон, это не обычная разновидность, и такие окрашенные взрослые особи высоко ценятся на Яве.

Распространение.—Малайский полуостров. Суматра; Паданг, Бенкулен, лампонги. Ява. Биллитон. Борнео; на реке Барам, а также на горе Дулит.

Привычки.Эти обезьяны поднимаются в горы на Борнео примерно на 2000 футов; они также довольно распространены в низменностях, и даяки называют их "бигок", а кайанцы "чикок" из—за производимого ими шума. (С. Хозе.)

XIX. ПОЛОСАТЫЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК БЕДРЕННЫЙ.

Симия маура, Раффлс (нек. Schreb.), *Tr. Linn Soc.*, xiii., стр. 247 (1822).

Семнопитек бедренный, Horsf. Приложение. Life Raffl., стр. 643 (1830); Мартин, Маммиф. An., стр. 480 (1841; частично); Horsf., Kat. Mamm. E. I. Co. Mus., p. 10 (1851); Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 45 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоритель. Юнь-нань, стр. 30 (1878; с полной синонимией); Томас, P. Z. S., 1886, стр. 66; Блэнфорд, Фавн. Брит. Инд., м., стр. 42 (1891); Хосе, м. Борнео, стр. 13 (1893).

Semnopithecus chrysomelas, Müll. Tijds., Nat. Ges., v., стр. 138, табличка (1838); Вагнер, в сборнике Schreb., Säugeth. Дополнение, v., стр. 22 (1855; частично).

Semnopithecus sumatranus, Müll. und Schl. Verh., pp. 6, 73, pl. 10 bis, fig. 1 (1839-44).

Simia femoralis, Кантор, J. A. S. Beng., xv., стр. 175.

Персонажи. Голова с довольно коротким вертикальным гребнем, направленным назад, и волосами спереди, направленными вперед над глазами. Доминирующий цвет - коричневаточерный, заменяемый белым на задней части живота и хвосте, который слегка опушен на кончике, и более или менее на внутренней стороне обеих конечностей, а также в центре груди. Лицо, уши, ладони и бока ступней черные.

Молодые. — Похожи на взрослых особей, но горло, грудь, брюшко желтовато-белые.

Распространение. — Острова Суматра и Борнео.

Привычки. — Это низменная обезьяна, согласно этому превосходному наблюдателю мистеру К. Хосу, и ее редко можно встретить в горах, и то только на высоте около 1000 футов. Он любит жить недалеко от берега моря и обычно встречается в количестве от десяти до тридцати человек, сидя на ветвях высоких деревьев на открытых пространствах. Его даякское название "Бигит", а кайанское - "Пант".

Очень близким родственником этого вида, если, конечно, он действительно отличается, является золотой лангур, или малайский лотонг, *S. auratus*, Джеффр. (Ann. Mus., xix., стр. 93, 1812), который является синонимом *S. chrysomelas* Вагнера, поскольку они совпадают во всех отношениях, за исключением того, что последний светлее и имеет черные волосы, перемешанные с желтоватыми волосками на голове, хвосте и конечностях.

Professor Schlegel has (Mus. Пайбас, vii., стр. 47) выделил образец из Сингапура, тесно связанный с *S. femoralis*, в отдельный вид под названием *S. neglectus*. Его легко отличить, как он указывает, по общему оттенку его меха: черный, постепенно переходящий в серовато-коричневый, с белыми крапинками кое-где; по средней линии груди, в нижней части живота, на внутренней стороне передних конечностей и только на бедрах есть что-либо белое; это и равномерно темный хвост отличают *S. neglectus* от *S. femoralis* и *S. chrysomelas*.

XX. ТЕМНО-БОРДОВЫЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК РУБИКУНДУС.

Semnopithecus rubicundus, Müller, Tijdschr., Nat. Gesch., v., стр. 137, cum tab. (1838); Мартин, Маммиф. An., стр. 473 (1841); Грей, Кот. Обезьяны брит. Муз., стр. 17 (1870); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 33 (1878; с синонимией); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 36 (1876); Шланг, мама. Борнео, стр. 9 (1893).

Характеры. — Отличается от *S. rubicundus* насыщенным темно-бордово-красным цветом, расходящимися волосами на лбу и сжатым, полустоячим гребнем. Как указывает доктор Андерсон, это единственный вид с расходящимися волосами на лбу.

Привычки. Мистер Хосс замечает: "Даяки Саравака называют эту красивую рыжую обезьяну "Джеллу мера", а кайанцы — "Калади", и она распространена повсюду. Обычно их можно увидеть в большом количестве, и около тридцати или сорока часто проходят мимо одного в джунглях, перепрыгивая с ветки на ветку и производя ужасающий шум. Иногда они, когда на них лает собака, нападают на нее и наносят очень сильный укус. Они поднимаются в горы на высоту 3000 футов; но на этой высоте цвет их волос становится гораздо более темно-красным. Они очень разрушительны во фруктовых садах".

XXI. НАТУНСКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК НАТУНСКИЙ.

Semnopithecus natunæ, Олдфилд Томас и Хартерт, ноябрь Зоол. i., стр. 652 (1894).

Признаки. — Взрослый самец. — Размер, пропорции и окраска, демонстрирующие общее сходство с группой *S. femoralis*, преобладающими цветами являются черный и белый. В то время как, однако, лоб, передние конечности и кисти, голени и ступни, а также хвост (как сверху, так и снизу) темно-глянцево-черные, сама спина, включая затылок, затылок и плечи, коричневая. Бедрa вдоль узкой полосы на внешней стороне пепельно-серые, переходящие дистально в черные голени, но их задняя сторона, продолжающаяся с внутренней стороны, совершенно белая, что придает животному очень своеобразный и характерный вид, совершенно непохожий ни на один известный нам вид, за одним исключением, что у *M. siamensis* беловатые пятна примерно в том же положении. Вся нижняя поверхность, с боковыми сторонами шеи, волосками на внутренней стороне ушей и линиями вдоль внутренних сторон рук и ног, чисто кремово-белая. Лицо по всей поверхности покрыто тонким волосом, волоски черные, за исключением тех, что на носу, где есть беловатое пятно. Лоб с волосками, расходящимися в стороны и назад из одной центральной точки примерно на половину или три четверти дюйма позади бровей; сзади эти волоски значительно удлинены, как и волоски на затылке, причем последние направлены вперед и вверх таким образом, что черные волоски на лбу и коричневые волоски на затылке сходятся, образуя высокий гребень на макушке. (Олдфилд Томас и Хартерт, l.c.).

Молодые. — Господа . Олдфилд Томас и Хартерт описывают новорожденную особь следующим образом: "Средняя линия спинной поверхности от макушки до ануса и весь хвост темно-черные, ширина черных пятен на спине составляет около полутора дюймов; внешние стороны плеч сероватые, а также тыльная сторона кистей и ступней начинает становиться черной. Все остальное тело животного, включая лоб, руки и ноги, полностью чисто-белое".

"Хотя среди многих близкородственных видов *Semnopithecus* трудно быть уверенным в их взаимном родстве, кажется, что *S. natunæ* наиболее близок к *S. femoralis*, Horsf., и *S. siamensis*, M. и S. У обоих из них сходное расположение волос на темени и затылке; и, с другой стороны, у первого полностью черные руки, ноги и хвост, как у *S. natunæ*, и в определенной степени более коричневый оттенок спины, в то время как, с другой стороны, *S. siamensis* имеет беловатую нижнюю часть бока и светлое пятно на бедре, хотя и объединены совершенно иной окраской".

Привычки. — Мистер Эверетт делает следующее примечание: "Туземное название "Кка", которое является звукоподражательным. Эти животные были обычным явлением у подножия горы Ранаи, собирались в отряды и совершали большие опустошения в местных садах. Радужки светло-коричневые, как корица; морда мертвенно-черная, веки и морда белые; лапы и кисти очень темно-коричневые; уши снаружи черноватые, внешний край и внутренняя поверхность тускло-белые, в некоторой степени мраморные с багрово-черноватыми пятнами. У незрелой особи, едва достигшей половины взрослого возраста, белизна век, носа и подбородка была окрашена в тускло-розовый цвет; а под внешним углом каждой глазницы было голое голубовато-белое пятно, очень отчетливо выделявшееся из-за другого оттенка цвета, в то время как кожа лица в остальном была мертвенно-черной. Со взрослением эти голые белые пятна под углом орбит исчезают. Я

сохранил это животное живым, намереваясь вернуть его домой, но оно сдалось из-за тяжести нашего обратного перехода. Он питался листьями сладкого картофеля и тапиоки, и, хотя его недавно поймали, через несколько дней он стал очень нежным и робким. Сезон размножения у этих обезьян либо очень продолжительный, либо вообще не определен, поскольку я добыл их в октябре, когда начались дожди, на всех стадиях, от плодоножек длиной в три дюйма до половозрелых особей".

XXII. ЛАНГУР ФЕЙРА. SEMNOPITHECUS PHAYRII.

Semnopithecus obscurus (nec Reid), Блит, J. A. S. Beng., xiii., стр. 466 (1844).

Пресвитер фэйрей, Блит, указ. соч., xvi., стр. 733, стр. xxxvii., рис. 3 (1847); Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение v., стр. 28 (1855); Тикелл, J. A. S. Beng., xxviii., стр. 428 (1859).

Семнопитек аргентатус, Блит в Horsf. Cat. Mamm. E. I. Co. Mus., стр. 7 (1851).

Пресвитер кристатус, Рафл. apud Blyth, Mamm. Бирма, стр. 9 (nec Raffles).

Semnopithecus rubicundus, var. C., Серый, Кошка. Обезьяны, брит. Муз., стр. 17 (1870).

Semnopithecus phayrei, Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 34 (1878); ид., Кат. Mamm. Как. Соч. Бенг., с. 49; Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 33 (1876); Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 39 (1891).

Персонажи. Макушка головы с остроконечным продольным гребнем; шерсть на темени не расходится лучами, а удлинена и направлена назад; усы длинные и направлены наружу, частично прикрывая уши; спина, бока, предплечья, кисти и передняя часть ступней черновато—коричневые, середина спины окрашена в желтоватый цвет; подбородок, грудь и нижняя поверхность тела бледно-желтые; внутренняя сторона предплечий и бедер коричневая; лицо мертвенно-бледное, но веки, губы и кольцо вокруг глаз белые, телесного цвета; длина тела - 18½ дюйма; хвоста - 21½ дюйма.

Надглазничные выступы черепа не выступают, затылочная область вертикальная; лицевая часть наклонена книзу.

Бабу Рам Брамха Ланьял в письме из Зоологического сада Калькутты в июле 1893 года доктору Склейтеру пишет: "Я не знаю, скрещивались ли когда-либо где-либо близкородственные виды *семнопитеков*. Они довольно эксклюзивны в своих представлениях о супружеских отношениях. Во всяком случае, такое событие только что произошло в этом Саду. Лангур Фейра, или, как его часто называют, Листовидная обезьяна Фейра (*Semnopithecus phayrii*, Блит) родила детеныша — прелестного маленького детеныша нежного светло-оранжевого цвета. Поскольку в той же клетке не было другого самца, кроме *S. cristatus*, нет никаких сомнений в том, что детеныш является гибридом этих двух видов. Эти обезьяны жили вместе с 1880 года, и хотя они очень хорошо ладили друг с другом, за ними никогда не наблюдалось чрезмерного дружелюбия. Даже сейчас самец, похоже, не проявляет никакого интереса к потомству".

Распространение.—Ограничивается, насколько известно, Араканом.

XXIII. ЛАНГУР РАТЛЕДЖА. SEMNOPITHECUS RUTLEDGII.

S. rutledgii, андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 38 (1878).

Персонажи. Голова с очень хорошо выраженным стоячим срединным сжатым гребнем; лобные волосы не выступают над лицом. Общий окрас черный, волосы на голове, гребне, туловище и конечностях с блестящими седыми кончиками. Кисти и ступни черные. Нижняя поверхность более бледная, а кончики шерсти более седые; хвост сверху черный, снизу желтый, с седыми кончиками; усы длинные, разделенные назад и кверху, с широкими желтовато-серыми кончиками; борода сероватая; лицо иссиня-черное. Длина 17 дюймов; хвост 24½ дюйма. (Андерсон.)

Распространение и привычки. — Неизвестно.

XXIV. БЕЛОЛОБЫЙ ЛАНГУР. SEMNOPITHECUS FRONTATUS.

Semnopithecus frontatus, Müll., Tijds., Nat. Ges., v., стр. 136, pls. i. и ii. (1838); Мартин, Маммиф. Ан., стр. 475 (1841); Грей, Кот. Обезьяны брит. Муз., стр. 16 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 34 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 39 (1878; с полной синонимией); Шланг, мама. Борнео, стр. 12 (1893).

Персонажи. Общая окраска темно-желтовато-коричневая, у некоторых особей с рыжим отливом на боках; хвост покрыт хохолком. Этот вид сразу узнается по лысой треугольной морщинистой области между бровями молочно-белого цвета, остальная часть лица темно-черная, за исключением губ телесного цвета. Он также примечателен стоячим срединным гребнем, возвышающимся надо лбом; и длинными черными волосками на щеках, начинающимися около носа, увеличивающимися в длину на самой задней части щеки и достигающими почти до плеча.

Череп имеет сильно выпуклый, узкий и отступающий назад лоб; лицевая часть короткая.

Распространение. — Юго-восточный Борнео, где встречается очень редко.

XXV. ДУКСКИЙ ЛАНГУР. СЕМНОПИТЕК НЕМЕЙСКИЙ.

Обезьяна немейская, Линн., Богомол. Плант., стр. 521 (1771); Шребер, Säugeth., i., стр. 110, стр. xxiv. (1775).

Немейский церкопитек, Erxl., Sist. Règn. An., p. 42 (1777); Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 8 (1820).

Pygathrix nemæus, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 90 (1812).

Lasiopyga nemæus, Desm., Mamm., стр. 54 (1820); Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 13 (1870).

Semnopithecus nemæus, F. Cuv., Hist. Nat. Mamm., livr. 14 (май, 1825); Мартин, Маммиф. Аним., стр. 459 (1841); Вагнер в "Шребере". Säugeth. Suppl. v., p. 35 (1855); Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 64; Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 40 (1878; с полной синонимией).

Пресвитер Немей, Блит, J. A. S. Beng., xlv., стр. 11 (1875).

Персонажи. — Голова без гребня. Голое лицо, мозоли и обнаженные участки кистей и ступней желтые; голова коричневая, с узкой каштановой полосой, проходящей под ушами назад, и второй, но более широкой, окаймленной черным, поперек груди, от плеча до плеча; усы длинные и направленные назад, бледно—серые, с черными и белыми кольцами шерсти; верхняя поверхность тела и бока серые; основание шеи, груди и плеч, а также верхняя часть передних и задних конечностей, с кистями и ступнями, черные; лоб бледнее; подбородок черный. передние конечности до середины кистей, крестец, задняя часть поясницы и хвост чисто белые; нижняя часть задних конечностей до середины ступней красновато-коричневая. Хвост короче тела. Длина тела 25 дюймов; хвоста 20½ дюймов.

В черепе лоб низкий, внутриорбитальная область широкая, а лицевая часть широкая у основания. (Андерсон.) Большой палец хорошо развит. Плод примечателен своей пестрой окраской, а также белым пятном на крестце.

Женский.—Как самец. Детеныши мало чем отличаются от родителей. Пожилые особи сохраняют окраску, присущую их зрелости.

Распространение.—Северный Кочин-Китай; Хайнань. (Мейер.)

Привычки.—Доус действует большими отрядами.

XXVI. ЧЕРНОНОГИЙ ЛАНГУР. *SEMNOPITHECUS NIGRIPES*.

Semnopithecus nigripes, A. Милн-Эдвардс, Nouv. Arch. Mus. vi., p. 7 (1871); Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 32 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 4 (1878).

Характеры.—Похож на *S. petæus*, но отличается тем, что задние конечности черные, а передние поседели вместо белых. Усы короткие и черные, тело более стройное, длинное и полностью белое. Задние конечности также более удлинённые. Оба пола похожи друг на друга, и детеныши мало чем отличаются от взрослых.

Мозговая оболочка вдавлена, морда короткая, а межорбитальная припухлость, свойственная столь многим хохлатым *семнопитекам*, отсутствует.

Распространение.—Сайгон в Кочинхине, Китай, и леса, окаймляющие реку Меконг ближе к ее устью.

XXVII. ЧЕРНОХОХЛЫЙ ЛАНГУР. *SEMNOPITHECUS MELANOLOPHUS*.

Simia melalophus, Raffles, Tr. Linn. Soc., xiii., стр. 244 (1821).

Семнопитек мелалофус (Ле Симепай), F. Cuv., Hist. Nat., Mammif., livr. xxx. (Июль 1821 г.); Raffles, Tr. Linn. Soc., xxii., стр. 245 (1822); Desmar., Dict. Sc. Nat., xlviii., стр. 38 (1827); Martin, Mammif. Anim., стр. 470 (1841); Джеффри., Кат. Méth. Приматы, стр. 16 (1851); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 16 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 43 (1876; частично); Андерс., Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 34 (с полной синонимией; 1878).

Семнопитек флавиманус, Урок, столетие. Зоол., стр. 109, pl. xl. (1830); Is. Geoffr., Кат. Méth. Приматы, стр. 16 (1851).

Суматранский семнопитек, вар. *auratus* (nec Geoffr.), Müller and Schl. Verhandl., pl. x. bis, fig. 2 (1839-44).

Presbytes melanophus, Серый, Ручной. Список мамм. Брит. Муз., стр. 2 (1843).

Пресвитеры флавиманы, Грей, т.н., стр. 2 (1843).

Semnopithecus nobilis, Жерве, Hist. Nat., Mammif., стр. 63 (1854); Грей, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 17 (1870).

Семнопитек железистый, Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 42 (1876).

Персонажи. Голова с гребнем; гребень темно-коричневый, с темными кончиками; лоб бледно-желтый; линия от внешнего уголка глаза до уха темно-коричневая; спина, бока и плечи красноватые, окрашенные в бледно-коричневый цвет; остальные передние конечности, все задние конечности и хвост оранжево-красные. Длина тела - 18 дюймов; хвоста - 32 дюйма.

Золотистая разновидность (*S. auritus*) с Суматры, как правило, желтовато-красная по всей длине.

Череп сильно различаются по форме внутренних орбитальных углов лобных и затылочных костей.

Распространение. Суматра: Паданг, Индрапоэра, Бенкулен, Палембанг и лампонги.

Привычки. "Симпаи", как малайцы называют этого лангура, очень распространены на Суматре, где автор настоящего доклада добыл их как на севере президентства Палембанг, так и на юге лампонгов. Несомненно, отчасти именно к этому виду относится доктор Уоллес в своем "Малайском архипелаге", когда в Лобо Рамане он говорит, что они часто посещали деревья, нависающие над караульным помещением, в котором он жил. "Наиболее многочисленны были два вида *семнопитеков* — обезьяны стройной формы с длинными хвостами. Поскольку в них почти не стреляют, они довольно смелы и остаются совершенно беззаботными, когда рядом одни туземцы, но когда я выходил посмотреть на них, они таращились минуту или две, а затем убегали. Они совершают огромные прыжки с ветвей одного дерева на ветви другого, немного ниже, и очень забавно, когда один сильный вожак совершает смелый прыжок, видеть, как остальные следуют за ним с большим или меньшим трепетом; и часто случается, что один или двое из последних, кажется, совершенно не в состоянии решиться прыгнуть, пока остальные не исчезнут, когда, словно в отчаянии оттого, что их оставили в покое, они отчаянно подбрасываются в воздух и часто с треском пробиваются сквозь тонкие ветви и падают на землю".

XXVIII. ЛАНГУР С МИТРОЙ. *SEMNOPIHECUS MITRATUS*.

Пресвитер митрата, эшхольц, в Коцебу. Рейс., стр. 196, *cum tab.* (1821).

Семнопитек коматус, Десмар., мамм. Дополнение, стр. 533 (1822); Мартин, Маммиф. Anim., p. 468 (1841); Wagner in Schreber Säugeth. Дополнение v., стр. 24 (1855).

Semnopithecus fulvo-griseus, Десмоль., Дикт. История. Нац., vii., стр. 570 (1825).

Semnopithecus fascicularis, Оуэн, P. Z. S., 1833, стр. 75.

Semnopithecus mitratus, Сл., Очерки физики. Serp., стр. 237 (1837); Джеффри, Кат. Méth. Приматы, стр. 16 (1851); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 16 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 37 (1876); Андерс., Зоол. RES. Дополнение. Юнь-нань, стр. 36, (1878; с полной синонимией).

Semnopithecus siamensis, Müll. u. Schl., Верх., стр. 60 (1841); Anders., т.н., стр. 37 (с синонимией).

Semnopithecus albocinereus, Blyth, J. A. S. Beng., xii., стр. 175 (1843); Schl., Mus. Пэйс-Бас, vii., стр. 38 (1876).

Presbytes argentatus, Блит; Хорс. Кат. Мамм. E. I. Co. Mus., стр. 7 (1851).

Semnopithecus nigrimanus et *S. cinereus*, Майварт, P. Z. S., 1864, стр. 625, 626.

Presbytes cristatus (некрасовый) и *P. melanolphus*, Блит, Мамм. Бирма, стр. 9 (1875).

Персонажи. Голова со сжатым черноватым хохолком; волосы расходятся ото лба над глазами; макушка над серой, смешанной с черной, становящейся черной на передней части хохолка и затылке; бока, нижняя поверхность тела и хвоста, а также внутренняя сторона конечностей грязно-белые; руки и ноги беловатые, с примесью черных или рыжеватых волос; верхняя поверхность хвоста темно-серая, кончик более светлый и с хохолком; уши и морда темно-черные; ноги телесного цвета; подбородок и горло белые. Длина тела 20½ дюймов; хвоста 28½ дюймов.

Самый задний нижний коренной зуб, как правило, имеет только четыре бугорка.

Разновидность этого вида, обитающего в Сиаме, имеет мясисто-белую область вокруг глаз и рта.

Распространение. — Сиам; Малайский полуостров; и Суматра.

XXIX. МУПИНСКИЙ ЛАНГУР. *SEMNOPITHECUS ROXELLANAE*.

Semnopithecus roxellanae, А. Милн-Эдвардс, С. R., lxx., стр. 341 (1870); Сл., Муз. Пэйс-Бас, vii., стр. 65 (1876).

Rhinopithecus roxellanae, id., Речь., Mammif., стр. 233, pls. xxxvi., xxxvii. (1868-1874); Блит, мама. Бирм., стр. 11 (1875).

Semnopithecus (Nasalis) roxellanae, андерс., зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 43 (1878).

Персонажи. Лицо голое, нос вдавлен посередине, кончик приподнят и заканчивается своеобразным листовидным заострением; стороны лица и брови покрыты густым хохолком, который тянется линией через лицо к носу; лицо зеленое; лобная область, стороны лица, ушная раковина, бока шеи и плеч, подбородок, грудь, внутренняя сторона передних конечностей и верхняя сторона ступней желтые; макушка головы серовато—черная с рыжиной; от затылка (с внешней стороны передней конечности) нижняя часть спины серебристо-серая, темнее к шее, светлее к хвосту и передней части бедер, где она окрашена в ярко-желтовато-серый цвет; мозоли и внешняя сторона бедер ярко-желтые; нижняя поверхность тела серая с желтым оттенком; хвост серый у основания, с хохолком на кончике и желтый; большой палец очень короткий. Длина тела 26 дюймов; хвоста 21 дюйм.

Женский. — Похож на мужской, но более тусклый.

Молодые. — Также более бледный, с более желтовато-серыми краями вокруг ушей, но макушка головы не черная. (Андерсон.)

Распространение. Нынешний вид обитает в лесах высоких гор, которые покрывают западный регион княжества Мупин на северо-западе Китая, до Коконора и Кансу Кинсу.

Привычки. Это замечательное животное, открытием которого мы обязаны исследованиям известного путешественника аббата Давида, обитает большими стаями на самых высоких деревьях леса, в регионах, где снег лежит большую часть года. Питается плодами, листьями и молодыми побегами лесных деревьев, а также дикого бамбука. Некоторые систематики выделили его в отдельный род, *Rhinopithecus*, наряду с личиночным носом с острова Борнео, из-за необычной формы носа и длины руки, превышающей переднюю; но по своим структурным признакам он очень тесно связан с *Semnopithecus*.

НОСАТЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ. РОД *NASALIS*.

Назалис, Джеффри., Энн. Музей, XIX., стр. 90 (1812).

Этот род содержит только один вид,

ОБЕЗЬЯНА С ХОБОТКОМ. *NASALIS LARVATUS*.


(Фото XXXVII.)

Cercopithecus larvatus, Wurm., Verhand. Летучая мышь. Genootsch., iii., p. 145 (1781); Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 12 (1820).

Симия насика, F. Cuv., Диктант Sc. Nat., xx., стр. 32 (1821).

Назалис ларватус, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 90 (1812); Урок, Спец. по маммологии, стр. 66 (1840); Жак. et Puch., Voy. au Pole Sud, Зоол. iii., стр. 17, стр. 2, 2A, 2B (1853); Ленц, Зоол. Гарт., xxxii., стр. 216; Грей, Кошка. Обезьяны брит. Муз., стр. 13 (1870); Шланг, Мама. Борнео, стр. 8 (1893).

ТАБЛИЧКА XXXVII.



ОБЕЗЬЯНА С ХОБОТКОМ.

Cercopithecus nasicus, Десмар. et Virey, Nouv. Диктант. d'Hist. Nat., xv., стр. 574 (1817); Вагнер в "Шребе". Säugeth. Дополнение i., стр. 102, pl. x.B (1840).

Semnopithecus nasicus, Десмоул., Диктант. Класс. d'Hist. Nat., vii., стр. 570 (1825); Schinz, Syn. Мамм., i., стр. 43 (1844); Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение v., стр. 35 (1855).

Nasalis recurvus, Vigors et Horsf., Зоол. Журнал., iv., стр. 109 (1828-9; глава "Молодые люди"); Мартин, P. Z. S., 1837, стр. 71.

Semnopithecus larvatus, Фишер, Syn. Mamm., стр. 16 (1829); Мартин, Маммиф. А. Н., стр. 453, фиг. 279, 280-2 (1841).

Rhynchopithecus larvatus, Дальн., род. Зоол., стр. 93, т. iv. (1856).

Семнопитек (назалус) larvatus, Андерсон, Зоол. RES. Дополнение. Юнь-нань, стр. 42 (1878; с полной синонимией).

Персонажи. Морда коричнево-коричневая; уши черноватые, так же как ладони и подошвы; верхняя поверхность головы, шеи, спины и боков желтовато-коричневые, с заметными красновато-коричневыми и белыми отметинами; круп, хвост и конечности желтовато-серые; хвосты старых особей совершенно белые; бока морды желтые, и полоса того же цвета на плечах. Нижняя поверхность желтовато-белая.

Волосы на голове, разделенные пробором посередине, по бокам лица, шеи и плеч, длинные; подбородок заросший бородой, а хвост с хохолком; уши маленькие; нос - наиболее заметная черта лица, оформленный в хоботок, способный расширяться, с большими ноздрями, открывающимися книзу, отделенными друг от друга перегородкой из тонкого хряща, доходящей до кончиков. У старых самцов кончик носа доходит довольно низко до нижней части подбородка; он грушевидной формы, с бороздками посередине, что придает ему вид двойного кончика; он самый широкий в середине свободной части. Хоботок полностью развивается только в пожилом возрасте у обоих полов, у молодых он намного короче и обращен вверх. Вигорс и Хорсфилд описали своего *N. recurvus* по экземпляру, который показался им совершенно взрослым. Лоб низкий, глаза широко расставлены, а шея короткая и сильно расширена из-за наличия очень большого гортанного мешка. Длина тела 29 с половиной дюймов; хвоста 26 дюймов.

Самка. — Похожа на самца, но меньше и имеет сероватые отметины на крестце; в то время как хоботок несколько менее развит.

Молодые. Лицо черноватое, а щеки морщинистые; затылок, спускающийся к плечам, и верхняя часть передней конечности темно-красновато-коричневого цвета. "В результате ряда изменений, в ходе которых красно-коричневый цвет верхней части тела сначала набирает силу, а серо-коричневый цвет бедер и верхней стороны хвоста меняется на желтовато-белый, достигается взрослый волосной покров". (Андерсон.)

Это необычное животное обладает всеми структурными признаками рода *Semnopithecus*; но нижняя граница носовых костей, образующих вход в носовую полость, проходит значительно ниже нижней границы глазниц. Лицевая часть черепа ненамного превышает мозговую оболочку.

У хоботообразной обезьяны имеется мешковатый желудок, уже описанный у лангуров.

Распространение. Хоботная обезьяна обитает на острове Борнео. мистер Хорнадей нашел ее на западном берегу реки Саравак, недалеко от моря и в двух милях ниже города. В некотором изобилии он встречается также на реке Батанг-Лупар. Мистер Хоуз говорит, что в основном он встречается вблизи устьев рек на юге Саравака.

Привычки. Хоботковая обезьяна, которую местные жители по-разному называют Бланда (или Белый человек) и "Расонг", - это древесное существо, живущее небольшими отрядами. "Как обычно, - пишет м-р Хорнадей, - они находились над водой, и, будучи быстрыми альпинистами и довольно пугливыми, их было трудно убить. Всего во время своих блужданий по лесам Борнео я видел около ста пятидесяти хоботных обезьян, и все без единого исключения находились над водой, будь то река, озеро или затопленный лес. Пока они находятся на виду, они являются очень заметными объектами, выбирая наиболее командные позиции на открытых верхушках деревьев.

Однажды я увидел тринадцать особей на одном дереве, лениво сидящих на ветвях, по своей привычке, греющихся на солнышке и наслаждающихся пейзажем. Это было самое прекрасное зрелище, которое я когда-либо видел, в котором участвовали обезьяны. Крик "Бланда" необычен и ни с чем не спутаешь. Написанный фонетически, это был бы "Гудок", а иногда и "Кек-гудок", протяжный и глубоко звучный, совсем как тембр басовой виолы.... Хоботковая обезьяна - крупное животное поразительной внешности как по форме, так и по окрасу. В целом, *Nasalis larvatus* для охотника-натуралиста является очень привлекательным объектом для преследования, и если бы его частично не затмевал orang, он был бы самым известным Четвероногим в Ост-Индии".

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ. СЕМЕЙСТВО SIMIIDAE.

В это семейство входят гиббоны, орангутанги, гориллы и шимпанзе, наиболее высокоорганизованные и наиболее близкие к человеку по строению из всех *антропоидей*. Этими группами термин "Обезьяна" многими авторами в основном ограничивался, остальные семейства Старого Света и всего Западного полушария были обозначены "Обезьянами" в качестве удобного метода номенклатуры. Внешнее сходство *Simiidae* с Человеком сделало различных представителей семейства объектами величайшего интереса не только для натуралиста, но и для каждого разумного человека; и, естественно, вызвало необходимость постоянного сопоставления характеров обоих.

Все они, по сути, являются древесными лазающими животными, однако, когда они спускаются на землю, они принимают полустоячее положение по собственной воле. Их передние конечности всегда настолько длиннее задних, что при ходьбе по ровной поверхности их пальцы достают до земли, не наклоняясь ниже их полустоячего положения. Их передние конечности различаются по длине у разных родов; так же как и большой палец; но большой палец у них всегда меньше по отношению к ступне, чем у человека, и, в отличие от него, противопоставлен другим пальцам. Поскольку они принадлежат к группе катаральных, их нос имеет узкую перегородку между ноздрями, которые направлены вниз. В целом, отсутствует внешний хвост, щечные мешки и (за исключением гиббонов) седалищные мозоли. Все они покрыты шерстью, некоторые более густо, чем другие, но ни у одной обезьяны на голове нет таких длинных густых прядей, как у человека.

Форма черепа у обезьян очень сильно различается. Однако она всегда длиннее, чем широкая. В лобной части она никогда не бывает такой округлой и приподнятой, как у Человека. Крыша глазниц выступает в переднюю часть полости мозга и значительно уменьшает ее вместимость. Предчелюстные кости (несущие резцы) относительно более отчетливы и намного крупнее, чем у человека, "швы, отделяющие их от верхнечелюстных костей, остаются видимыми после получения зубного ряда взрослого человека". (Майварм.)^[1] У *Simiidae* есть костный проход или канал, ведущий к уху. Задняя часть головы, которая у генонов плоская, у *Simiidae* выпуклая. Небо длинное и узкое, края челюстей почти параллельны. Нижняя челюсть всегда состоит из одной части, две половинки прочно окостенели посередине. Зубная формула человекообразных обезьян составляет I22, C11, P22, M33 (т.е. Всего 32 зуба); их внутренние верхние резцы крупнее, а нижние меньше внешней пары; клыки большие, и между ними и соседним резцом вверху имеется пустота (или диастема), а внизу - между ними и ближайшим предмоларным. Верхние предмолары имеют три корня, а нижние - два; у верхних коренных зубов четыре бугорка, их коронки относительно широкие; у нижних коренных зубов пять бугорков, но у заднего нет заднего когтя.

Отверстие для прохождения спинного мозга расположено ближе к задней части основания черепа и, таким образом, дальше от центра, чем у человека.

За исключением гиббонов, позвоночный столб в крестцовой области имеет признаки того изгиба — или вогнутости в спине между двумя выпуклостями шеи и поясницы, — который является одним из отличительных признаков человеческого скелета. Процессы сцепления позвоночных,

которые являются крупными у низших антропоидов, значительно редуцированы у человекообразных обезьян и становятся незаметными у Человека.

Грудная кость плоская, напоминает человеческую и у всех, за исключением орангутанга, состоит из двух костей. Плечевая кость часто короче передней. *Лучевая кость* и *локтевая кость* могут быть полностью повернуты. Суставная поверхность *трапеции*, кости запястья (*carpus*), к которой прикреплен большой палец, имеет округлую форму, подобную *энто-клиновидной* кости лодыжки (*tarsus*), форма, которая, как уже указывалось (Т. I., стр. 11), у лемуroidов соотносилась с противопоставленным большим пальцем, поэтому здесь она соотносится с настоящим противопоставленным большим пальцем. У обезьян и лемуroidов эта кость обычно не округлая, и у них нет противопоставленного большого пальца в строгом смысле этого слова, как у высших обезьян.

Бедренная кость (*бедренная кость*) короче, чем кость руки (*плечевая кость*); и ступня очень длинная; однако абсолютная длина *предплюсны* никогда не бывает такой большой, как у человека; это остальная часть стопы, которая намного длиннее относительно у человекообразных обезьян. *Клинописная кость*, или суставная кость лодыжки для большого пальца стопы, имеет субцилиндрическую поверхность, которая обеспечивает большой диапазон движений этому пальцу по направлению к плоскости стопы и от нее.

Мозг человекообразных обезьян по общей форме и строению очень напоминает человеческий; но полушария головного мозга отличаются тем, что они значительно удлинены и вдавлены, а объем черепа, который никогда не бывает меньше 55 кубических дюймов у любого нормального человека, у шимпанзе составляет 27 с половиной кубических дюймов; у гориллы 35 дюймов; у оранга 26 дюймов; а у гиббонов намного меньше. Поверхность головного мозга сильно извита, а его задние доли всегда полностью перекрывают мозжечок, за исключением сиаманга (*Hylobates syndactylus*).

Что касается извилин, то мозг человекообразных обезьян демонстрирует все стадии развития, от почти гладкого мозга мартышки до оранга и шимпанзе, которые лишь немногим уступают Человеку. И наиболее примечательно, что как только появляются все основные борозды [или бороздки], схема, по которой они расположены, идентична схеме соответствующей борозды Человека. Поверхность мозга обезьяны представляет собой своего рода карту скелета человека, и у человекообразных обезьян детали становятся все более и более заполненными, пока только по второстепенным признакам, таким как большая выемка передних долей, постоянное присутствие трещин, обычно отсутствующих у человека, и различное расположение и пропорции некоторых извилин, мозг шимпанзе или оранга можно структурно отличить от человеческого.... А разница между мозгом шимпанзе и Человека почти незначительна по сравнению с разницей между мозгом шимпанзе и лемуром". (Хаксли.)

У человекообразных обезьян нет щечных мешочков. Гортань имеет большие расширения неглубоких углублений — называемых желудочками — слизистой оболочки с каждой стороны ее внутренней поверхности, которые могут простираться вниз до подмышечных впадин и быть связаны с мощным голосом, которым обладает большинство видов. Желудок простой, как у человека, и не мешковатый, как у представителей последнего семейства (*Cercopithecidae*).

Матка и другие структуры, связанные с репродуктивной системой, напоминают таковые у человека. Продолжительность беременности, вероятно, различается у разных родов и неизвестна у многих видов. Период, в течение которого детеныши находятся на вскармливании матери, длится около шести месяцев. "Пропорции конечностей друг к другу и к телу заметно не меняются после рождения; но тело, конечности и челюсти увеличиваются в гораздо большей степени, чем мозговая оболочка". (Хаксли.) В отношении большинства видов по-прежнему требуются

наблюдения относительно возраста, в котором они достигают зрелости и способны к размножению.

The *Обезьяны*- самые умные представители животного царства — ведут дневной образ жизни и, по сути, ведут древесный образ жизни. Многие представители этого семейства при ходьбе имеют тенденцию наступать на внешний край стопы, поворачивая, таким образом, носок внутрь из-за свободного движения, которое возможно между различными костями лодыжки, тогда как в человеческой стопе эти кости более прочно связаны друг с другом. При лазании, как очевидно, наибольшим преимуществом обезьяны является сила поворота подошвы. Их пища в основном растительная; некоторые виды проявляют незначительные плотоядные наклонности.

"Из различных родов *обезьян* гиббоны наиболее далеки от Человека. Оранги ближе всего к нему по количеству ребер, форме полушарий головного мозга и некоторым другим признакам мозга и черепа; но по другим признакам, особенно по конечностям, они отличаются от него гораздо больше, чем горилла и шимпанзе. Из шимпанзе горилла больше похожа на человека по соотношению ноги к телу и ступни к руке; а также по размеру пятки, изгибу позвоночника и абсолютной вместимости черепа. Настоящие шимпанзе больше всего приближаются к Человеку по черепу, зубным рядам и пропорциональной длине рук". (*Хаксли.*)

The *Симииды* обитают только в регионах Эфиопии и Индии. Гориллы и шимпанзе обитают исключительно в тропических регионах Западной и Центральной Африки; гиббоны обитают во всех четырех провинциях Индийского региона; в то время как оранги ограничены двумя островами Индо-Малайского субрегиона.

ГИББОНЫ. РОД *HYLOBATES*.

Хилобаты, Иллигер, Продр. Система. Мама., стр. 67 (1811).

Группа древолазов, как означает термин *хилобаты*, включает в себя самых маленьких по размеру, с самым тонким телом, с самыми длинными конечностями и наиболее совершенными древесными видами из всех человекообразных обезьян. Все они покрыты густой шерстью, которая на руках и передних конечностях сходится (за исключением *H. agilis*) к локтю.

Голова у них маленькая и круглая, а лицо сжатое. За исключением орангов, у гиббонов самые длинные руки из всех обезьян, настолько длинные, что, когда они стоят прямо, кончики их пальцев могут касаться земли. По сравнению с позвоночным столбом, их руки от 19 до 11, в то время как ноги на треть длиннее его. Передняя часть намного длиннее самой руки; кисть длиннее ступни, а большой палец очень длинный пропорционально кисти. Колено свободно от боковой части тела, большой палец хорошо развит и составляет почти половину длины стопы. Ногти как на большом, так и на большом пальце плоские. Мозоли, отсутствующие у всех других родов, присутствуют у *хилобат*, но очень маленькие.

В черепе затылочный бугор выпуклый; глазницы очень большие и глубокие, а надглазничные выступы выступающие. Клыки намного крупнее остальных и одинаково велики у обоих полов. Обычно они являются последними из появляющихся постоянных зубов, но у гиббонов они обычно предшествуют последнему коренному зубу или развиваются вместе с ним.

Позвоночный столб почти прямой, лишь незначительно отличающийся от искривления позвоночника, наблюдаемого у человека; кроме того, в спинно-поясничной области на один

позвонок больше, чем в скелете человека. Сочленяющаяся головка плечевой кости (*плечевой кости*) теряет направление, которое она имела у обезьян, и смотрит вверх и вперед, как у Человека. Запястье (*carpus*) состоит из девяти костей, как и у нижних *Anthropoidea*. Скелет руки составляет более половины длины позвоночника, а ступня чуть меньше половины его длины. У гиббонов на две пары ребер больше, чем у человека. Концы седалищных костей сильно вывернуты для поддержки мозолей.

Что касается головного мозга, то этот род отличается значительной редукцией затылочных долей головного мозга.

Язык очень похож на человеческий, но он снабжен подъязычным отростком, подобным тому, который уже описан у некоторых лемуридов. У гиббонов (за исключением сиаманга) нет гортанных мешочков. Желудок очень напоминает человеческий орган.

Гиббоны очень деликатны и редко живут долго в неволе, даже в своей собственной стране. В целом они очень умны, очень нежны и становятся самыми ласковыми и обаятельными животными, если с ними по-доброму обращаться. Однако иногда они бывают вспыльчивыми и сварливыми, особенно во взрослом возрасте.

Их искусство лазания и прыжков вошло почти в поговорку. Было бы невозможно превзойти их как акробатов. При ходьбе по земле они принимают прямую позу, прижимая подошвы ног к земле, широко отделяя большой и указательный пальцы от соседних.

"Они ходят прямо, переваливающейся или нетвердой походкой, но быстрым шагом; равновесие тела необходимо поддерживать либо за счет касания земли костяшками пальцев сначала с одной стороны, затем с другой, либо за счет поднятия руки для удержания ее в равновесии. Как и у шимпанзе, вся узкая, длинная подошва ступни сразу ставится на землю и сразу же поднимается, без какой-либо эластичности шага". (*Мартин.*)

Их голос очень мощный и слышен на большом расстоянии, особенно когда они воют хором. Вау-Вау и сиаманг, один без гортанного мешка, а другой с ним, одинаково сильны в этом отношении.

При рождении самка производит на свет всего одного детеныша, о котором она проявляет величайшую заботу. Она носит его повсюду, прижимая к нижней стороне своего тела, в течение многих месяцев. Говорят, что она даже время от времени берет его с собой на берег и с большой заботой, несмотря на его крики и сопротивление, моет ему морду.

Гиббоны часто встречаются в обширных горных лесах; но сиаманг (*H. syndactylus*) может быть встречен на довольно низких уровнях и недалеко от побережья. Их пища состоит из фруктов, листьев и насекомых, птичьих яиц, а также, по-видимому, птиц и ящериц, и особенно пауков. Они пьют, либо поднося рот ко рту, либо макая воду в ладони и таким образом поднося ее ко рту.

Гиббоны обитают в двух субрегионах Индийского региона. За исключением сиаманга, все так называемые виды *хилобатных* настолько тесно связаны друг с другом и различаются признаками столь незначительной важности, что они, по-видимому, едва ли заслуживают особого различения. (*Томас.*)

I. ПРОВОРНЫЙ ГИББОН. *HYLOBATES AGILIS*.

Pithecus lar (nec L.), Джеффр., Ann. Mus., xix., стр. 88 (1812).

Hylobates agilis, F. Cuv., Хист. Нац. des Mammif., Sept. 1821, pls. v., vi.; Müller, Tijdschr. Nat. Gesch., ii., p. 326 (1835); Martin, Mammif. Anim., стр. 416 (1841); Фрай, P. Z. S., 1846, стр. 11; Грей, Кот.

Обезьяны Брит. Муз., стр. 12 (1870); Шл., Муз. Пайбас, vii., стр. 17 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Дополнение. Юнь-нань, стр. 9 (1878; с полной синонимией).

Pithecus agilis, Desmar., Mamm., стр. 532 (1820).

Simia lar (nec L.), Raffl., Tr. Linn. Soc., xiii., стр. 242 (1822).

Hylobates lar (nec L.), F. Cuv., Hist. Nat., Mamm., стр. 7, 8 (1824); Blyth, J. A. S. Beng., xlv., ex. №, стр. 2 (1875).

Hylobates variegatus, Temm., Моногр. Mamm., i., стр. xiii. (1827); Вагнер в "Шребе". Säugeth. Дополнение v., стр. 16 (1855); Х. О. Форбс, Нац. Палочка. Восток. Арх., стр. 156 (1885).

Hylobates rafflesii, Is. Geoffr., Кат. Méth. Приматы, стр. 8 (1851); Грей, Кат. Обезьяны британского происхождения, стр. 11 (1870).

Hylobates pileatus, Грей, P. Z. S., 1861, стр. 136, стр. xxi.; id., Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 10 (1871); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 6 (1878).

Персонажи. Морда черная; окрас полностью черный, но становится коричневым на спине и боках, и с белой надбровной полосой, а иногда и с пепельно-серыми щеками.

Это типичная форма этого вида на Средней Суматре, где автор настоящего доклада имел возможность изучить его вживую. Его было с трудом отличить от *H. syndactylus*, за исключением его размера и наличия белой надбровной полосы.

Были описаны другие экземпляры (но ни один из них не был встречен автором к югу от реки Моэси), у которых затылок, спина непосредственно за плечами, бока, бедра и внешние поверхности передних и задних конечностей были бледно-желтого цвета. Плечи, грудь и живот, а также внутренняя сторона конечностей и ступней темно-коричневого цвета; брови и усы бледно-серые. (Андерсон.)

Разновидность, описанная как *H. pileatus*, отличается черным пятном, похожим на шапочку, на макушке головы; грудь, горло и брюхо черные; затылок, верхняя поверхность тела, конечности и область вокруг черной шапочки серые. Эта разновидность также может быть полностью белой, за исключением того, что корональная шапочка и грудь черные, а спина коричневая; или же преобладающий окрас может быть коричневым, бока лица и нижняя поверхность черными, а усы белыми. Указательный и средний пальцы иногда перепончатые между собой.

Все волосы на руке и предплечье сходятся к запястью.

Распространение.—Этот вид обитает на Суматре и в Сиаме. В бывшей стране малайцы называют его "Онгка", которые, обладая острой наблюдательностью, которой они обладают в отношении всех природных объектов, различают две разновидности: белую или желтую разновидность — "Онгка путих", и черную разновидность — "Онгка итам" (*Х. раффлеси*). Шляпчатая разновидность (*H. pileatus*) с ее разнообразно окрашенными формами обитает в Сиаме.

Привычки.—Повадки "онгка" очень похожи на повадки вау-вау, или сиаманга (*H. syndactylus*). Туземцы, однако, утверждают, что он гораздо более молчалив и редко воет, как любой из этих двух других видов. Их также обычно можно увидеть довольно небольшими группами и часто только парами.

"Почти невозможно, - пишет мистер Мартин о экземпляре, который раньше обитал в Зоологическом саду, - передать словами представление о быстроте и грациозности ее движений: их действительно можно назвать воздушными, поскольку кажется, что в своем развитии она просто касается ветвей, среди которых демонстрирует свою эволюцию. В этих трюках ее кисти являются единственными органами передвижения; ее тело висит, как будто подвешенное на веревке, поддерживаемое одной рукой (например, правой), она энергичным движением подбрасывает себя к отдаленной ветке, за которую хватается левой рукой. Но ее хватка менее чем мгновенна; получен импульс для следующего броска; ветка, на которую затем нацелена, снова берется правой рукой и мгновенно выбрасывается, и так далее, в чередующейся последовательности. Таким образом, промежутки в двенадцать и восемнадцать футов расчищаются с величайшей легкостью и непрерывно в течение нескольких часов подряд, без малейшего проявления усталости; и очевидно, что если бы можно было предоставить больше пространства, то расстояния, значительно превышающие восемнадцать футов, были бы расчищены так же легко.... Иногда, ухватившись за ветку во время своего продвижения, она бросается, держась только за одну руку, полностью вокруг нее, совершая оборот с такой быстротой, что почти обманывает глаз, и продолжает свое продвижение с неизменной скоростью. Удивительно наблюдать, как внезапно этот гиббон может остановиться, когда импульс, придаваемый быстротой и дальностью его размашистых прыжков, казалось бы, требует постепенного ослабления его движений. В самый разгар ее полета кто-то хватается за ветку, тело приподнимается, и видно, как она, словно по волшебству, спокойно сидит на ней, обхватив ее ногами.... В ее квартире выпустили живую птицу; она проследила за ее полетом, сделала длинный взмах к дальней ветке, поймала птицу одной рукой на лету, а другой рукой дотянулась до ветки; ее прицеливание, как в птицу, так и в ветку, было столь успешным, как если бы только один объект привлек ее внимание. Можно добавить, что она мгновенно откусила птице голову, оборвала ее перья, а затем бросила ее вниз, не пытаясь съесть".

II. ГИББОН BAY-BAY. *HYLOBATES LEUCISCUS*.

А. Яванская раса (*H. leuciscus*).

Simia leucisca, Schreber, Säugeth. i., pl. iii. b. (1775).

Питек левцискус, Джеффри., Энн. Музей, XIX., стр. 89 (1812).

Hylobates leuciscus, Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 6 (1820); Десмар. Mamm., стр. 51 (1820); Martin, Mammif. An., стр. 416 (1841); Is. Geoffr., Кат. Méth. Primates, p. 7 (1851); Wagner, Schreb., Säugeth. Дополнение v., стр. 16 (1855); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 15 (1870); Х. О. Форбс, Нац. Палочка. Восток. Арх., стр. 70 (1875); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 19 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 7 (1878; с полной синонимией).

Б. Борнейская раса (*H. concolor*).

Симия конколор, Харлан, Журн. Акад. физ.-мат. наук, v., стр. 229, стр. ii. (1827).

Hylobates harlani, Реже, Бычок. des Sc. Nat., xiii., p. 111 (1827).

Hylobates concolor, Schl., Очерки физики. Serp., p. 237 (1837); S. Müller, Verhand. Геш., стр. 48 (1841); Блит, Дж. А. С. Бенг., x., стр. 838 (1841); Мартин, Маммиф. An., стр. 417 (1841); Фрай, P. Z. S., 1846, стр. 15; Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение v., стр. 17 (1855; частично); Schleg., Mus. Пайбас, vii., стр. 20 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 11 (1878).

Хиллобаты мюллери, Мартин, Маммиф. Anim., стр. 444 (1841); Is. Geoffr., Кат. Méth. Приматы, стр. 7 (1851); Шлегель, Mus. Пайбас, vii., стр. 21 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 8 (1878; с полной синонимией); Шланг, Млекопитающие Борнео, стр. 6 (1893).

Hylobates funereus, Is. Geoffr., C. R., xxxi., стр. 874 (декабрь 1850 г.); Вагнер в Schreb. Säugeth. Дополнение v., стр. 18 (1855).

? *Hylobates fuscus*, Уинслоу Льюис, Бост. Журн. Н. История., i., пт. i., стр. 32, pls. i., ii. (1834).

Персонажи.—Мех густой, длинный и мохнатый. Общий окрас пепельно-серый, более светлый на пояснице и крупе; шерсть вокруг лица серая; надбровная полоса белая; макушка головы черная; пальцы рук и ног черные.

Было обнаружено, что у этого вида иногда бывает по дополнительному пальцу на каждой руке.

Распространение.—Индонезийский субрегион. Ява, Борнео и архипелаг Сулу между Борнео и Филиппинами.

Привычки.Вау-Вау - малайское название этого гиббона — является одним из первых четвероногих, о присутствии которого узнает путешественник на Яве, когда он достигает ее горных лесных районов. Вечером, незадолго до захода солнца, и особенно ранним утром, начинающимся перед восходом солнца и окончательно прекращающимся, когда солнце находится над верхушками деревьев, он будет удивлен внезапной вспышкой того, что кажется то громкими жалобными воплями толпы женщин, то дружным воем банды наказываемых детей. Первое знакомство автора с этим очаровательным родом обезьян состоялось среди холмов Косала на Западной Яве, и оно навсегда останется у него как одно из многих самых приятных воспоминаний о долгом пребывании в тропиках. Их "у-у-ут—ут-ут—ут-ут-ут—ут-ут-ут—ут-ут-ут-ут-ут", всегда более заунывное пасмурным тяжелым утром, предшествующим дождю, - именно такой крик можно было бы ожидать от печального выражения лица, столь характерного для вида *хилобатов*. У Вау-Вау удивительно человеческий взгляд; и писатель с большим огорчением стал свидетелем смерти единственного существа, которого он когда-либо застрелил. Упав на спину с глухим стуком о землю, он приподнялся на локтях, провел длинными заостренными пальцами по ране, бросил горестный взгляд на них и на своего убийцу, затем откинулся во весь рост — мертвый - "саперти оранг" (совсем как человек), как заметил его спутник-малаец. Он недолго держал в неволе особь, которую принес ему туземец, и она стала одним из самых нежных и обаятельных существ на свете; но когда зов ее свободных товарищей достигал ее тюремного дома, она самым трогательным образом прикладывала ухо к прутьям клетки и слушала с такой напряженной и жадной тоской, что удерживать ее в покое дольше было невозможно. Соответственно, он был выпущен на свободу на окраине своего старого лесного дома. Как ни странно, его бывшие товарищи, возможно, почувствовав исходящий от него запах неволи, казалось, не доверяли его респектабельности и отказывались позволять ему общаться с ними. Среди вольных лесов мы можем надеяться, что эта зараза вскоре была утрачена и что она вновь обрела все свое первозданное счастье.

По общему поведению он никоим образом не отличается от других уже описанных видов *хилобатов*.

В отношении борнейских образцов этого вида доктор Андерсон делает следующие наблюдения: "Этот вид варьируется от серого до темного желтовато-коричневого цвета, но серый оттенок при определенном освещении кажется чисто пепельным, а при других - коричневатого оттенка. У некоторых видов грудь и брюшко часто желтые, и это, по-видимому, характерно для особей, встречающихся на западном побережье Борнео, в то время как у тех, кто обитает в

меридиональных частях острова, руки и передняя часть тела черно-коричневые или красновато-коричневые. У обеих этих разновидностей имеется желтовато-белая надбровная полоса. Последний из них приводит к разновидностям *хилобатов* с соседних островов Сулу, к северо-востоку от Борнео, у которых верхняя часть тела либо серая, либо коричневатая, при этом нижняя часть спины и поясицы немного более прозрачны, чем остальные." Внешняя поверхность конечностей, задняя часть головы, надбровные дуги и боковые части лица более или менее чисто пепельно-серые. "Образцы этого гиббона, полученные мной, - пишет м-р Чарльз Хоуз, хорошо известный своими исследованиями в области Борнео, - в Клодтауне, а теперь находящиеся в Британском музее, показывают, что окраска различных частей тела не должна иметь большого значения, поскольку я получил одиннадцать экземпляров, пять из которых принадлежали к той же стае, а остальные шесть - из той же местности, различаясь по окраске настолько, насколько это для них возможно; у некоторых были желтоватые спины и черная грудь, у других черные спины с желтоватой грудью, а некоторые были почти черными повсюду; в то время как другие были почти черными. другие были почти полностью серебристо-серыми. Следовательно, я прихожу к выводу, что *H. muelleri* и *H. leuciscus* не могут быть разделены. Специфический булькающий звук, который они издают, похож. Я думаю, очень маловероятно, что два разных вида могут так постоянно встречаться вместе, как это происходит в Сараваке.

"Туземцы называют серебристо-серую разновидность "Эмплиан" или "Ва-Ва", а темную - "Эмплиан аранг" (уголь) из-за ее цвета".

III. БЕЛОЩЕКИЙ ГИББОН. *HYLOBATES LEUCOGENYS*.

Hylobates leucogenys, Огилби, Р. Z. S., 1840, стр. 20; Блит, Дж. А. С. Бенг., х., стр. 838 (1841); Мартин, Маммиф. Anim., стр. 445, *cum fig.* (1841); Is. Geoffr., C. R., xv., стр. 717 (1842); id., Arch. Mus., ii., стр. 535 (1843); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 11 (1870); Сл., Муз. Пайбас, vii., стр. 13 (1876); Scl., P. Z. S., 1877, стр. 679, pl. lxx.; Андерсон, Зоол. RES. Краткое изложение. Юнь-нань, стр. 6 (1878; с синонимией).

Персонажи. Мех блестящий, густой и пушистый; шерсть на верхней и задней части головы стоит вертикально; лицо, подбородок и уши черные; по всему лицу от уровня глаз и сходясь ниже подбородка, проходит белая кайма, образующая усы и бороду; в других местах окрас полностью черный. Длина тела - 26 дюймов.

Распространение. —Сиам.

Привычки. —Этот редкий вид очень активен и нежен в неволе. Он будет висеть подвешенным, как Мартин заметил на первом экземпляре, привезенном в Европу, на ветке в течение всего дня, за исключением тех случаев, когда спит или отдыхает.

Типовой экземпляр был описан в 1840 году — его кожа хранится в Британском музее; но только в 1877 году — по прошествии тридцати семи лет - в нашу страну был привезен второй экземпляр. Он был отправлен в Зоологический сад мистером У. Х. Ньюманом, консулом Х.Б.М. в Банкоке.

IV. БЕЛОРУКИЙ ГИББОН. *HYLOBATES LAR*.

Homo lar, линн., Богомол. Завод., Приложение., стр. 521 (1771).

Симия лонгимана, Вагнер в "Шребе". Säugeth. i., стр. 66, pl. iii., рис. 1, 2 (1775); Erxl., Syst. Reg. An., стр. 9 (1777).

Симия лар, Бодд., Эленч. An., стр. 55 (1785); Фишер, Syn. Мамм., стр. 12 (1829; частично).

Pithecus lar, лат., Хист. Нац. Буфф., xxxvi., стр. 276 (1809).

Pithecus varius, Latr., *op. et loc. cit.*

Pithecus variegatus, Джеффри., *Ann. Mus.*, xix., стр. 88 (1812).

Hylobates lar, Illig., *Abhandl. Akad. Берл.*, стр. 88 (1815); Мартин, *Маммиф. Аним.*, стр. 416, 433 (1841); Блит, Дж. А. С. Бенг., x., стр. 838 (1841); Грей, *Кат. Обезьяны Брит. Муз.*, стр. 10 (1870); *Scl.*, P. Z. S., 1870, стр. 86, pl. v.; Шлегель, *Муз. Пайбас*, vii., стр. 15 (1876); Андерс., *Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань*, стр. 5 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, *Фавн. Брит. Ind.*, *Mamm.*, стр. 7 (1891).

Hylobates variegatus, Kuhl, *Beitr. Зоол.*, стр. 5 (1820; янг); Desmar., *Mamm.*, стр. 51 (1820); Is. Geoffr., *Зоол. Bélanger. Voy.*, p. 27 (1834).

Обезьяний альбиман, Виг. и др., *зоол. Журн.*, iv., стр. 107 (1828).

Simia variegatus, Фишер, *Syn. Mamm.*, стр. 11 (1829).

Hylobates albimanus, Is. Geoffr., *Зоол. Bélanger. Voy.*, p. 29 (1834).

Hylobates entelloides, Is. Geoffr., *C. R.*, xv., стр. 717 (1842).

Hylobates leuciscus, Кантор, *Энн. и маг. N. H.*, xvii., стр. 338 (1846).

Характеры.—Мужчина.—Везде темно-черный, за исключением лица, которое красновато-коричневое, с густыми волосами вокруг него светло-серого или белого цвета, а руки и ступни бледно-желтые или белые; надбровные дуги, бакенбарды и борода белые. Шерсть на передних конечностях почти стоячая, лишь с очень небольшим наклоном вперед. Вид подвержен большим вариациям и может быть всех оттенков, от темно-черного до полностью беловато-желтого (*H. entelloides*).

Голова круглая; глаза большие; щеки плоские и вдавленные; нос слегка выступающий, его кончик изборозжден морщинами, а ноздри маленькие и сходящиеся; верхняя губа разделена посередине вертикальной бороздой. У очень молодых особей верхушка уха заметно заострена.

Череп с более крупными орбитальными гребнями, более короткой мордой и меньшими зубами, чем у *H. hooleck*; второй и третий пальцы иногда соединены перепонкой.

Женский.—В целом похож на самца, но чаще полностью бледно-желтый, с более светлыми руками и ногами.

Распространение.—Аракан, Нижнее Пегу, Тенассерим и Малайский полуостров.

Привычки.—Белорукий гиббон обитает в нагорных лесах высотой до 3500 футов над уровнем моря; живет стаями численностью от десяти до двадцати пяти человек. Его повадки очень похожи на повадки других гиббонов, хотя Тикелл заметил, что они были менее легкими и активными, чем хулоки, и у них был другой голос. Говорят, что он пьет, как это делает сиаманг, опуская руки в воду, а не прикладывает к ней рот, как хулок. "Передвижение среди деревьев настолько полностью зависит от его рук, - замечает доктор Блэнфорд, - что он все переносит на своих ногах. Тикелл, от которого я узнал эти подробности, говорит, что он видел, как группа *H. lar* сбежала таким образом со своей добычей из сада Каренов в лесу". "Детеныши рождаются в начале холодного сезона, - продолжает доктор Блэнфорд, - и каждый прикрепляется к телу своей матери примерно на семь месяцев, после чего начинает постепенно меняться сам".

Против ХУЛОКА. ХИЛОБАТЕС ХУЛОК.

Simia lar, Филолог. Пер., lix., стр. 607 (1769)

Сумия хулок, Харлан, Tr. Am. Phil. Soc., iv. (н. э.), стр. 52, стр. 2 (1834)

Hylobates coromandus, Огилби, P. Z. S., 1837, с. 689; Мартин, Маммиф. Anim., стр. 415 (1841); Is. Geoffr., Arch. Mus., ii. P. 535 (1843); Blyth, J. As. Soc. Бенг., xiii., стр. 464 (1844)

Hylobates hoolock, Водяной, Кот. Мама. Муз. Зоол. Соч., стр. 3 (1838); Мартин, Маммиф. Anim., стр. 416 (1841); Is. Geoffr., Arch. Mus., ii., стр. 535 (1843); id., Cat. Méth. Приматы, стр. 9 (1851); Склейте, P. Z. S., 1860, стр. 86, pl. v.; Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 11 (1870); Шл., Муз. Пайбас, vii., стр. 14 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоритель. Юн-нань, стр. 1 (1878; с полной синонимией); Блэнфорд, Фавн. Брит. Ind., Mamm., стр. 5 (1891).

Hylobates hulok, Wagner, in Schreb., Säugeth. Дополнение, v., стр. 20 (1855 г.)

Hylobates niger, Харлан; Огилби, P. Z. S., 1840, стр. 21.

Персонажи.— Черный по всему телу, за исключением лобной полосы, непрерывной или прерывистой, над глазами. У этого вида много вариаций, больше у самок, чем у самцов, причем черный цвет у многих особей имеет коричневатый оттенок.

Молодые самцы.— Часто коричневато-черные, как и многие самки.

Женский. С черным, как правило, коричневатого оттенка, но часто бледным или серовато-желтым; иногда верхняя часть тела бледно-желтая, нижняя часть и боковые части головы коричневые, а область вокруг обнаженных частей лица белая. (Андерсон.)

Распространение.— Нижние хребты Бутана — его самый дальний западный хребет — (Пембертон); горные хребты Верхнего Ассама (Блит), Силхет, Читтагонг, Аракан.

Привычки. "Впервые я встретился с этим видом в Верхней Бирме, - рассказывает доктор Андерсон, - проходя по великолепному ущелью Иравади ниже Бхамо, где река окружена высокими холмами, покрытыми густым лесом, примерно на пятнадцати милях своего течения. Было раннее утро, и воздух звенел от громких криков этого Гиббона; большие отряды отвечали друг другу с противоположных берегов, и холмы вторили этому звуку. Хулок также обычен на холмах Кахьен, на восточной границе Юньнана; и там тоже мое внимание было привлечено к ним на рассвете, когда они поднялись из своего укрытого места для сна в глубоких и теплых долинах на высоту около 4000 футов. Мы, находясь на среднем расстоянии, сначала уловили слабый гул голосов, но с каждой минутой он становился все более и более отчетливым, пока, наконец, весь отряд не промчался мимо в буре звуков, выкрикивая "Кто!" вжик! и еще через несколько минут их крик был слышен далеко на склоне горы. Учítывая, что они передвигаются почти исключительно по деревьям, скорость, с которой они совершают свое восхождение, просто поразительна.

"В связи с этим древесным процессом развития мы обнаруживаем, что *H. hoolock* получает питание из листьев, насекомых, яиц и птиц - основных элементов лесной жизни". Он также поедает листья *фикуса религиозного*, водного вьюнка (*Ipomæa reptans*) и ярко-красные цветы *Canna indica*. Он "питает заметное пристрастие, - продолжает тот же натуралист, - к паукам и их паутине, которые запутываются в его длинных тонких пальцах, а прямокрылые насекомые рассматриваются им с особой благосклонностью, и над ними он издает свойственный ему крик удовлетворения. Яйца также являются к нему *бонне буш*. Впервые в садах Калькутты я обратил внимание на то обстоятельство, что маленькие живые птицы были пожраны им с методичностью

и рвением, которые не оставили у меня сомнений в том, что этот вид в его естественном состоянии должен быть бичом для пернатого племени".

Хулок, как правило, живет большими стаями, держась в основном горных лесов. Иногда, однако, можно обнаружить старого самца, живущего в одиночестве.

Они передвигаются главным образом с помощью своих длинных рук, с помощью которых они перепрыгивают на огромные расстояния с ветки на ветку и с дерева на дерево. Они спускаются по склонам холмов с удивительной скоростью, их спуск осуществляется за счет хватания бамбука или ветвей, которые прогибаются под их весом, и позволяют им падать до тех пор, пока они не смогут ухватиться за концы другого бамбука или ветвей ниже по склону и совершить еще один мощный взмах вниз. Они также взбираются с большой скоростью, перепрыгивая с дерева на дерево. (Блэнфорд.)

При ходьбе по земле хулок опирается только на задние лапы, при этом подошва плотно прилегает к земле, а большой палец широко отделен от остальных пальцев. "Они ходят прямо, - пишет доктор Борроу, - и, когда их ставят на пол или на открытое поле, очень изящно балансируют, поднимая руки над головой и слегка сгибая их в запястьях и локтях, а затем бегут довольно быстро, раскачиваясь из стороны в сторону; и если их заставить двигаться быстрее, они опускают руки на землю и продвигаются вперед, скорее прыгая, чем бегая, все еще сохраняя тело, однако, почти выпрямленным".

VI. ХАЙНАНЬСКИЙ ГИББОН. *HYLOBATES HAINANUS*.

? *Hylobates pileatus*, Суинхо, P. Z. S., 1870, стр. 224 (nec Gray).

Hylobates hainanus, Томас, Анна и Маг. Физ. История. (6), ix., стр. 145 (1892).

Персонажи.—Очень близкий родственник *H. hooleck*, но отличается полным отсутствием белой надбровной полосы, животное полностью черное как смоль.

Распространение.—Остров Хайнань.

Привычки.—Ни один европейский натуралист не видел этот вид живым в его естественных местах обитания. Консул Суинхо приложил немало усилий, чтобы раздобыть живой экземпляр на острове Хайнань, но безуспешно. "Я никогда не переставал, - говорит он, - интересоваться им. Все знали, что такое животное действительно существует, и многие видели его; но все они говорили об огромной трудности сохранить ему жизнь. В Тайпинце (Центральный Хайнань) чудесные истории, которые рассказывали о нем, показали, что юэней там видели нечасто. Судья этого округа заверил меня, с серьезным лицом, что оно обладает способностью втягивать в свое тело длинные кости рук, и что когда оно втягивает одну руку, то выталкивает другую на такую необычайную длину, что, по его мнению, две кости соединяются в теле; и он сказал, что кости руки использовались как палочки для еды". Мистер Суинхо, однако, опубликовал в 1870 году несколько любопытных выдержек из китайского справочника района Куншань на Хайнане, которые, без сомнения, относятся к этому интересному животному, из которого он сделал палочки для еды. Шкурки этих животных с тех пор, как он написал, были получены в Британском музее, в то время как молодая особь прожила несколько месяцев в 1893 году в лондонском Зоологическом саду, где они привлекли большое внимание. В справочнике сказано следующее: "Юэнь: самец черный, самка белая; похож на макаку, но крупнее, с двумя чрезвычайно длинными передними лапами. Взбирается на вершины деревьев и с большой ловкостью бегаёт между ними взад и вперед. Если он падает на землю, то остается там, как бревно. Ему доставляет удовольствие лазать по деревьям, так как он не может ходить по земле. Те, кто желает выращивать его в неволе, должны держать его среди деревьев; ибо испарения земли вызывают у него диарею,

приводящую к смерти; однако верное средство от этого можно найти в настое, приготовленном из сиропа жареного Фу-цзе (семена *Abrus precatorius*, Linn.) ". Затем справочник продолжает: "На Хайнана также есть Скала Юэнь. Он маленький, величиной с кулак. Если дать ему выпить воды, он увеличивается в размерах. Это также называется Черным Юэнем, и сейчас его так же трудно достать".

Те, кто имел возможность наблюдать за экземпляром, обитавшим в Зоологическом саду, наверняка помнят его необычайные акробатические трюки, которые выполнялись с поразительной точностью и уверенностью либо одной, либо обеими руками, и при этом с самым беспечным видом. Он представлял разительный контраст с орангутаном, который занимал соседнюю клетку. Эта более крепкая обезьяна демонстрировала в своих лапах столь же совершенную способность к лазанию; но двигалась она с величайшей осмотрительностью, неторопливостью и хладнокровием, не проявляя никакой неустойчивой активности, столь характерной для гиббонов; она двигала только одной парой своих конечностей за раз и только тогда, когда другая пара прочно держалась за какую-нибудь опору.

VII. СИАМАНГСКИЙ ГИББОН. *HYLOBATES SYNDACTYLUS*.

Pithecus syndactylus, Desmar., Mamm., стр. 531 (1820).

Hylobates syndactylus, F. Cuv., Хист. Нац. Маммиф., стр. iv. (1821); Ис. Джеффр., кат. Méth. Приматы, стр. 9 (1851); Беннетт, Странствия в Уэльсе, ii., стр. 151 (1834); Мартин, Маммиф. An., стр. 420 (1841); Flower, нац. Hist. Rev., 1863, p. 279 (cum fig.); Giebel, Z. Ges. Nat., p. 186 (1866); Schl., Mus. Пайбас, vii., стр. 22 (1876); Андерсон, Зоол. RES. Ускоренный. Юнь-нань, стр. 10 (1878; с полной синонимией).

Simia syndactylus, Raffl., Tr. Linn. Soc., xiii., стр. 241 (1822).

Siamanga syndactyla, Серая Кошка. Monkeys Brit. Mus., стр. 9 (1870), id., указ. соч., стр. 9 (1870); Х. О. Форбс, нац. Жезл. Восток. Арх., стр. 129 (1885).

(Фото XXXVIII.)

Персонажи. — Это самый крупный вид рода, достигающий более трех футов; он толще, чем *H. hooleck*, и его шерсть полностью глянцево-черная, нигде без седых волосков; лицо черное, как и растянутая кожа большого голого участка на горле, который покрывает большой гортанный мешок. Второй и средний пальцы соединены перемычкой до последнего сустава. Шерсть на руках и предплечьях сходится к локтю.

Череп большинства видов этого рода очень похожи друг на друга; череп сиаманга отличается более крупными размерами и более развитыми надглазничными гребнями, в то время как затылочная область более усечена, а у симфиза нижней челюсти имеется настоящий, хотя и небольшой подбородок.

ТАБЛИЧКА XXXVIII.



СИАМСКИЙ ГИББОН.

Лобные доли головного мозга широкие и сильно уплощенные, а не полные и округлые, как у оранга. Обонятельные луковицы выступают вперед, немного за пределы лобных долей головного мозга; затылочные доли сильно редуцированы, в то время как большой мозжечок отчетливо выступает назад из—под головного мозга - признаки, по которым этот очень высокоорганизованный представитель рода демонстрирует регрессивное развитие, отличаясь таким образом от всех других человекообразных обезьян, у которых головной мозг полностью покрывает как обонятельные доли спереди, так и мозжечок сзади.

Большой гортанный мешок, сообщающийся двумя отверстиями с гортанью и образованный расширением щитовидно-подъязычной мембраны, отличает этого гиббона от всех других.

Распространение. — Сиаманг ограничен островом Суматра. Это было зафиксировано на Малакке и Тенассериме; но существуют некоторые сомнения относительно точного определения упомянутых особей, поскольку на Суматре еще не было получено ни одного действительно аутентичного экземпляра.

Привычки. Сиаманг стаден, часто обитает в больших лесных массивах на высоте от 200 до 300 футов над уровнем моря до 3000 или 4000 футов.

Я познакомился с этим видом на Южной Суматре, и во время моего пребывания на этом острове у меня были различные возможности наблюдать за многими из них в их домах. Не было ничего необычного в том, чтобы внезапно наткнуться на их колонию как в лесу, так и среди высоких изолированных останцев, когда они были покрыты плодами. Тогда насытившихся членов компании часто можно было увидеть подвешенными за одну руку к голой ветке, причем между ними и землей было около восьмидесяти футов свободного пространства, заставляя лес оглашаться их громкими лающими завываниями, издаваемыми, по-видимому, из чистой любви к поднятию шума. Однажды молодняк, которого нашли цепляющимся за свою застреленную мать, был доставлен живым. Он был только оглушен пулей по голове, и кости у него не были сломаны. За очень короткое время он стал самым восхитительным компаньоном. Следующие наблюдения по этому поводу взяты из дневника писателя: "Выражение его лица очень умное и часто очень человеческое; но в неволе он обычно принимает печальный и удрученный вид, который совершенно исчезает в его возбужденном настроении. С какой элегантною и нежностью он берет своими тонкими заостренными пальцами все, что ему предлагают! За исключением их волосатости, его руки и, по крайней мере, в молодости, его голова кажутся мне более человеческими, чем у любой другой обезьяны. Однако он редко противопоставляет большой палец другим пальцам, но обычно сжимает предмет всей рукой, без этого пальца. Он никогда не прикоснется губами к сосуду для питья, но неизменно подносит воду ко рту, обмакивая ее в полураскрытую ладонь, а затем неловко слизывает капли с костяшек пальцев. Обычно он сидит, скрестив руки на груди и заложив пальцы за голову. Нежная и ласкающая манера, с которой он обхватывает меня за шею своими длинными руками, кладет голову мне на грудь и смотрит на мое лицо своими темно-кариими глазами, издавая удовлетворенный мурлыкающий звук, очень привлекательна. Хотя он часто раздувает свой гортанный мешок, он редко издает нечто большее, чем звук, похожий на зевоту, или сдавленный лай; но это расширение, по-видимому, не имеет отношения к его хорошему или плохому характеру, хотя, когда он очень нетерпелив и стремителен к чему-либо, издается низкий лающий звук. Каждый вечер он совершает со мной экскурсию по деревенской площади, положив одну из своих рук мне на плечо. Это очень любопытное и нелепое зрелище - видеть его в прямой позе на своих несколько кривоватых ногах, спешащим в самой неистовой спешке, как будто для того, чтобы его голова не опережала ноги, с его длинной свободной рукой, которая самым странным образом закручивается над головой, чтобы сохранить равновесие, и время от времени касается земли кончиками пальцев или костяшками пальцев. То, что они могут перепрыгивать приписываемые им огромные расстояния с дерева на дерево, несомненно, является точным наблюдением; но иногда они кажутся охваченными ужасом и неспособными совершить эти подвиги, чтобы спасти свою жизнь. Во время вырубki леса недалеко от этой деревни небольшая колония сиамангов оказалась изолированной на дереве, отделенном от соседней поросли примерно тридцатью футами. Они носились вверх и вниз по кроне дерева, выявляя в самом низменном ужасе при каждом ударе топора; однако они не отваживались перепрыгнуть разделявшее их пространство, и даже когда дерево падало, они не пытались спастись, спрыгнув на землю, но погибли при его падении.

"Во время прорезывания зубов мой компаньон сильно пострадал — как это часто случается с человеческими младенцами — как локально, так и конституционально, на что указывают

фурункулы и воспаленные кончики пальцев. После вскрытия и припарки последнего и удаления нескольких мешающих зубов бедное создание, казалось, почувствовало большое облегчение, и я был рад наблюдать, как оно выздоравливает, не испытывая ко мне никакого отвращения к боли, которую я ему причинил, скорее наоборот ". Позже появится следующая выдержка: —

"Во время моего похода к побережью мой Сиаманг сопровождал меня, с самым серьезным видом занимая место на одном из свертков, которые везли сзади, рядом со мной. Здесь он прятал голову, на потеху всем, кого мы встречали, под китайским зонтиком, который я купил для него, чтобы защитить от полуденного солнца, и к которому после каждой остановки он самым знающим образом протягивал руки, громко крича, если носильщики осмеливались двинуться дальше, прежде чем он удобно устроится. К моему глубокому сожалению, несчастный случай положил конец самому очаровательному существованию, прежде чем я смог отправить его в Лондон".

ОРАНГУТАНГИ. РОД SIMIA.

Симия, Linn., Syst. Nat., i., стр. 34 (1766); Erxl., Syst. Règne An., стр. 6 (1777; часть).

Питек, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 87 (1812); Хаксли, Анат. Позвонок. Ан., стр. 403.

Понго, Джеффри., Энн. Музей, XIX., стр. 89 (1812).

Этот род содержит один вид, хорошо известный как

ОРАНГУТАНГ. ОБЕЗЬЯНА САТИРУС.


Симия сатирус, Linn., Syst. Nat., i., стр. 34 (1766); Куль, Бейтр. Зоол., стр. 4 (1820); Schreb., Säugeth., i., стр. 54, стр. 2, 2 В. (1775); Фишер, Syn. Мамм., стр. 9 (1829); Оуэн, Tr. Z. S., i., стр. 344, стр. 49, 53-56 (1835); Уоллес, малайский архип., i., стр. 62 (1869); Грей, Кат. Обезьяны Брит. Муз., стр. 8 (1870); Шлегель, Муз. Пайбас, vii., стр. 9 (1876).

Симия агривас, Схриб. Säugeth, i., pl. 2, ii. В и ii. С (1775).

Pongo wurmbii, Geoffr., Ann. Mus., xix., p. 89 (1812); Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 21 (1820).

Pario wurmbii, Latr. Сингес, i., стр. 196.

ТАБЛИЧКА XXXIX.



ОРАНГУТАНГ.

Pithec sатурус, Блюменб., Аббилд., Натурх. Гег., рис. хii. (1810); Джеффр., Анн. Музей, хix., стр. 88 (1812); Латр., в буфф. История. Нац., хххv., стр. 166, стр. 3; хххvi., стр. 276; Кюв. и Джеффр., История. Нац., Мамм., ливр. хlii.; Десмар., Мама., стр. 50 (1820); Мартин, Маммиф. Аним., стр. 388 (1841); Оуэн, Т. З. С., iv., стр. 82, стр. 29 (1862).

Simia wurmbii, Kuhl, Beitr. Зоол., стр. 21 (1820); Фишер, Син. Мамм., стр. 32 (1829); Оуэн, Тр. З. С., ii., стр. 165, стр. 30-32 (1841); Брук, П. З. С., 1841, стр. 55 (Миас Паппан).

Pithecus wurmbii, Оуэн, Тр. Z. S., iv., стр. 95, pl. хххiii. (1862).

Понго абелии, Кларк, Азия. Отв., xvi., 489 (1826); id., Edinb. Филолог. Журнал., стр. 375 (1827).

Simia abelii, Фишер, Syn. Mamm., стр. 10 (1829; Суматра).

Симиа морио, Оуэн, P. Z. S., 1836, стр. 92; id., Tr. Z. S., ii., стр. 168, стр. 33, 34 (1838); Брук, P. Z. S., 1841, стр. 55 (Миас Кассар); Уоллес, малайский архип., i., стр. 84 (1869); Склейте, P. Z. S., 1891, стр. 301; Беддарт, Tr. Z. S., xiii., стр. 20 (1893; Суматра и Борнео).

Путек морио, Мартин, Маммиф. Ан., стр. 395 (1841).

Гигантская обезьяна, Пирсон, J. A. S. Beng., x. (2), стр. 660 (1841).

Pithecus bicolor, Is. Geoffr., Arch. Mus., Париж, ii., стр. 526 (1841; Суматра).

Pithecus owenii, Блит, J. A. S. Beng., xxii., стр. 375 (1853).

Pithecus curtus, Блит, указ. соч., xxiv., стр. 525 (1855).

(Фото XXXIX.)

Персонажи. Оранги крупные и тяжелого телосложения, с головой, посаженной на очень толстой шее, длинной и направленной вперед шерстью, а брюшко круглое и выпуклое. Обнаженное лицо исполнено меланхолии. На каждой стороне лица у взрослого мужчины, но не у женщины, есть большие, мягкие, гладкие опухолевидные и гибкие разрастания, которые придают лицу поразительную ширину. Лоб обнаженный, пурпурного цвета; середина лица, поперек носа, сажисто-коричневая. Губы широкие, чрезвычайно подвижные, цвета кожи — обычно желтовато-коричневого; во время еды и питья животное далеко выдвигает их. Нижняя челюсть сразу отступает от губ, и поэтому подбородка, столь характерного для человека, нет. Уши больше похожи на человеческие, маленькие и плоские. Руки очень длинные, в выпрямленном положении достигают лодыжек, их размах в два раза превышает рост животного. Рука равна по длине передней части; кисти длинные и узкие. Пальцы соединены перепонкой; большой палец короткий и часто без концевой сустава. Тыльная сторона кисти лишь слегка опушена. Волосы на руке направлены вниз, а на предплечье — вверх, так что сходятся в локте. Ноги очень короткие и изогнутые в лодыжках; длинная и узкая ступня, которая соединена косо с ногой, длиннее кисти и (за исключением гориллы) длиннее, чем у любой другой обезьяны. Большой палец очень короткий и часто лишен ногтя.

Форма черепа очень разнообразна; макушка высокая и заостренная, лоб круглый и приподнятый, а затылочная область выпуклая. Нет двух совершенно одинаковых особей. "Наклон профиля, выступ морды вместе с размером черепа создают различия столь же явные, как и те, которые существуют между наиболее ярко выраженными формами кавказского и африканского черепа у человеческого вида. Глазницы различаются по ширине и высоте; черепной гребень либо одинарный, либо двойной, либо сильно, либо слабо развит, независимо от возраста, иногда более сильно развит у менее состарившихся животных". (Уоллес.) Надорбитальные гребни заметны, но не являются особенно заметными. Однако контур головы более человечесен по форме в молодости, чем в возрасте, когда лоб большой и выпуклый. Клыки очень крупные и напоминают бивни у самцов, но меньше у самок. Верхние коренные зубы имеют на своих коронках сложную морщинистость; у них четыре выступа и косой гребень, как у человека, от переднего внутреннего до заднего внешнего выступа; нижние коренные зубы пятизубчатые. Постоянные клыки иногда появляются до того, как встанет на место последний постоянный моляр.

Бедренная кость (*бедренная кость*) не имеет круглой связки, соединяющей суставную головку с впадиной в тазу, что, хотя и обеспечивает большую гибкость и свободу задним конечностям при

лазании, придает им гораздо меньшую твердость при ходьбе по земле. Пропорциональное отношение длины стопы к конечности у этого рода больше, чем у любого другого из *Anthropoidea*. Лодыжка (*предплюсна*) очень короткая, а кости (*фаланги* пальцев ног) образуют самую длинную часть стопы. Большой палец особенно короткий и расходящийся, его концевая кость часто отсутствует, в то время как кости пальцев длинные и изогнутые. Из-за формы определенных костей предплюсны и их взаимной подвижности стопа расположена наклонно к ноге за счет действия одной из ее мышц (*большеберцовой мышцы против*), так что подошва при ходьбе вытягивается внутрь. Таким образом, внешний край стопы с верхней стороной четвертого и пятого пальцев при движении вперед упирается в землю, в то время как растопыренный большой палец поддерживает большую часть веса животного. Запястье (*carpus*) содержит всего девять костей, поскольку обладает *центральной костью*, которой так не хватает у Человека и шимпанзе.

Грудная кость у орангутанга состоит из окостенений, расположенных попарно, а не состоит только из двух костей, как у других представителей семейства.

Между шей и сложной и прочной крестцовой костью расположено шестнадцать позвонков и двенадцать пар ребер, как у Человека. Позвоночный столб имеет небольшие, но отчетливые признаки искривления, столь характерного для Человека, и почти так же вогнут вперед в спинно-поясничной области, как и у ребенка.

У орангутанга нет язычка, как у Человека и у шимпанзе. Он обладает огромными воздушными мешочками — расширениями боковых полостей (желудочков) гортани, встречающимися у Человека, — которые простираются над горлом, верхней частью грудной клетки и доходят до подмышечных впадин; они могут даже соединяться по средней линии. На большом и указательном пальцах его большого пальца отсутствуют длинные мышцы-сгибатели, которые присутствуют у человека и шимпанзе.

"Из всех человекообразных обезьян мозг оранга больше всего похож на человеческий; действительно, можно сказать, что он похож на человеческий во всех отношениях, за исключением того, что он намного ниже по размеру и весу и что головной мозг более симметрично извит и менее сложен вторичными и третичными извилинами". (*Майварт.*) Полушария головного мозга выше по отношению к их длине, чем у любого другого *антропоморфа*, но они удлинены и вдавлены по сравнению с Человеком. (*Хаксли.*)

Цвет шерсти у оранга кирпичный или желтовато-красный по всей длине, но у старых самцов она иногда темнее на конечностях. Наибольшая длина (от двенадцати до шестнадцати дюймов) и наиболее грубый характер она имеет на руках, бедрах и плечах; лицо, уши и горло голые, а кожа красноватого или желтовато-коричневого цвета; но на подбородке есть жидкая борода. Тыльная сторона кисти и пальцы также густо опушены; на руках волосы растут к локтю, как и на предплечье, оба сходятся в точке у локтя.

В период между детством и средним возрастом цвет кожи меняется от темно-желтоватого у молодых особей до черновато-коричневого или черного у взрослых (последний цвет в значительной степени преобладает). Очень часто лицо и шея почти или совсем черные, ладони светло-коричневые, а грудь и брюшко мулато-желтые. (*Хорнадей.*)

По размеру орангутанги также сильно различаются; самцы крупнее самок. Самый крупный самец, застреленный Уоллесом, достигал 4 футов 2 дюймов. Хорнадей, однако, выстрелил несколько раз, превышая 4 фута 4 дюйма, его самый высокий рост составлял 4 фута 6 дюймов, а один самец был 3 фута 10½ дюйма; в то время как его самая крупная самка имела размер 4 фута, а самая

маленькая взрослая самка - 3 фута 6 дюймов. Ширина лица у самцов варьируется от 11½ до 13½ дюймов, а у самок от 5½ до 6 дюймов. Детеныш при рождении крупный по сравнению с размерами самки. Самец часто весит от 120 до 160 фунтов.

Распространение.—Орангутанг ограничен островами Борнео и Суматра в Восточно-Индийском архипелаге. На Суматре он встречается гораздо реже, чем на Борнео, и встречается в низменностях восточного побережья, в резиденции Палембанг и султанате Джамби. Насколько я мог установить, туземцы южной части Палембанга и лампонгов ничего не знали об этом животном, кроме названия. На Борнео он населяет низкие, покрытые лесом болота между побережьем и внутренними горами, с севера острова, вокруг западного, южного и восточного побережий, вплоть до реки Махаккам, если не вокруг всего побережья, как это наиболее вероятно. В засушливый сезон они удаляются в глубину леса. В сезон сбора фруктов они подходят ближе к побережью, а в разгар дождей часто появляются на берегах рек.

Привычки.Орангутан, "лесной человек" малайцев и "миас" аборигенов Борнео, живет в одиночку на покрытых листвой верхушках деревьев в лесах, за исключением сезона спаривания. Самку обычно сопровождает одно из ее потомства, иногда два, одно всегда младенец, а другое более или менее взрослая, но незрелая особь предыдущего рождения; ибо ее детеныши, из которых у нее при рождении остается только один, не меняют форму раньше, чем им исполнится два года. В каком возрасте они достигают зрелости, неизвестно, но, вероятно, не раньше двенадцати-пятнадцати лет. Младенец цепляется ручками за мать, когда она взбирается, хватаясь за волосы у нее подмышками, в то время как его ножки обхватывают ее бока выше бедра. Как уже отмечалось, оранги не обладают такой поразительной ловкостью, как гиббоны. Они медлительны и обдуманны в своих движениях; "удивительно неуклюжи и неотесанны", по словам сэра Джеймса Брука; но их длинные и чрезвычайно мощные руки и крюкообразные пальцы, которые смыкаются с поразительной жесткостью захвата, а также подвижные ноги и ступни, похожие на кисти, позволяют им с большой точностью поднимать и раскачивать свое тело с ветки на ветку и с дерева на дерево. "Я часто видел, - говорит Хорнадей, - как они раскачиваются под большими конечностями, как гимнаст раскачивается на натянутом канате, достигая шести футов за раз. Переходя от одного дерева к другому, оранг протягивает руку и собирает в своей хватке несколько небольших веточек, которые, как он уверен, выдержат его вес, а затем перебирается через них сам ". На земле все это совсем по-другому. Он ходит очень плохо и неуверенно; он использует свои руки как костыли, опираясь на них пальцами, как уже описано, и раскачивается на них вперед. По словам сэра Джеймса Брука, на земле оранг не передвигается так быстро, чтобы человек не мог легко угнаться за ним в чистом лесу. "Очень длинные руки, которые, когда он бежит, лишь слегка согнуты, заметно приподнимают тело оранга, так что он принимает позу очень старого человека, согнутого возрастом и пробирающегося с помощью палки". (Хаксли.) Однако оранг редко спускается на землю по собственной воле.

М—р Мартин дает следующий отчет о экземпляре, который жил в Зоологическом саду в Лондоне много лет назад: "Его позы были настолько разнообразными, насколько можно себе представить, его действия были медленными и обдуманными; за исключением, правда, одного или двух случаев, когда он хотел последовать за своим хозяином, который открывал дверцу его клетки; даже тогда он не перепрыгивал с ветки на ветку, как обезьяна, но, вытянув руки и хватаясь за ветки в пределах досягаемости, он продвигался вперед и так спустился на пол, по которому неуклюже и шатко ковылял. . Нельзя было упустить из виду одну вещь, касающуюся как рук, так и ног этого оранга, а именно то, что способ их прикрепления к ветвям во время древесной эволюции животного был крюкообразным; и, судя по силе приводящих мышц большого пальца и мышц-сгибателей пальцев, цепким и долговечным, а не напряженным и фиксированным. Это наблюдение особенно применимо к ступням; на них короткий большой палец, хотя и способен

сам по себе к твердому и плотному прижатию, делает его скорее точкой опоры, которой длинные пальцы противостоят своим нагрузкам, чем, складываясь на них, дополнением к ним в акте хватания; и, следовательно, хотя лапа оранга превосходно приспособлена для передвижений животного среди деревьев в лесу и имеет вид хватки, необходимый для свободы и безопасности, лапа оранга, возможно, менее энергична в хватке, чем лапа полудеревянного животного. Шимпанзе, у которого большой палец задней ноги пропорционально длиннее, а ступня шире, чем у оранга".

Оранг пьет, опуская пальцы в воду, как это делает сиаманг, и высасывая воду с костяшек пальцев или капая ее в свою выпяченную, похожую на корыто нижнюю губу.

Грубую *хижину*, которую, как утверждается, они строят на деревьях, правильнее было бы назвать сиденьем или гнездом, поскольку у нее нет крыши или какого-либо покрытия. Легкость, с которой они строят это гнездо, любопытна, и у меня была возможность наблюдать, как раненая самка сплетает ветви вместе и усаживается в течение минуты ". (*Сэр Джеймс Брук.*) "Оранг обычно выбирает, - пишет м-р Хорнадей, - небольшое деревце, фактически молодое деревце, и строит свое гнездо на его вершине, даже если оно тревожно раскачивается под его весом. Он всегда строит свое гнездо низко, часто в пределах двадцати пяти футов от земли и редко выше сорока футов. Иногда он достигает полных четырех футов в диаметре, но обычно не более трех, и довольно плоский наверху. Ветви просто сложены крест-накрест. Я никогда не мог утверждать с уверенностью, но, по моему мнению, орангутанг, построив гнездо, спит в нем несколько ночей подряд, если только его не заставят покинуть окрестности ". В этом гнезде он спит ночью или лежит, распластавшись на спине, днем, цепляясь руками и ногами за ближайшие ветки. Пища орангутангов— время приема пищи которых приходится на середину дня, состоит из листьев и орехов, особенно из дуриана, рамбутана и мангостина.

Орангутанг очень застенчив и неуверен в себе. Пойманный взрослым, он становится диким и свирепым; в молодом возрасте он легко поддается дрессировке; но никогда не живет в неволе, чтобы достичь зрелости. Когда на него нападают враги-люди и он жестоко гонит их, и ему приходится сталкиваться с ними вплотную, он может быть грозным и опасным противником, и, как известно, наносит нападавшим смертельные ранения. Он редко, неспровоцированно нападает на человека. "В одном случае, - как записал доктор А. Р. Уоллес, - самка Миаса на дереве дуриана в течение по крайней мере десяти минут поддерживала непрерывный дождь из ветвей и тяжелых плодов с колючками, размером до 32 фунтов, что наиболее эффективно удерживало нас подальше от дерева, на котором она находилась. Было видно, как она срывала их и швыряла на землю со всеми признаками ярости, время от времени издавая громкое, натужное ворчание и, очевидно, намереваясь причинить вред ". Они дерутся и защищаются руками и, кажется, хватают и кусают друг друга за пальцы. Многие особи, отстреленные в лесах Борнео, потеряли один или несколько пальцев на руках или ногах; на лице (особенно на губах) и телах имеются шрамы от зубов их противников.

"При ранении он забирается на самую высокую достижимую точку дерева и издает странный крик, состоящий сначала из высоких нот, которые наконец переходят в низкий рев, мало чем отличающийся от рева пантеры. Издавая высокие ноты, оранг вытягивает губы в форме воронки; но при произнесении низких нот он держит рот широко открытым, и в то же время большой горловой мешок, или гортанный мешок, растягивается ". (*Хаксли.*)

Название, данное даяками более крупному виду, - "Миас паппан". Однако существует меньшая разновидность, которую они называют "Миас Кассу", о которой доктор Уоллес дал превосходный и подробный отчет. У этих *Mias Kassu* нет опухолевидных разрастаний по бокам головы; срединный гребень отсутствует на черепе, поскольку мышечные гребни остаются на некотором

расстоянии друг от друга; зубы очень крупные, особенно клыки и средние верхние резцы. Самки, которые меньше самцов, также не имеют припухлостей на щеках и выступающих гребней, как у самцов, и имеют меньшие клыки. Этот сорт, названный *Simia morio* сэром Р. Оуэном, имеет близкое сходство с тем, что встречается на Суматре. Оуэн и Уоллес считали его отдельным видом, но вариации, как признает сам последний натуралист, настолько велики как раз по тем признакам, которые, как считалось, отделяют "Миас Кассу" от "Миас Паппан", что весьма вероятно, что оба принадлежат к одному и тому же виду, но разного возраста. Мистер Беддард обнаружил, что обезьяна, выставленная в Зоологическом саду в качестве взрослого экземпляра *S. morio*, на самом деле была незрелой.

ГОРИЛЛЫ. РОД GORILLA.

Троглодиты, Джеффри., Энн. Музей, XIX., стр. 87 (1812).

Горилла, Is. Geoffr., C. R., xxxiv., стр. 84, примечание (1852).

Этот род, как и предыдущий, содержит всего один вид,

ГОРИЛЛА. ГОРИЛЛА ГОРИЛЛА.

Горилла-троглодит, Вайман, Бост. Журнал. Нац. История. (2), v., стр. 419, стр. 1-4 (1847); Winwood-Reade, P. Z. S., 1863, стр. 171; Owen, Tr. Z. S., ii., стр. 381; v., стр. 1, 243, стр. i.-xiii. и xliii.-xlix; Scl., P. Z. S., 1877, стр. 303; Каннингем, Мем. Рой. Ирландский закон, стр. 1 (1886).

Горилла джина, Is. Geoffr., Arch. Mus., viii., стр. 2-4 (1852).

Troglodytes savagei, Оуэн, P. Z. S., 1848, стр. 29.

Gorilla savagei, Is. Geoffr., Rev. et. Mag. de Zool., стр. 104 (1853); Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 7 (1870).

Горилла питекус, Blainv., Osteogr., pls. 2, et 5 бис (ошибка *P. gesilla*).

ТАБЛИЧКА XL.



ГОРИЛЛА.

Сатирус адротес, Мейер, арх. ф. Натург., стр. 182 (1856).

Обезьяний горилла, Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 8 (1876).

Горилла майема, Аликс и Був. С. R., lxxxv., стр. 58 (1878).

(Табличка XL.)

Персонажи. Лицо этой массивной и самой тяжеловесной из всех обезьян голое и черное, очень широкое и удлинненное. Большая голова имеет волосяной покров вдоль центрального гребня, а

нижняя челюсть очень широкая и далеко отведена назад. Нос длинный и высокий, широкий и плоский на конце, а также с продольными бороздками. Морда широкая, рот широкий; верхняя губа короткая, а нижняя подвижная и выпяченная. Глаза большие; уши голые и черные, с заостренным задним верхним углом и нижним краем, образованным рудиментарной свисающей долькой.

Область черепа сравнительно невелика. Надорбитальные выступы, в которых расположены брови, образуют, судя по их выступанию, заметную черту лица. Они нависают над глазами, из-за чего те кажутся сильно запавшими в череп. Шея короткая, грудь и плечи широкие, покрыты густой шерстью и свидетельствуют о большой силе.

Руки намного длиннее передних, а ступни, у которых нет ступней, превышают кисти по длине и намного шире, чем у других родов *Simiidae*. Пятка, которая у orangов маленькая, у гориллы сильно развита, благодаря чему она может легко стоять прямо. Противоположный большой палец большой и уплощенный, с широким ногтем; в то время как нижние суставы второго, третьего и четвертого пальцев, которые также короткие и толстые, соединены перепонкой. Руки, на которых шерсть сходится по обе стороны от сустава к локтю, настолько длинны, что, когда горилла стоит прямо, они доходят до середины ноги. Большой палец короткий и толстый, с широким ногтем на конце. Кисть широкая, с густой шерстью на тыльной стороне и морщинистая от запястья до пальцев. Мех гориллы состоит из длинной, густой, прямой или жестко изогнутой щетины, под которой находится более короткая курчавая шерсть, или подшерсток.

Череп взрослого самца имеет очень выступающие челюсти и огромные надглазничные выступы. Скулы широкие; височные мышцы сходятся вдоль верхней части черепа и имеют огромные костные гребни для прикрепления. То же самое относится и к мощным шейным мышцам на затылке. Истинную форму черепа скрывают эти большие выступы и то, насколько сильно выступает лицо. Внутренняя форма мозговой оболочки лучше, чем кажется снаружи. Орбиты имеют ту же форму, что и у человека.

Клыки чрезвычайно развиты. Верхние коренные зубы четырехзубые и имеют косой гребень, о котором уже часто упоминалось, от переднего внутреннего до заднего внешнего выступа, причем задний из трех намного крупнее двух других, что отличает его челюсть от челюстей человека и шимпанзе. Передние нижние коренные зубы имеют пять острых выступов, три с внешней стороны и два с внутренней, как у человека.

Нижняя челюсть не имеет настоящего подбородка, а ее симфиз очень длинный и сильно отличается от того, что видно в симфизе человека. Отверстие для прохождения спинного мозга расположено в задней трети основания черепа, а не почти в центре, как у человека.

Позвонков на шее, спине и пояснице столько же — семнадцать, — как и у Человека; но реберных частей тринадцать вместо двенадцати. Шейные позвонки имеют длинные шипы, которые увеличивают толщину шеи. Характерный для Человека изгиб в поясничной области позвоночного столба молодой гориллы более развит, чем у шимпанзе, и у обоих они развиты раньше, чем у Человека. (Симингтон.)

Запястье (*carpus*) содержит всего восемь костей, поскольку отсутствует центральная (*os centrale*) кость, по характеру сходная с человеческой и шимпанзе, но отличающаяся от orangутанга.

Объем мозга самой крупной гориллы редко превышает 34½ кубических дюйма, что составляет лишь половину объема человеческого черепа. Можно с уверенностью сказать, что мозг среднестатистического европейского ребенка в возрасте четырех лет в два раза больше, чем у

взрослой гориллы. Вес мозга здорового человека никогда не опускается ниже 31 унции; вес мозга самой крупной гориллы, вероятно, никогда не достигал 21. (Хаксли.)

В мозге гориллы мозжечок можно увидеть между глубокой продольной трещиной, которая разделяет две половины головного мозга. В этом он сходен с орангом и *Anthropopithecus calvus* — у последнего наблюдается еще большее расхождение долей головного мозга.

Молодой самец гориллы сильно отличается от взрослого; его центральный черепной гребень менее заметен, чем затылочный гребень для мышц шеи.

Самка намного меньше самца, но щеки относительно шире; гребни на черепе менее выражены, а клыки короче и менее мощные. Ее груди длинные и заостренные, а не шаровидные.

Рост взрослого самца гориллы превышает шесть футов, но самка редко превышает четыре фута шесть дюймов.

Общий окрас гориллы черный или черноватый; вся кожа лица блестящая, покрыта редкими волосками и темно-черная; макушка красновато-коричневая, иногда темно-коричневая, волосы у корней сероватые, посередине седые, и темно-коричневые на кончиках; по бокам лица волосы темно-коричневые или черные, у корней седые; на шее и плечах волосы у корней седые, к концу более светлые. Спина, область плечевой кости и бедер коричневатого цвета, шерсть бледно-серая у корней, черновато-коричневая выше и темно-серая на концах; передние конечности, кисти, лодыжки и ступни темно-коричневые или черные; сзади у одних волосяной покров белый, у других коричневато-желтый. Старые особи становятся серыми или поседевшими.

Распространение. — Западная Экваториальная Африка, между Камеруном и Конго. Этот регион представляет собой разнообразные холмы и долины; возвышенности покрыты лесом, а долины покрыты травой и низким кустарником с обилием плодоносящих деревьев.

Привычки. Это необычное животное, вокруг которого собрано так много мифов, заимствованных в основном из неточных и преувеличенных рассказов туземцев, еще более преувеличенных беспечными или наделенными воображением посетителями Западного побережья Африки, впервые было доведено до сведения науки доктором Томасом Сэвиджем, американским врачом-миссионером, в 1847 году. С того времени были получены многочисленные сохранившиеся экземпляры этого животного в отличном состоянии, так что его анатомия известна очень полно. В 1860 году первая живая особь достигла Европы и прожила несколько месяцев в зверинце Уомвелла. С тех пор в неволе были экземпляры как в английских, так и в континентальных зверинцах. То, что мы знаем о повадках горилл, в значительной степени основано на наблюдениях, сделанных за этими животными в неволе. Несмотря на многочисленные утверждения об обратном, очень немногие люди, компетентные дать разумный отчет об их привычках, когда-либо видели гориллу живой в ее естественном состоянии. Даже сейчас за наши лучшие отчеты мы в долгу перед доктором Сэвиджем, который получил большую часть своей информации от туземцев, чей язык и характер он понимал настолько хорошо, что смог извлечь из них, тщательно проанализировав их заявления, самую точную информацию, свободную от преувеличений и домыслов.

Гориллы живут небольшими компаниями, или, скорее, семьями, состоящими из их детенышей разного возраста, вместе с отцом и матерью. Как и оранг, горилла, как говорят, строит что-то вроде гнезда на платформе или укрытия для ночевки из палок или сучьев, уложенных крест-накрест на ветке крепкого дерева примерно в двадцати футах от земли. Говорят, что самец сидит на страже внизу, а самка и ее семья занимают платформу наверху. "Мои информанты, - говорит

Сэвидж, - все согласны с утверждением, что в группе замечен только один взрослый самец". Один достигает мастерства, убивая или изгоняя других самцов.

Профессор Хартманн пишет: "Гориллы бродят [только днем] по участкам леса, которые окружают их временные места ночлега, в поисках пищи. При ходьбе они опираются тыльной стороной сомкнутых пальцев на землю или, что реже, опираются на плоскую ладонь, в то время как плоские подошвы их стоп также соприкасаются с землей. Их походка шаркающая; движение тела, которое никогда не бывает вертикальным, как у Человека, а наклонено вперед, несколько перекачивается или раскачивается из стороны в сторону. Поскольку руки длиннее, чем у шимпанзе, он не так сильно сутулится при ходьбе; подобно этому животному, он продвигается вперед, вытягивая руки вперед, упираясь ладонями в землю, а затем совершает своим телом полупрыгающие, полушагающие движения между ними. Говорят, что в этом действии он не сгибает пальцы, чтобы опереться на костяшки, как шимпанзе, а вытягивает их, образуя точку опоры кисти. Когда он принимает позу при ходьбе, к которой, как говорят, он сильно склонен, он уравнивает свое огромное тело, поднимая руки вверх".

Горилла обладает способностью свободно двигать скальпом вперед и назад — как это во многих случаях может делать Человек, — а в ярости хмурить брови и поднимать волосы дыбом над центральным костным гребнем, "чтобы придать неопишимо свирепый вид". Он способен издавать "потрясающий вопль, который разносится далеко по лесу"; и при выстреле его крик подобен крику человека, оказавшегося во внезапном и остром бедствии. Горилла очень свирепа и никогда не убегает, в отличие от шимпанзе; он приближается, чтобы напасть на своих врагов, но, по мнению некоторых наблюдателей, только тогда, когда к нему пристают, он бросается вперед, пригибаясь, а затем поднимается на ноги, чтобы нанести удар. Ему также приписывают умение драться зубами, а также руками, кусая своего противника, как это делают оранги и шимпанзе. Он обладает большим интеллектом, хотя, возможно, и меньшим, чем шимпанзе.

Самки проявляют себя любящими матерями, храбро защищая своих детенышей ценой собственной жизни. "В недавнем случае, - пишет доктор Сэвидж, - мать, когда ее обнаружили, оставалась на дереве со своим потомством, пристально наблюдая за движениями охотника. Когда он прицелился, она сделала ему знак рукой, в точности как подобает человеческому существу, чтобы он прекратил и ушел. Когда рана не оказывалась мгновенно смертельной, они, как известно, останавливали поток крови, надавливая рукой на часть тела, а когда это не удавалось, прикладывали листья и траву".

Пища гориллы состоит из всевозможных лесных и культурных продуктов; но, по-видимому, больше всего она ценит верхушку плодоносящего стебля масличной пальмы (*Elaeis guineensis*), папайи (*Carica*) и бананов. Особенно примечательна ее ловкость в питании из цивилизованной посуды в неволе, поскольку доктор Фалькенштейн описывает гориллу, которая прожила у него значительный период. "Он брал каждую чашку или бокал с инстинктивной осторожностью, сжимал сосуд обеими руками и ставил его обратно так мягко и бережно, что я не могу припомнить, чтобы он разбил хоть один предмет.... Он пил всасыванием, наклоняясь над сосудом, даже не засовывая в него руки и не опрокидывая его, а в случае с сосудами поменьше подносил их ко рту.... Когда ему не терпелось что-нибудь получить, ни один ребенок не смог бы выразить свои желания в более настойчивой и ласковой манере". Когда ему в чем-либо отказывали, он прибегал к хитрости и с тревогой оглядывался, не наблюдают ли за ним, и "невозможно было не распознать продуманный план и тщательный расчет". Когда он сделал то, что ему было запрещено или от чего ему помешали, "все его поведение ясно давало понять, что он сознавал, что нарушает закон". Доктор Сэвидж говорит, что горилла очень грязна в своих привычках, но наблюдения доктора Фалькенштейна расходятся с этим утверждением. По этому поводу последний говорит, что "его чистоплотность была замечательной".

Горилла обычно принимает положение сидя на корточках, скрестив руки на груди. Когда он спит, он лежит, вытянувшись во всю длину, на спине или боку, подложив одну руку под голову.

Горилла очень деликатна и редко живет долго в неволе, даже на своей собственной земле.

ШИМПАНЗЕ. РОД АНТРОПОПИТЕКОВ.

Anthropopithecus, De Blainville, Leçons Orales (1839).

Троглодиты (пес V.), Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 87 (1812).

К этому роду относятся те обезьяны, которые стоят выше всех, после Человека, в животном царстве. Эта близость, однако, относится только к его внешнему облику и анатомическому строению.

По строению шимпанзе очень близки к горилле. Действительно, гориллу сначала отнесли к тому же роду, что и шимпанзе, который был известен науке гораздо раньше, чем его более крупный родственник, хотя превосходное описание гориллы под названием понго было привезено в эту страну Эндрю Баттеллом, английским пленником португальцев в Анголе, в начале семнадцатого века и опубликовано в 1613 году в "Паломничестве Перчаса", рассказе, в котором впервые определенно упоминается шимпанзе.

Тело крепко сложено, но короче и менее крепкое, чем у гориллы. Макушка вдавленная, а надорбитальные выступы, из которых поднимаются жесткие надбровные дуги, заметны, но не особенно. Веки сморщены, а по краям обрамлены ресницами. Нос, гребень которого короче, чем у гориллы, вдавлен посередине, более плоский на конце и, как у последнего названного вида, имеет продольные борозды, его ноздри направлены больше вниз и вперед. Губы чрезвычайно подвижны и выпячены, верхняя широкая, а нижняя отступает ото рта и не образует настоящего человеческого подбородка, хотя он более выпуклый, чем у оранга. Щеки более морщинистые, чем у этой обезьяны. Уши большие, выступают по бокам головы и часто имеют дольки. Они до странности похожи на уши Человека, и, как заметил мистер Дарвин, шимпанзе никогда не двигает и не приподнимает свои уши, так что в том, что касается этой функции, они столь же рудиментарны, как и у Человека. Плечи и грудь широкие и указывают на большую силу. Их нижние конечности пропорционально длиннее, чем у оранга. Стопа, которая анатомически ни в коем случае не является рукой, иногда короче последней, большой палец толстый, противопоставленный и похож на большой палец, остальные четыре пальца соединены вместе перепонкой, пятка несколько развита, и вся подошва стопы при ходьбе опирается на землю. Руки, плечевой сегмент которых примерно равен по длине переднему предплечью, длинные, но достигают лишь немного ниже колена — их размах примерно в полтора раза больше высоты тела. Кисти рук, удивительно человеческие по форме, широкие, сравнительно короткие и менее крючковатые, чем у оранга. Шерсть на руке и предплечье сходится к локтю, как у гориллы и оранга. Большой палец короткий по сравнению с таким же пальцем у Человека, и, как и на человеческой руке, средний палец самый длинный; внешние четыре пальца соединены перемычкой, доходящей до первого сустава. Ладонь руки может быть прижата плашмя к земле; но хотя шимпанзе могут стоять или бегать прямо на плоской подошве, они предпочитают продвигаться вперед, опираясь на костяшки пальцев руки. У них нет мозолей на седалищных костях, на которых они сидят.

Самки шимпанзе немного меньше самцов, но разница между ними намного меньше, чем между двумя полами гориллы. Нос и зубы менее выпуклые, а живот более округлой формы. Молодые самцы также демонстрируют меньше отличий от взрослых особей, чем гориллы, хотя и

отличаются по многим параметрам мягкой анатомии и остеологии. Нос удлинняется, а его кончик расширяется, в то время как с возрастом лицо становится более выпуклым. У молодых людей лобная кость низкая и плоская. Череп у шимпанзе удлинненный и небольшой по отношению к телу; лоб меньше, макушка более округлая, чем у гориллы, а затылок выпуклый.^[2] Центральный (сагиттальный) гребень, столь сильно развитый у гориллы и орангутанга, здесь отсутствует; надорбитальные гребни, которые тянутся по всему лицу, и затылочные выступы для мышц спины, хотя и большие, также менее выражены. Глазницы имеют круглый ободок и менее выпуклы, чем у гиббонов. Носовые кости лишь слегка изогнуты, а отверстия для ноздрей круглые и маленькие. Челюсти, которые у этого рода меньше, пропорционально черепу, чем у любого другого обезьяны, выступают далеко вперед, но симфиз нижней челюсти меньше, чем у гориллы, а две ее половины низкие и широкие. Кости черепа в значительной степени выдолблены в полости (пазухи) во лбу, носу и челюстях, которые сообщаются друг с другом. Плоскость *большого отверстия* (для прохождения спинного мозга) расположена наклонно к плоскости основания черепа.

Объем черепа составляет от двадцати шести до двадцати семи кубических дюймов, или примерно половину минимальной вместимости нормального человеческого черепа. Шиловидный отросток более или менее отчетливо виден у шимпанзе.

Клыки длинные и конические, но меньше, чем у гориллы; а диастема, или промежуток, между ними и соседними зубами меньше, чем у других человекообразных обезьян. Коренные зубы четырехзубые и имеют уже описанный косой выступ, простирающийся от переднего внутреннего выступа до заднего внешнего; а средний нижний коренной зуб имеет пять выступов, оба этих зубных признака похожи на таковые у человека. Передний нижний предмолар, однако, заострен и имеет длинный острый передний край, как у *Cercopithecidae*.

Позвоночный столб начинает демонстрировать S-образный изгиб, характерный для позвоночника человека; он также представляет человеческий характер в форме второго шейного позвонка, и в нем есть тринадцать пар ребер, как у Человека. Самые задние позвонки "производят впечатление рудиментарного хвоста". (*Hartmann.*)

Плечевая кость почти равна по длине предплечью; в запястье (*carpus*) всего восемь костей (центральная отсутствует), что соответствует их количеству у человека.

Все гребни и бороздки, видимые в человеческом мозге, присутствуют и в мозге шимпанзе, но "они проще, симметричнее и больше по сравнению с мозгом". (*Хаксли.*) Мозжечок, а также нервы, по отношению к головному мозгу больше, чем у Человека; и определенные структуры (*трапецевидные тела*), которые существуют в головном мозге низших млекопитающих, отсутствуют. Эти выступы, расположенные в той части мозга, которая известна как *продолговатый мозг*, на вершине спинного мозга, исчезают, как мы видели, у всех родов более высокого ранга, чем *Cebidae*, одно из низших семейств *Anthropoidea*. Мозг по своим извилинам и во многих других отношениях соответствует мозгу оранга. Особенно это касается *A. calvus*.

Язычок, отсутствующий в горле оранга, у шимпанзе, как и у Человека, подвешен. Также присутствуют большие воздушные мешки, а подъязычная кость вынута кзади, что наводит на мысль о строении такой же кости у *алуатты* (южноамериканские ревуны). Желудок очень похож на человеческий, так же как пищеварительные и репродуктивные органы. Круглая связка, прикрепляющая головку бедренной кости к тазовой впадине, присутствует и ограничивает гибкость задней конечности шимпанзе по сравнению с гибкостью оранга. Его присутствие, однако, хотя и действует несколько менее благоприятно в отношении способности этих животных к лазанию, чьи привычки в основном менее древесные, чем у орангов, благотворно помогает им

при ходьбе, обеспечивая им более прочную опору на земле. У шимпанзе всегда есть полулунная складка (*plica semilunaris*) во внутреннем углу глаза, соответствующая мигательной перепонке (или третьему веку) птиц. У некоторых лемуroidов она хорошо развита (*выше*, т. i, стр. 90), а у некоторых человеческих рас она большая.

Шимпанзе ограничены Западноафриканским субрегионом, как определено доктором Боудлером Шарпом. Он известен из Лоанго, вдоль берегов Верхнего Конго, и м-р Монтейру (P. Z. S., 1871, стр. 544) говорит, что он совершенно неизвестен к югу от Конго; он также встречается по всей стране Маниема в Центральной Африке, где Ливингстон описывает его под названием Соко; и на юг до 10 ° южной широты, до озера Моэро. Швайнфурт записал его в стране Ниа-ниам.

Шимпанзе обитают в лесных районах и питаются дикорастущими фруктами в лесу и продуктами возделывания в садах, не отказываясь, когда они могут это добыть, от животной пищи. Они живут отдельными семьями или в ограниченных сообществах небольших семей, смешанных вместе, но каждый самец живет со своей единственной самкой. Они более древесные, чем гориллы, но гораздо менее, чем оранги. Во многих районах кажется, что они живут на земле.

Они издают громкие крики, визг и завывания утром и вечером, а часто и ночью. "Поскольку они действительно совершенны в искусстве издавать эти неприятные звуки, которые могут быть слышны на большом расстоянии и воспроизводятся эхом, невозможно оценить количество тех, кто принимает участие в этом унылом шуме, но часто нам казалось, что мы слышим больше сотни". (*Pechuel-Lösche.*) Эти обезьяны также строят места для отдыха недалеко от земли, подобно орангам, из прутьев на ветке дерева или в расщелине, в которых самка и ее детеныши укрываются на ночь, а самец устраивается внизу на страже.

Они редко совершают неспровоцированное нападение на бродящих по лесу туземцев; напротив, это миролюбиво настроенные животные, радующиеся возможности убраться с пути опасности или возможных врагов. Тем не менее, при надавливании они образуют неплохого противника. Укусы - их основной способ защиты.

"Как видно из приведенного здесь, - говорит Сэвидж, - их нельзя назвать стадными, их редко можно встретить вместе более пяти-десяти человек. Из достоверных источников было известно, что они иногда собираются в больших количествах для игр. Мой информатор утверждает, что однажды он видел не менее пятидесяти таких занятых, улюлюкающих, визжащих и барабаниющих палками по старым бревнам, что в последнем случае с равной легкостью делается четырьмя конечностями.... В состоянии покоя обычно принимается сидячее положение. Иногда их можно увидеть стоящими или идущими, но при таком обнаружении они немедленно опускаются на четвереньки и убегают от присутствия наблюдателя. Такова их организация, что они не могут стоять прямо, а наклоняются вперед. Следовательно, они видны, когда стоишь, со сцепленными руками на затылке или поясничной области, что, по-видимому, необходимо для равновесия или легкости позы".

Большинство имеющихся у нас сведений о привычках шимпанзе относятся к поведению молодых особей, содержащихся в неволе. Еще многое предстоит выяснить относительно путей и образа жизни взрослых особей как шимпанзе, так и гориллы. Они оба очень хрупкие и в умеренном климате редко живут дольше нескольких месяцев; однако лысый шимпанзе (*A. calvus*) прожил пять лет в Зоологическом саду в Лондоне.

I. ОБЫКНОВЕННЫЙ ШИМПАНЗЕ. АНТРОПОПИТЕК ТРОГЛОДИТ.

Homo sylvestris (урангутанг), Тайсон и Каупер, Фил. Trans., xxi., p. 338 (1699); Tulpius, Observ. Anat., стр. 270, стр. 14 (1641).

Homo troglodytes, Linn., Sist. Nat., i., стр. 32 (1766; pt.).

Simia troglodytes, Gm., Syst. Nat., стр. 26 (1788); Blumenb., Handb., x., стр. 73 (1803); Owen, Tr. Z. S. I., стр. 344, pls. 48, 50-52, 55, 56 (1835); ii., стр. 169 (1841); Сл., Муз. Pays-Bas, vii., стр. 8 (1876).

Troglodytes niger, Джеффри., Ann. Mus., xix., стр. 87 (1812); Десмар., Маммолог., стр. 49 (1820); Урок, спец. М., стр. 37 (1840); вар. *Marungensis*, Owen, Tr. Z. S., v., стр. 3, pls. i.-ix.; стр. 279, pl. xlix. (1866); Ноалк, Зоол. Jahrb., ii., p. 291 (1887).

Pseudanthropos (Troglodytes) leucoprymnus, Реже., ил., произв. Сист. Мамм., pl. 12 (1811); Reichenb., Naturg. Affen., p. 191 (1862).

Pithecus leucopryma, Реже., ил. зоол., стр. 31 (1836; молодой).

Самурис лагарош, Мейен, Arch. f. Naturg., стр. 282 (1856).

Mimetes troglodytes, Серый, Кот. Обезьяны, брит. Муз., стр. 6 (1870).

Troglodytes vellerosus, Грей, P. Z. S., 1862, стр. 181; id., Кат. Обезьяны брит.-муз., доп., стр. 127.

Troglodytes schweinfurthi, Гигл., Studii Craniol. история шимпанзе iii., стр. 56 (1872).

Troglodytes aubryi, грат. et Alix, Nouv. Arch. Музей, ii., стр. 1, 9 (1866).

Троглодиты настоящего, Дюверной, Arch. Музей, viii., стр. 8 (1855).

Anthropopithecus troglodytes, Flower & Lydekker, Мамм., стр. 736, рис. 357 (1891).

Персонажи. Лицо, уши, кисти и ступни темно-красноватого телесного цвета или, реже, черновато-коричневого; в целом цвет шерсти полностью черный, за исключением верхней и нижней губ, где она белая и очень короткая, и в области ягодиц, где она окрашена в красновато-коричневый цвет.

Шерсть на теле прямая и шелковистая, с вкраплениями более грубых волос; на макушке головы они плавно расходятся в стороны, отклоняясь от срединной линии; вокруг лица они образуют густые бакенбарды, переходящие в небольшую бородку; они переходят на лоб, оставляя обнаженным только треугольное центральное пространство; на верхней и нижней губах короткие, щетинистые волосы; остальная часть лица голая и сильно морщинистая; на плечах, спине и бедрах волосы длиннее, чем где-либо еще; тыльная сторона кистей и ступней покрыта тонкими волосами, нижняя часть лица покрыта морщинами. обнаженные пальцы на руках и ногах. Края ушей часто загнуты внутрь на большую часть своей длины.

Кожа тела необычно светлая, но грязноватая, телесного цвета, иногда граничащая с коричневой. Коричневатые или черные пятна на многих частях тела, по-видимому, различаются у разных особей.

Выражение лица серьезное, но менее меланхоличное и озабоченное, чем у орангов.

Вес мозга у *A. troglodytes* варьируется от 6½ до 63/5 унций.

Эта знаменитая человекообразная обезьяна известна, по крайней мере по смутным сведениям, почти триста лет. Однако самый ранний четкий отчет о его существовании взят из "Странных приключений Эндрю Баттелла из Ли в Эссексе, отправленного португальским пленником в Анголу, который прожил там и в соседних регионах около восемнадцати лет". Впервые она была опубликована в 1613 году в "Purchas his Pilgrimes", а позже более полно, в 1625 году, в "Purchas his

Pilgrimes".^[3] Здесь рассказывается, что в провинции Майомбе, "которая находится в девятнадцати лигах от Лонго вдоль побережья, леса так покрыты павианами, обезьянами, приматами и попугаями, что любой человек испугается бродить в них в одиночку. Здесь также есть два вида монстров, которые распространены в этих лесах и очень опасны. Самый большой из этих двух монстров называется понго, на их языке, а меньший называется Энгеко." Понго оказался гориллой, описание, данное старым заключенным Баттеллом, оказалось удивительно точным. Меньший монстр, энгеко, столь же определенно является шимпанзе. Первое упоминание о экземпляре, действительно замеченном в Европе, относится к 1641 году и отмечено Тульпиусом в его "Медицинских наблюдениях", а самое раннее научное описание шимпанзе — молодого экземпляра *A. troglodytes* — принадлежит анатомам Тайсону и Кауперу, опубликованное Королевским обществом в 1699 году. Однако остеология взрослого экземпляра была описана только в 1835 году, когда появились мемуары сэра Ричарда Оуэна, а вскоре после этого миру был представлен очень подробный отчет о его повадках доктором Томасом Сэвиджем, миссионером, на которого мы уже ссылались (стр. 184), за которым последовало дальнейшее анатомическое исследование его строения доктором Уайменом из Бостона, США

Распространение.—Этот вид встречается на большей части тропической Центральной Африки, и его ареал совпадает с указанным выше для рода. Лоанго и Габун, однако, являются районами, из которых этот шимпанзе в основном был завезен в Европу.

Привычки.—Наиболее характерные привычки обыкновенного шимпанзе уже были приведены при описании рода.

Его пища состоит из всевозможных лесных плодов, и особенно из молодых побегов *сцитамин*, или имбирного растения.

Шимпанзе может двигать кожей на голове, как это делает горилла, но не вызывая встряхивания волос, на что способны и орангутанг, и горилла. Он также может в некоторой степени наморщить лоб, если разочарован или доволен, например, когда ему в чем-то отказывают, или если его пощекотать, когда в последнем случае он также издает хихикающий звук, похожий на сдвленный смех, оттягивает уголки рта и морщит веки.

The Соко, которого Ливингстон наблюдал в стране Мануема, по-видимому, является обычным шимпанзе. "Согласно Ливингстону, - цитирует заметку мистера Х. Х. Джонстона в его превосходном "Жизнеописании" великого путешественника, - эти существа часто ходят прямо, но поддерживают свое тело, положив руки на затылок. Он представляет этого зверя как существо большого ума и настолько хитрое, что трудно подкрасться к нему спереди незамеченным, и поэтому, когда его убивают, это обычно происходит сзади. Народ мануема часто натягивает несколько сетей вокруг какого-нибудь ограждения в лесу, загоняет в них соко и протыкает их копьями. Загнанные в угол подобным образом, они часто набрасываются на нападающих, выхватывают у них копья и ломают их, а возможно, также откусывают мужчинам кончики пальцев. Но, как правило, соко не свирепы. Говорят, что они похищают детей и бегают с ними по деревьям, и их приходится соблазнять бананами. При ранении существо пытается остановить кровотечение, засовывая в рану листья. Оно живет сообществами примерно по десять человек и моногамно. Самка иногда производит на свет близнецов. Как родители, они очень привязаны к своему потомству, отец освобождает мать от бремени с ее детенышем в опасных местах. Их пища состоит из диких фруктов. Время от времени соко собираются вместе и барабанят кулаками по стволам дуплистых деревьев, сопровождая это представление громкими криками".

"Согласно заявлениям самих ниа-ниам, - говорит Швайнфурт, - охота на шимпанзе требует отряда из двадцати или тридцати решительных охотников, которые должны взбираться на деревья высотой около восьмидесяти футов и преследовать проворных и коварных животных,

пока не смогут загнать их в заранее приготовленные силки. Попав в сеть, звери без особого труда убиваются копьями. Однако в некоторых случаях они будут защищаться яростно и со всей яростью отчаяния. Загнанные охотником в угол, они, как говорят, вырывают копья из рук мужчин и умело используют их против противника. Ничего так не стоило бояться, как быть укушенным их огромными клыками ". По словам Швайнфурта, истории о том, что они похищают молодых девушек и строят гнезда, являются чистой воды выдумкой. Его название среди ниам-ниам - "ранья". "Жизнь, которую ведет ранья, очень похожа на ту, которую ведет орангутанг на Борнео, и почти полностью проходит на деревьях, а леса на берегах рек являются главным пристанищем животных.... Подобно гориллам, они встречаются не стадами, а либо парами, либо даже совсем поодиночке, и только детенышей иногда можно увидеть группами ".

ТАБЛИЧКА ХІІ.



ЛЫСЫЙ ШИМПАНЗЕ.

II. ЛЫСЫЙ ШИМПАНЗЕ. АНТРОПОПИТЕК КАЛЬВУС.

Troglodytes calvus, Дю Шайю, пр. Бост. Соч. Нац. История., vii., стр. 296 (1861); id., Путешествия, стр. 32, 48, 63 (1861); Грей, P. Z. S., 1861, стр. 273; Бартлетт, P. Z. S., 1885, стр. 673, pl. xli.; Беддард, Tr. Z. S., xiii., стр. 177 (1893); Романес, P. Z. S., 1889, стр. 316.

Троглодиты кулу-камба, Дю Шайю, пр. Бост. Соч. Нац. История., vii., стр. 358 (1861); id., Путешествия, стр. 39, 49, 50 (1861); Грей, P. Z. S., 1861, стр. 273.

Mimetes troglodytes, разновидность а (*T. calvus*), Серый, Кат. Обезьяны, брит. Муз., стр. 6 (1870).

Anthropopithecus calvus, Цветок и Лайдеккер, Млекопитающие, стр. 736 (1891).

(Табличка XLI.)

Персонажи.—Этот вид был впервые указан Дю Шайю по возвращении из своего знаменитого путешествия в Габун, но на основании плохих шкурок, что оставляло много сомнений в том, что это особый вид. Превосходно сохранившиеся экземпляры были, однако, привезены домой Марке и доктором Компьеном, и некоторые из них были переданы в Дублинский музей, но только в 1885 году, когда живой экземпляр, ныне известный как "Салли", был получен в Зоологическом саду Лондона и прожил там пять лет, была доказана и принята правота Дю Шайю относительно отличия его "кулукамбы", *A. calvus*, от *A. troglodytes*.

Похож на *A. troglodytes*, но отличается от него тем, что лицо, кисти и ступни совершенно черные или коричневатно-черные, а не бледно-телесного цвета; передняя, верхняя и боковые части головы и морды почти голые, с несколькими короткими волосками на голове, которые совершенно лишены каких-либо признаков пробора, столь заметного у *A. troglodytes*. Шерсть более черная, чем у последнего вида, и простирается лишь на небольшое расстояние перед уровнем ушей и по бокам лица; височная область и щеки имеют скудный рост; на подбородке и верхней губе редкая поросль коротких волос, в основном белых; длинные рассеянные черные брови, которые не сходятся на средней линии, отходят от надглазничных гребней. Уши такие же большие, как у *A. troglodytes*, очень плоские, но более заметно выделяются по бокам головы; их край обнаженный, дольки отсутствуют. Кисти покрыты шерстью до костяшек пальцев и снова (после голой повязки) на тыльной стороне кисти и предплечье; ступня покрыта шерстью до первых суставов пальцев ног; ногти и пальчики очень человеческие на вид.

Лицо очень прогнатное; носовые кости заострены по средней линии; ступня меньше похожа на человеческую руку, чем даже у оранга. Мозг "Салли" весил 83,5 унции.

Выражение лица, расширенные ноздри, более толстые губы, особенно нижняя, и более приподнятый череп - все это отличает *A. calvus* от *A. troglodytes*; в мышечной анатомии и мозге у него также есть отличительные черты.

Распространение.—Внутренние районы Габуна, в Западной Африке.

Привычки.—Лысый шимпанзе проявил в неволе склонность питаться животной пищей, чего обычный шимпанзе никогда не делает. У "Салли" также была странная привычка изготавливать шарики, напоминающие отбросы хищных птиц; они состояли из перьев (съеденных ею птиц) и других неперевариваемых веществ, взятых с пищей. Более того, "Салли", как звали этого шимпанзе, ныне прославившегося в анналах зоологии, была опытной крысоловкой, поймала и убила множество крыс, которые попадали в ее клетку. "Ее интеллект был намного выше, чем у обычного шимпанзе. Без особых усилий ее можно было научить делать многие вещи, требующие значительных усилий мышления и понимания". (*Бартлетт*.) По общему поведению *A. calvus*, насколько известно, ни в чем не отличается от *A. troglodytes*.

Именно на этой обезьяне покойный доктор Г. Дж. Романес, привлеченный ее высоким интеллектом, проводил свои интересные психологические эксперименты, о которых рассказывается в Трудах Зоологического общества за 1889 год. "Ее интеллект был наглядно продемонстрирован замечательной степенью, в которой она была способна понимать значение разговорной речи — степенью, полностью равной той, которую демонстрирует младенец за несколько месяцев до выхода из младенчества, и, следовательно, выше, чем та, которую демонстрирует любое животное, по крайней мере, насколько я располагал какими-либо

свидетельствами. Заручившись разумным сотрудничеством хранителей, я попросил их неоднократно просить у Обезьяны одну соломинку, две или три соломинки. Их она должна была подобрать и раздать среди мусора в своей клетке. При подаче этих просьб не соблюдался постоянный порядок, но всякий раз, когда она давала номер, о котором не просили, ее предложение должно было быть отклонено, в то время как, если она называла правильный номер, ее предложение должно было быть принято, и она должна была получить кусочек фрукта в качестве оплаты. Таким образом, обезьяну в конце концов научили связывать эти три числа со своими названиями.... Как только животное понимало, что от него требуется, и училось связывать эти три числа со своими названиями, оно никогда не упускало случая дать запрошенное количество соломинок. Затем ее образование было расширено аналогичным образом с трех до четырех и с четырех до пяти соломинок ". "Салли" редко допускала ошибки до этого числа, но выше пяти и до десяти, до которых один из хранителей пытался продвинуть ее образование, результат остается неопределенным. Очевидно, что она понимает слова "семь", "восемь", "девять" и "десять" как обозначающие числа выше, чем те, что стоят под ними, и когда ее спрашивали о любом из этих чисел выше шести, она всегда называла какое-нибудь число больше шести и меньше десяти. Иногда она перегибала соломинку пополам, чтобы у нее было два конца, и предполагалось, что с тем небольшим запасом терпения, которым она обладала, она ускорит выполнение своей задачи. " Доктор Романес был склонен думать, что неуверенность, с которой она обращалась с числами шесть и семь, была вызвана скорее потерей терпения, чем сбивчивостью в счете. Во всяком случае, было очевидно, что "Салли" умеет точно считать до пяти. Доктор Романес пытался научить ее цветам таким же образом, но результат был настолько одинаково отрицательным, что он был склонен думать, что у нее дальтонизм, поскольку ее учили отличать белые соломинки от соломинок любого другого цвета, но дальше этого ее научить не удалось.

В 1875 году самка обезьяны, получившая название "Мафука", была получена с побережья Лоанго в Дрезденском зоологическом саду. "Это, - говорит доктор Хартманн, - было дикое неуправляемое существо ростом 120 см, во многих отношениях напоминающее нам гориллу. Лицо было прогнатическим (больше, чем у *A. troglodytes*); уши были сравнительно маленькими, располагались высоко на черепе и выступали наружу; надглазничная дуга была сильно развита, кончик носа широким, а на щеках имелись жировые складки. Кроме того, существо было крепко сложено, область бедер и живота была подтянутой, в то время как руки и ноги были большими и мощными. Общее физиогномическое сходство между мафукой и самкой гориллы [чье мертвое тело я осматривал] было очень велико ". Было высказано предположение, что это существо могло быть помесью шимпанзе и гориллы, поскольку путешественник Коппенфелс подтвердил, что стрелял в таких скрещенных животных. До сих пор остается нерешенным вопрос, к какому виду он принадлежал.

Из четырех родов *Simiidae* "гibbonы, очевидно, наиболее удалены от человека и наиболее близки к *Synopithecini* (*Cercopithecidae*).

"Оранги ближе всего к Человеку по количеству ребер, форме полушарий головного мозга, уменьшению затылочно-височной борозды и окостеневшему шиловидному отростку; но в других отношениях, и особенно в конечностях, они отличаются от него гораздо больше, чем горилла и шимпанзе.

"Горилла больше похожа на человека по соотношению ноги к телу и ступни к руке; кроме того, по размеру пятки, изгибу позвоночника, форме таза и абсолютной вместимости черепа.

"Шимпанзе наиболее приближены к Человеку по характеру своего черепа, зубным рядам и пропорциональному размеру рук". (Хаксли.)

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ РАСА. СЕМЕЙСТВО ГОМИНИДЫ.

С этим семейством мы достигаем кульминационной точки зоологического древа. Оно содержит только один монотипический род, Номо, с его единственным видом, Номо sapiens. Несмотря на то, что Человек получил свое конкретное обозначение из уникальной характеристики своих ментальных качеств, он рассматривается здесь только в своем физическом аспекте как одно из млекопитающих.

"Идентичный по физическим процессам, посредством которых он возникает, идентичный на ранних стадиях своего формирования, идентичный по способу своего питания до и после рождения животным, стоящим непосредственно под ним на шкале, Человек, если сравнить его взрослый и совершенный рост с их собственным, демонстрирует, как и следовало ожидать, поразительное сходство организации. Он похож на них, как они похожи друг на друга, — он отличается от них, как они отличаются друг от друга". (Хаксли.) Сравнивая его внешнюю форму и внутреннюю организацию со всеми другими известными зоологическими формами, обнаруживается, что он не занимает ни одной ниши в шкале классификации, основанной на тех же принципах сходства и непохожести, что и применительно к ним, за исключением гиббонов, орангутангов, горилл и шимпанзе, из отряда которых — приматов — он образует лишь дополнительное, хотя и более высокое семейство, исключительно на основании своих структурных характеристик и совершенно независимо от тех неуловимых психических атрибутов, которые возвышают его над всеми другими существами. Какой бы непреодолимой ни была пропасть между обезьяной и Человеком, "структурные различия, которые отделяют Человека от гориллы и шимпанзе, не так велики, как те, которые отделяют высших обезьян от низших". (Хаксли.)

Из трех высших приматов шимпанзе, по-видимому, наиболее приближены к Человеку; но он отличается от них и от всех других представителей *семейства Simiidae* тем, что в вертикальном положении его тело опирается на внешний край широкой, изогнутой, короткопалой ступни, сочлененной под прямым углом к голени. Эта ступня имеет выступающую пятку и толстый большой палец, длиннее всех пальцев, кроме второго, но лежит параллельно и не противопоставляется им или может быть отодвинута от них из-за плоской неокругленной суставной поверхности энто-клиновидной кости лодыжки. Его позвоночник имеет ярко выраженный открытый S-образный изгиб с вогнутостью в нижней части спины, придающей ему эластичность и устраняющей любой шок, который в противном случае мог бы передаваться в мозг через толчки при ходьбе в вертикальном положении. Его руки пропорционально намного короче ног, а также позвоночника; большой палец также пропорционально длиннее, чем у обезьян, и, поскольку все движения пальцев совершаются раздельно, кисть, таким образом, лучше приспособлена к мелким операциям. Голова у человека равномерно расположена на позвоночном столбе прямо под центром своей массы и, таким образом, легко поддерживается и перемещается, тогда как у всех низших форм позвоночных она располагается все дальше и дальше от центра по направлению к спине, при этом ее вес смещается вперед. У человека полость черепа, не расширенная и не уменьшенная сводом орбит, характерно высокая и дугообразная, ее вместимость вдвое больше, чем у любой обезьяны; тем не менее разница в вместимости черепа у различных человеческих рас намного больше, чем между высшей обезьяной и низшим Человеком. (Хаксли.) Его лицевые и челюстные кости меньше и выступают гораздо меньше, даже у самых крупных людей, чем у обезьян; нижний передний край нижней челюсти характерен для человека и выдается вперед, образуя подбородок. В человеческом черепе всегда есть шиповидная кость - шиповидный отросток, который зависит от ушных косточек и окостеневает рядом с ними.

У человека форма таза — большого костного блока, с которым сочленяются ноги, — очень характерна по своей ширине; его большая впадина в форме чаши принимает и поддерживает нижние внутренние органы; к его обширной внешней поверхности прикреплены мышцы, позволяющие ему сохранять вертикальное положение, в то время как его ширина за счет разделения бедренных костей придает телу форму, благоприятную для устойчивости, которая увеличивается за счет широкого угла, под которым сочленяющаяся головка бедренной кости прикреплена к ее стержню. "Если бы человек захотел этого, он не смог бы с удобством ходить на четвереньках: его короткая и почти негибкая ступня и длинное бедро прижимали бы колено к земле; его широко расставленные плечи и руки, слишком далеко вытянутые от срединной линии, плохо поддерживали бы переднюю часть его тела; большая вдавленная мышца, которая у четвероногих удерживает туловище между лопаточными костями в виде обхвата, у человека меньше, чем у любого из них; голова тяжелее из-за величины мозга, а также из-за того, что у четвероногих туловище находится между лопаточными костями. малость пазух или полостей его костей; и все же средства поддержки его слабее, поскольку у него нет шейных связок, и позвонки не настолько изменены, чтобы препятствовать их изгибу вперед; следовательно, он мог поддерживать свою голову только на одной линии с позвоночником, и тогда, поскольку его глаза и рот были направлены к земле, он не мог видеть перед собой". (Кювье.)

Ширина крестца равна или превышает его длину, а ширина таза превышает его высоту, что противоположно тому, что наблюдается у человекообразных обезьян. Запястье (*carpus*) у человека не имеет *центральной кости*; лодыжка (*предплюсна*) длиннее плюсневого сегмента, а он, опять же, длиннее костей большого пальца, которые более сжаты, чем кости пальцев. У человека зубы образуют непрерывный ряд — диастемы нет, что, за исключением вымершего *аноплотерия*, присуще только Человеку; его клыки никогда не бывают выпуклыми или похожими на бивни.

Человеческий мозг отличается от мозга человекообразных обезьян в отношении своих извилин и разделяющих их бороздок лишь второстепенными признаками; но по весу, как и по вместимости, очень сильно. Вес мозга здорового взрослого человека никогда не опускается ниже тридцати двух унций, а мозг самой крупной гориллы, намного тяжелее любого Человека, никогда не достигает более двадцати. Тем не менее, "разница в весе мозга между высшими и низшими Людьми намного больше относительно и абсолютно, чем между низшим Человеком и высшей обезьяной". (Хаксли.)

Несмотря на огромные различия, существующие между высшей и низшей расами человечества, и на то, насколько они разделены географически, этих непохожих признаков считается недостаточно для образования более чем одного вида, поскольку на протяжении всего сериала одна форма переходит в другую, и все они способны к зачатию друг с другом. Хотя существует всего один вид человека, однако, согласно сэру Уильяму Флауэру, его можно разделить на три основные расы.

А. Эфиопская раса.

В эту категорию включены все темнокожие негры с черными вьющимися волосами, длинными головами (*т.е.*, ширина которых составляет менее четырех пятых их длины), умеренно широкими лицами, плоскими носовыми костями, выступающими ногами, толстыми вывернутыми губами, выступающими челюстями и длинными передними конечностями. К этой расе принадлежат (1) негры, населяющие Центральную Африку, из которых есть многочисленные племена: (а) желтовато-коричневые готтентоты южноафриканских равнин и (b) низкорослые бушмены с прямыми лицами, живущие изгоями среди гор и скал, примечательные своими пучками волос, большими жирными ягодицами и своеобразным "щелканьем" в своей речи; (2) *негрильоиз*

Центральной и Западной Африки с короткими головами (*т.е.*, ширина которых превышает четыре пятых ее длины); (3) *меланезийцы*, состоящие из папуасов Новой Гвинеи, Новой Каледонии и Соломоновых островов, с сильными надглазничными гребнями и узким и выступающим носом: "сверхтипичные" горцы Фиджи, тасманийцы и австралийцы, особенно из северной части этого континента, все принадлежат к этой расе; (4) круглоголовые *негритосы* Андаманских островов, Филиппин и Малайского архипелага.

Б. Монгольская раса.

Они невысокого роста, кожа желтая или коричневая, волосы черные и прямые, в изобилии на голове, но редкие в других местах; череп низкий и промежуточный между длинным и широким; лицо широкое, плоское, с крупными скулами; глазницы высокие и круглые. К этому племени принадлежат (1) эскимосы Гренландии и всех субарктических регионов Евразии и Северной Америки; (2) монголы, из которых японцы, лопари-кочевники, финны, оба со смешанной кавказской и монгольской кровью, а также потомки монголов, мадьяры и турки, образуют северную и значительно измененную группу, в то время как китайцы, тибетцы, бирманцы и сиамцы составляют южную, более цивилизованную группу; (3) малайцы Малайского полуострова и Суматры, в которых японцы, лопари-кочевники, финны, имеющие смешанную кавказскую и монгольскую кровь. монгольские черты очень очевидны; (4) смуглые полинезийцы, населяющие Самоа, Тонга, восточные полинезийские острова и Новую Зеландию; (5) коренные американские расы, населяющие континент от Огненной земли на юге до субарктических регионов, занятых эскимосами.

С. Кавказская раса.

Из этого племени выделяются две совершенно разные группы: (1) высокие, белокурые, прямые, светловолосые, голубоглазые, светлокожие, бородатые народы Северной Европы, Скандинавии, Шотландии, Северной Германии - названные Хаксли *ксантохроями* ("желтоволосые" и бледнолицые): как смешанная раса они распространились и на Север. Африка и Афганистан; и от смешения с монголами произошли финны и лопари; и (2) *меланохрои* ("черноволосые"), люди ниже ростом, с длинными головами, бледной кожей, выдающимися носами, но с черными волнистыми волосами, бородами и темными глазами, которые населяют Южную Европу, Северную Африку и юго-западную Азию, а также встречаются на Британских островах. Они известны как кельты, иберийцы, римляне, пеласги и семиты. Дравиды Индии, ведды Цейлона и, вероятно, айно из Японии и маутзе из Китая принадлежат к кавказской группе. Древние египтяне, потомками которых являются копты и феллахи современного Египта, являются чистокровными *меланохроями*. (Цветок.)

ВЫМЕРШИЕ АНТРОПОИДЕИ.

Как мы видели выше (том I, стр. 110), самые ранние лемуroidы появились в Нижнем эоцене третичного периода в Новом Свете и в Старом Свете в его верхних слоях; они сохранялись в течение всего эоцена в Западном полушарии и в последний раз их видели в Нижнем миоцене Северной Америки.

Ископаемые человекообразные обезьяны, с другой стороны, впервые появляются в Южной Америке, в пластах Санта-Крус в Патагонии, в слоях верхнего эоцена или олигоцена. В Старом Свете они появляются на сцене только в тропические эпохи миоцена. Когда в Европе откладывались средние и верхние слои позднего периода, человекообразные обезьяны обитали от берегов Средиземного моря дальше на север, чем нынешняя северная граница распространения обезьян Старого Света.

В эпоху плиоцена *антропоидеи* обитали в Южной Азии, примерно там, где сейчас находятся холмы Сивалик, и в Южной Европе, как в Пикерми и на Самосе, будучи представлены почти полностью видами все еще существующих родов и одним живущим видом — орангом. Шимпанзе уже тогда дифференцировались, и, возможно, даже появился Человек, хотя доказательства недостаточно убедительны.

В плейстоцене были обнаружены останки многих все еще живущих видов как в Новом, так и в Старом Свете, и безошибочно узнаваемые костные останки, а также многочисленные свидетельства работы человека в ту отдаленную эпоху.

СЕМЕЙСТВО NAPALIDAE (Том I., стр. 129).

РОД NAPALE (указ. соч., стр. 131).

Многочисленные останки двух видов этого рода были обнаружены во многих бразильских пещерах плейстоценового или недавнего возраста. Они были отнесены к двум видам: *Napale grandis* (Лунд) и все еще живущему *N. jacchus* (Linn.; ср. Том I., стр. 132).

СЕМЕЙСТВО CEBIDAE (Том I., стр. 150).

РОД PROTOPITHECUS.

Protopithecus, Лунд, Ann. Sc. Нац. (2), xi., стр. 230 (1839); Циттель, Рукопись. Палеонтолог., iv., стр. 705 (1893).

Этот род основан на очень большой ножной кости из костных пещер плейстоцена в Бразилии. Этот вид был описан как *Protopithecus brasiliensis*, Лунд.

РОД CALLITHRIX (Том I., стр. 158).

Два вида были описаны из плейстоценовых костяных пещер Бразилии: *Callithrix chlorosomys*, Лунд, и *C. primæva*, Лунд (= *C. antiqua*, Лунд).

РОД АЛУАТТА (Т. I., стр. 192).

Останки одного вида, *Alouatta ursina* (стр. 149), были обнаружены в костных пещерах плейстоцена в Бразилии.

РОД CEBUS (Том I., стр. 204).

В плейстоценовых костных пещерах Бразилии сохранились три вида: один вымерший, *Cebus macrogathus*, Lund, и два все еще живущих, *C. fatuellus*, Linn., и *C. cirrifer*, Geoffr.

РОД ГОМУНКУЛУСОВ.

Гомункулус, Амегино, преподобный Арджент. История. Нац., i., стр. 290, 384 (1891).

Экфантодон, Наемник, преподобный Муз. La Plata, ii., p. 74, pl. ii.; Zittel, Handb. Палеонтолог., iv., стр. 704 (1893).

Зубная формула этого рода - I22, C11, P33, M33. Диастема, или перелом, в зубном ряду очень маленькая; резцы имеют форму долота, внешняя пара меньше внутренней. Клыки, у которых сзади есть небольшой базальный выступ, лишь слегка выдаются вперед; предмоляры имеют один

корень, один низкий наружный выступ и два более высоких внутренних выступа. Коренные зубы четырехугольной формы, с двумя парами выступов, каждый из которых соединен косо гребнем; передний коренной зуб меньше двух задних. Кость руки (*плечевая кость*) имеет лор-надмышцелковое отверстие. (*Циттель*.) Передняя поверхность линии соединения двух половин нижней челюсти вертикальная. Конечные суставы пальцев снабжены ногтями. Большой и указательный пальцы противоположны. *Homunculus patagonicus*, амегино (= *Ecphantodon ceboides*, наемник), единственный известный вид, встречается в верхнем эоцене или олигоцене Санта-Крус, Патагония.

РОД ANTHROPOPS.

Антропопс, Амегино, преподобный Арг. Нац. История., i., стр. 387 (1891); *Циттель*, рук. Палеонтолог., iv., стр. 704 (1893).

Этот род известен только по фрагменту нижней челюсти, содержащему четыре маленьких резца, два сильных клыка, а также передний и средний моляры, оба однокорневые. Известен один вид, *Anthropops perfectus*, амегино, из более древних третичных (верхний эоцен или олигоцен) отложений Санта-Крус, Патагония.

Два рода, *Homocentrus* (*H. argentinus*, Амер.) и *Eudiastus* (*E. lingulatus*, Амер.), описанные Амегино из отложений Санта-Крус в Патагонии, еще недостаточно охарактеризованы.

СЕМЕЙСТВО CERCOPITHECIDAE (Том I., стр. 248).

РОД ПАПИО (*выше*, стр. 253).

Несколько видов этого все еще живущего рода были обнаружены в слоях третичной эпохи: *Pario subhimalayanus* (Мейер) с холмов Сивалик нижнеплиоценового возраста; *P. falconeri* (Лидеккер) из плейстоценовых костных пещер Мадраса, Индия, и в поверхностных отложениях Алжира, Северная Африка; и *P. atlanticus* (Томас).

Вид сиваликов был тесно связан с существующими североафриканскими павианами.

РОД OREOPITHECUS.

Ореопитек, Жерве, C. R., стр. 1223, lxxiv. (1872); Ристори, Boll. Com. Геология. (3), i., стр. 178, 226, pls. vii., viii. (1890); *Циттель*, рук. Палеонт, iv., стр. 705 (1893).

Признаками, отличающими этот род, являются резцы, которые имеют форму долота сверху и совка снизу; крупные верхние и нижние клыки; верхние предмоляры, которые по форме приближаются к коренным зубам, с наружными выступами выше, чем внутренние, и крепким внутренним; верхние коренные зубы с двумя парами противоположных конических выступов, разделенных продольной бороздой, и с сильной поясной складкой; задний верхний коренной зуб меньше среднего; нижние коренные зубы меньше верхних, с двумя парами выступов и одним большим зубом. пятый на задней границе, который в самом заднем зубе переходит в крепкий коготь. Лицо короткое, подбородок округлый. *Oreopithecus bambolii*, Жерве, является наиболее известным видом и был получен из бурых углей середины миоцена Монте-Бамболи, Кастеани и Монте-Масси в Тоскане. Некоторые палеонтологи относят его к обезьянам, а другие - к *церкопитекидам*. По словам Ристори, нижняя челюсть показывает ее союз с *Папио* и *церкопитеками*; в то время как верхняя челюсть больше напоминает человекообразных обезьян. Это самая крупная из известных ископаемых обезьян, и по силе ее превосходит только *дриопитек*, *Циттель*.

РОД MACACUS (*выше*, стр. 1).

Виды, принадлежащие к этому все еще живущему роду, встречались в Азии и Европе в эпоху плиоцена, которая непосредственно предшествовала Великому ледниковому периоду, а также в саму эпоху плейстоцена. *Macacus sivalensis* является старейшим ископаемым представителем рода и был описан г-ном Лайдеккером из отложений Сивалик в Пенджабе. *M. priscus* известен из плиоцена Монпелье во Франции; *M. florentinus*, Cocchi (то же, что *Aulaxinuus florentinus* из Кокки и *M. ausonianus* из Форсайт-Майора), из верхнего плиоцена в долине Арно. *M. suevicus* (Hedinger), который был описан по хорошо сохранившейся небной кости, имеющей все коренные и два предмолярных зуба, был найден в Хеппенлохсе в Вюртемберге. *M. trarensis* (помель) встречается в Алжире, в слоях ледникового периода; в то время как в ямах на Гибралтарской скале останки того же вида, который обитает там сейчас, - *M. inuus* — были обнаружены г-ном Кальдероном в 1879 году. Из другой расщелины в Монстене, в Верхней Гаронне, М. Харле извлек фрагмент нижней челюсти вида *Macacus*, связанного с костями млекопитающих ледникового периода. (Циттель.) Той же древности относится челюсть, найденная, по словам м-ра Лайдеккера, близ деревни Грейс в Эссексе, что указывает на очень большое отличие климата той части Англии от современного.

РОД DOLICHOPITHECUS.

Долихопитек, Депере, Память. Сокр. Геол. фр., Palæont., i., стр. 11 (1890); Циттель, рук. Палеонтолог., iv., стр. 707 (1893).

Родственны *семнопитекам*, но у них морда длиннее, а конечности короче и крепче. Род был основан на трех черепах, нескольких зубах и ряде костей скелета, принадлежащих виду *Dolichopithecus rusciniensis*, Депере, из плиоценовых слоев Перпиньяна, Франция. (Циттель.)

РОД MESOPITHECUS.

Mesopithecus, Wagner, Abh. K. Bayer, Ak. (1) iii., p. 154; vii., abth., ii., p. 9; Zittel, Handb. Палеонтолог., iv., стр. 706 (1893).

Этот род основан на черепе и зубах, которые указывают на союз с *семнопитеком*, в то время как скелет больше напоминает скелет *Macacus Inuus* (берберийской обезьяны). У самца были гораздо более длинные и мощные клыки, чем у самки. Типичный вид *Mesopithecus pentelici*, Вагнера, был основан на фрагменте, первоначально привезенном солдатом в 1838 году из Пикерми в Мюнхен. С тех пор был восстановлен весь скелет, и в настоящее время это один из самых известных ископаемых видов *Anthropoidea*. Он жил во времена плиоцена, по-видимому, в войсках в лесах равнин Пикерми, которые в то время простирались далеко до того места, где сейчас находится Средиземное море. Останки того же вида были обнаружены недалеко от Балтавара в Венгрии.

РОД COLOBUS (выше, стр. 85).

В лесах Европы середины миоцена этот род был представлен видом, описанным профессором Фраасом как *Colobus grandævus* из Штайнхайма, Вюртембург.

РОД SEMNOPITHECUS (выше, стр. 100).

Среди лесов, в которых в эпоху верхнего плиоцена росли бамбук, ликвидамбары, тюльпанные деревья, магнолии, лавры и гранаты, в центре Европы обитали отряды лангуров, тесно связанных с таковыми в наше время. *Semnopithecus monspessulanus*, Жерве, был обнаружен в слоях того же возраста в Монпелье и недалеко от Казино в Тоскане. *S. palæindicus* (Лидеккер) населял леса в

регионе, где сейчас возвышаются холмы Сивалик у подножия Гималаев, в то время как *S. entellus* бродил по этому региону в плейстоценовую эпоху, как и его настоящие потомки сегодня.

СЕМЕЙСТВО SIMIIDAE (выше, стр. 143).

РОД *PLIOPITHECUS*.

Плиопитек, Жерве, С. R., xliii., стр. 221 (1856); id., Зоол. и др. Франк., стр. 8 (1859); Форсайт Майор, Атти. Соч. . Итал. Sc. Nat., xv., стр. 82 (1872); Циттель, рук. Палеонтолог., стр. 708 (1893).

Protopithecus, Ред. Лартет (nec Lund), Анн. Деп. Жер., 1851, с. 11.

Этот род очень близок к *хилобатам*, но отличается от него формой и пропорциями зубов. Род основан на нижней челюсти, найденной в середине миоцена Центральной Европы. Резцы маленькие и длинные; клыки сильные, но немного выше резцов; передние коренные зубы низкие, передний имеет один выступ, а следующие два острия; коренные зубы имеют две пары противоположных коротких, толстых, конических выступов, с дополнительным на задней границе, который расширяется в коготь в самом заднем ряду. Типовой вид *Pliopithecus antiquus*, который очень похож на гиббонов, обитал в пышных лесах Сансана (Германия), а его разновидность, описанная как *P. chantrei*, Депере, населяла леса вокруг Мон-Синдре. Останки тех же животных были обнаружены в бурогольных пластах Эльгга в Швейцарии и Гериаха в Штайермарке.

РОД *HYLOBATES* (выше, стр. 148).

Настоящие гиббоны, неотличимые от тех, что обитают сейчас на острове, были найдены в пещерах Борнео.

Прекрасно сохранившаяся кость конечности из пластов Эппельсхайма плиоценового возраста также была отнесена к виду этого рода.

РОД *DRYOPITHECUS*.

Dryopithecus, Lartet, С. R., xliii., стр. 221 (1856); id., Мем. Сок. Геол., Палеонтолог., i., стр. 1, стр. 1 (1890); Годри, С. R. Сх., стр. 373 (1890); Циттель, рук. Палеонтолог., iv., стр. 709 (1893).

Этот род основан на останках середины миоцена из Сен-Годена (Верхняя Гаронна), которые указывают на прежнее существование обезьяны, более похожей на человека, чем любая другая. По размерам он приближался к размерам шимпанзе; резцы меньше — приподнятый характер - и короче, чем у гориллы или шимпанзе. Клыки, как у гориллы, толстые, острые сзади и выше скуловых зубов; передний предмolars большой, как у гориллы, имеет один корень и сильную поясную кость с внутренней стороны; задний предмolars длиннее, чем широкий, с двумя остриями и уплощенным когтем. Коренные зубы имеют две пары противоположных остриев и пятую на задней границе, которая на самом заднем зубе превращается в двузубый коготь. Линия соединения нижней челюсти высокая, наклонно выступает вперед и длиннее и уже, чем у человека. Позднее появление последнего коренного зуба на верхней челюсти считалось признаком, общим только для *дриопитеков* и человека; но доктор Форсайт Мейджор заметил, что у *Macacus* такое же позднее появление "зуба мудрости" происходит у. Типовой вид *Dryopithecus fontani*, Lartet, обитавший в среднемиоценовых лесах Сент-Годенса, хотя и был наиболее человекоподобным из всех третичных приматов, тем не менее был дальше от человека, чем шимпанзе (*антрополопитек*). Форма симфиза его нижней челюсти указывает на то, что его морда была значительно удлинена. Определенные коренные зубы, найденные в слоях Бонерц из Мельхингена и Зальмендингена в Вюртемберге и когда-то считавшиеся человеческими, теперь приписываются *Д. фонтани*.

РОД SIMIA (выше, стр. 170).

К этому роду был отнесен коренной зуб, найденный в плиоценовых слоях холмов Сивалик в Индии. Считается, что он принадлежит орангутангу, *Simia satyrus*.

РОД ANTHROPORITHECUS (выше, стр. 188).

Фрагмент челюсти, также из плиоценовых отложений на холмах Сивалик, был описан Лайдеккером как *Anthropopithecus sivalensis*, который сначала отнес его к новому роду, *Palæopithecus*, но совсем недавно определил, что он действительно принадлежит к этому теперь исключительно африканскому роду. Относительная малость премоляров отличает его от оранга. Если это определение подтвердится, присутствие настоящего шимпанзе в Азии станет фактом, представляющим наибольший интерес для географического распространения *Simiidae*.

СЕМЕЙСТВО ГОМИНИДЫ (выше, стр. 203).

РОД НОМО (выше, стр. 203).

Хотя, как было указано выше, *приматы*, представленные низшими лемуroidами, обнаруживающими родство с предками копытных животных (*Ungulata*), впервые появились во времена эоцена, было бы безнадежным делом, как указывает профессор Бойд-Докинз, искать высокоспециализированного Человека в фауне, где не было ни одного живого рода млекопитающих.

Д-р Хэми и М. де Мортилле считают, что самое раннее появление Человека на земном шаре произошло во Франции в середине миоцена. Они основывают свою веру на осколках кремня, предположительно изготовленных искусственно, и на надрезе на кости вымершего ламантина, который считается делом рук человека. Однако эти доказательства сомнительны и неудовлетворительны. В эту эпоху появились такие антропоиды, как *плиопитек* и высокоразвитый *дриопитек* (стр. 216), когда климат в средней Европе был тропическим и теплым и благодатным даже в пределах 8° 15' от Северного полюса. Профессор Бойд-Докинз считает, что, несмотря на благоприятный климат и существование такой высокоразвитой обезьяны, как *дриопитек*, "если бы любое человекоподобное животное жило в эпоху миоцена, можно было бы разумно ожидать, что оно было не Человеком, а промежуточным звеном между Человеком и чем-то еще".

Плиоцен, *то есть*, та часть третичного периода, в которой *роды* млекопитающих в основном такие же, как и ныне живущие — известно, что идентичен только один *вид*, — это следующий горизонт, в котором, как утверждается, были найдены человеческие останки.

Доказательства основаны на черепе, найденном в железнодорожной яме во Франции после оползня, и на предполагаемой искусственно вырезанной кости; но обе эти данные требуют подтверждения. Сеньор Рибейру, однако, обнаружил в Португалии орудия, которые, как утверждается, несомненно были изготовлены человеком, в слоях этого возраста на глубине 1200 футов под поверхностью; и профессор Уитни утверждал, что в Калифорнии из плиоценовых слоев были извлечены череп, а также ступка и пестик. Последнее доказательство также было поставлено под сомнение.

Находки в Крейфорде и в Кентс-Хоул в Англии, а также в Грот д'Эглиз во Франции кремневых орудий человеческого изготовления, без сомнения, демонстрируют, что человек жил в

Европе в плейстоценовую эпоху — в то время большинство видов млекопитающих были идентичны тем, которые существуют сейчас, — до того, как климат (который охлаждался с миоцена) стал настолько холодным, что заставил арктических млекопитающих скопиться перед приближающимся оледенением Северного полушария. В ту эпоху Людям, плывущим по реке, как их называют, пришлось бы сражаться с Волками, Медведями и Львами; в то время как Слоны и носороги, Лошади, Быки и Бизоны дико бродили вокруг них. Орудиями труда этой "длинноголовой" расы были камни, которые удобно подбирали и грубо обтесывали в виде грубых рубил и скребков, заостренных сверл и режущей щепы. Есть свидетельства того, что их создатели жили в более обширной Европе, чем сейчас, в Африке и континентальной Индии. Вслед за речными дрейфующими людьми, которые исчезли вместе с ледниковым периодом, на сцене появилась раса, известная как палеолитические "Пещерные люди". В связи с их костями в многочисленных пещерах были найдены останки северного оленя (*Cervus tarandus*), шерстистого носорога (*R. tichorhinus*) и мамонта (*Elephas primigenius*). Они были артистичным народом, оставившим необычайной точности рисунки животных, с которыми они были знакомы, нацарапанные на костях и рогах самих животных. Их орудия были лучше отточены и сформованы, чем у людей, плывущих по реке. Они, по-видимому, ничего не знали о гончарном искусстве; но они одевались в шкуры, носили украшения из зубов и охотились на северных оленей и других животных — они были мужчинами, как отмечает сэр А. Гейки, которые, должно быть, имели большое сходство с эскимосами — отождествление, однако, которое в последнее время сильно оспаривается. Множество фрагментов их скелетов было найдено в пещерах в различных частях Европы: нижняя челюсть и *локтевая кость* в Наулетте, череп в Кроманьонье, нижняя челюсть в гроте Фес в Арси-сюр-Кюре (Йонн), еще одна из скального убежища Ла-Мадлен в Дордони; части черепов из неандертальцев, Каннштатта и Гибралтара, а также далеко на север, в Дербишир, в Англии. К сожалению, все останки очень фрагментарны и дают немногим больше информации о физических признаках палеолитических рас, чем то, что они были "длинноголовыми". Однако в 1886 году в гроте Шпион в бельгийской провинции Намюр были обнаружены два почти полных скелета, которые показали, что череп неандертальца, нижняя челюсть из Наулетта и черепа из Каннштатта и Гибралтара принадлежали одной и той же расе. Эта раса, которая была широко распространена по Европе в эпоху палеолита, имеет больше обезьяньих черт, чем любая из еще не обнаруженных. М. Лох и Фрейпонт из Льежа, обнаружившие и описавшие останки из Спу, подробно описали следующие характерные черты обезьян, которые они демонстрируют: Надбровные дуги намного больше, а лоб более отступающий, чем у любой другой известной расы — признаки, которые очень напоминают таковые у самок и молодых самцов орангов и шимпанзе; а в затылочной области черепа виден поперечный дуг, как у некоторых африканских племен и у вышеназванных человекообразных обезьян. Нижняя челюсть практически не имеет того заметного человеческого признака — подбородка; а наклон внутренней (или задней) поверхности ее симфиза занимает промежуточное положение между наклоном человека и высших обезьян. Кости передней руки (*локтевая* и *лучевая*) изогнуты так, что между ними образуется пространство, более широкое, чем у любого человека, и напоминающее то, что наблюдается у обезьян. Бедренная кость (*бедренная кость*) имеет такую форму и сочленена с костью ноги (*большеберцовая кость*), "что для поддержания равновесия голова и туловище должны быть запрокинуты вперед". Такое соотношение *бедренной кости* и *большеберцовой кости* встречается у человекообразных обезьян, и весьма вероятно, что Человек-Шпион при ходьбе представлял собой нечто похожее, то есть колени были согнуты, а тело выброшено вперед. Коронки коренных зубов этой расы имеют, как и у низших рас человека, четыре выступа, но с отчетливыми и расходящимися корнями, как у шимпанзе, но они увеличиваются в размерах спереди назад, как у человекообразных обезьян. "Другие и гораздо более многочисленные

признаки этого длинноголового черепа, туловища и конечностей, по-видимому, полностью человеческие". (*Fraipont.*) "Под каким бы аспектом мы ни рассматривали этот череп [неандертальца] ... рассматриваем ли мы его вертикальную впадину, огромную толщину надцилиарных гребней, покатый затылочный бугор или длинный и прямой чешуйчатый шов — мы встречаем обезьяноподобные признаки, делающие его наиболее питекоидным из когда-либо обнаруженных человеческих черепов". Объем черепа, однако, составлял около семидесяти пяти кубических дюймов, и "такая большая масса мозга, как эта, сама по себе наводит на мысль, что питекоидные тенденции, на которые указывает череп, не простирались глубоко в организацию.... Таким образом, кости неандертальца ни в коем случае нельзя рассматривать как останки человека, занимающего промежуточное положение между человеком и обезьянами". (*Хаксли*, 1867.) "Расстояние, отделяющее Человека-шпиона от современной Человекообразной обезьяны, несомненно, огромно; между Человеком-шпионом и *дриопитеком* оно немного меньше. Но нам должно быть позволено указать на то, что если Человек позднечетвертичной эпохи является породой, из которой произошли существующие расы, то он прошел большой путь. Исходя из полученных в настоящее время данных, можно полагать, что мы сможем продолжить изучение предкового типа Человека и человекообразных обезьян еще дальше, возможно, до эоцена и даже дальше". (*Fraipont.*) Поскольку эти ископаемые человеческие останки теперь признаны относящимися к эпохе палеолита периода плейстоцена, они дают некоторое представление о "скорости эволюции человеческого вида", и указывают на то, что она происходила не намного быстрее или медленнее, чем у других млекопитающих. И если это так, то мы вправе предположить, что род *Номо*, если не вид, который из вежливости или иронии натуралистов окрестили *sapiens*, был представлен в плиоценовые или даже миоценовые времена.... Нет оснований предполагать, что род *Номо* был ограничен Европой в эпоху плейстоцена; гораздо более вероятно, что этот вид, как и другие роды млекопитающих того периода, был распространен на значительной территории земного шара. Фактически, в то время климат регионов, расположенных ближе к экватору, должен был быть гораздо более благоприятным для человеческого вида, и вполне возможно, что при таких условиях он мог достичь более высокого развития, чем на севере". (*Хаксли*.) Профессор Хаксли также указывает в интересной статье "Арийский вопрос" в "*Современном обозрении*" за ноябрь 1890 г., из которой мы взяли приведенные выше выдержки, что черепа ирландцев с берегов рек, принадлежащие к темноволосой длинноголовой расе, и черепа фризов, белокурой длинноголовой расы, ныне живущей на северогерманском побережье, безошибочно приближаются к неандертальскому типу и типу шпиона по многим своим отличительным признакам, что является "верным указанием" на физиологическую преемственность с плейстоценом. Неандерталоидные люди. Черепа некоторых австралийских аборигенов и широколового народа Борребю в Дании также демонстрируют замечательное сходство с черепом неандертальца — возможно, это указание на то, что они являются признаками этапа в родословной человеческого вида, предшествовавшего его дифференциации в какую-либо из существующих рас. (*Хаксли*.)

Следующие палеонтологические свидетельства присутствия Человека обнаружены в пещерных отложениях эпохи неолита, аллювиальных скоплениях, торфяных мхах, на дне озер, свайных жилищах и курганах из ракушек в различных частях Европы. Между временем, когда человек эпохи палеолита покинул пещеры, которые он занимал, и датой, когда люди раннего неолита начали складывать фрагменты записей своей истории в кухонные навозы, которые они складывали перед своими убежищами, во многих районах, по-видимому, прошел длительный период. Предметы, найденные в этих мусорных кучах, связаны не с останками мамонта, шерстистого носорога или Слона, а с останками животных, которые все еще живут или дожили до исторических времен. Остатки его скелета указывают на то, что

человек эпохи неолита очень сильно различался по росту. Одни были высокими, другие - низкими; у одних были длинные, у других - широкие черепа. Длиннорogie люди имели тот же высокий рост и особенности черепа, что и голубоглазые, светловолосые и длинноголовые *ксантохрои*, живущие в наши дни в Восточной Пруссии, Северной Бельгии, Северной Франции и Великобритании, хотя их костная ткань "носит признаки несколько большей прочности и дикости". Ширококостные мужчины были невысокого роста и внешне походили на большинство людей, населяющих сейчас Средиземное море, - *меланохроев*, с черными волосами и черными глазами. Во многих неолитических захоронениях обнаружены также останки высокой расы с широким черепом и низкорослой расы с длинным черепом.

Таковы единственные восстановленные звенья в родословной нашей расы, и они крайне неудовлетворительны; действительно, за пределами этих немногих мест в Западной Европе, Калифорнии и долины Миссисипи в Северной Америке палеонтология умалчивает об истории человека и не проливает света ни на его происхождение, ни на его последних питекоидных родителей; ибо, по впечатляющим словам профессора Хаксли, "пока этот свет ярок, он показывает его таким, какой он есть сейчас, а когда он тускнеет, он не позволяет нам увидеть никаких признаков того, что он был другим, чем он есть сейчас". . "

III.—ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМАТОВ.

С помощью прилагаемых таблиц и карт я попытался кратко и ясно представить распространение *Lemuroidea* и *Anthropoidea* во времени и пространстве.

Для распределения существующих форм я следовал разделению Земного шара, предложенному доктором Боудлером Шарпом в его эссе о зоогеографических зонах мира, опубликованном в "Естествознании" (Том III, стр. 100-108).

I. Таблица, показывающая роды приматов, характерные и общие для Старого и Нового Света.

A. LEMUROIDEA.

	СТАРЫЙ СВЕТ. (Палеогей.)		НОВЫЙ СВЕТ. (Неогей.)	
	Живые.	Вымерший.	Живой.	Вымерший.
Семья. Хиромида.				
Хиромис	†	—	—	—
Сем. Долгопяты.				
Тарсий	†	—	—	—
Фам. Мегаладаптивность.				
Мегаладаптис	—	†	—	—
Фам. Лемуриды.				
Perodicticus	†	—	—	—
Лорис	†	—	—	Никтицебус
†	—	—	—	—
—	—	—	—	—

—	Микроцебус	—	—	—
Микроцебус	—	—	—	Лемур
.	—	—	—	—
—		†	—	—
Миксоцебус	†	—	—	—
Хапалемур	†	—	-	-
Лепидолемур	-	-	—	-
-	†	-	-	Индрис
Пропитек	-	-	-	-
-	-	Сем.	-	-
Анаптоморфиды.				
Microchærus	—	†	—	—
Mixodectes	—	—	—	†
Cynodontomys	—	—	—	†
Omomys	—	—	—	†
Anaptomorpha	—	—	—	†
Plesiadapis	—	†	—	—
Protoadapis	—	†	—	—
Фам. Адапиды.				
Adapis	—	†	—	†
Tomitherium	—	—	—	†
Laopithecus	—	—	—	†
Pelycodus	—	†	—	†
Microsyops	—	—	—	†
Hyopsodus	—	†	—	†
Indrodon	—	—	—	†
Opisthotomus	—	—	—	†
Apheliscus	—	—	—	†
Sarcolemur	—	—	—	†
Hipposyus	—	—	—	†
Bathrodon	—	—	—	†
Mesacodon	—	—	—	†
Stenacodon	—	—	—	†
Б. АНТРОПОИДЕИ.				
Семейство. Хапалиды.				
Нарале	—	—	†	†
Мидас	—	—	†	—
Фам. Себида.				

Chrysothrix	—	—	†	—
Protopithecus	—	—	—	†
Callithrix	—	—	†	†
	—	—	†	—
Nyctipithecus				
Brachyurus	—	—	†	—
Pithecia	—	—	†	—
Alouatta	—	—	†	†
Состоянию На	—	—	†	†
Гомункул	—	—	—	†
Anthropops	—	—	—	†
Lagothrix	—	—	†	—
Brachyteles	—	—	†	—
Ейтелес	—	—	†	—
Фам. Cercopithecidae.				
Папио	†	†	—	—
Теропитек	†	—	—	—
Кинопитек	†	—	—	—
—	Макакус	—	—	Церкоцебус
—	—	—	—	—
—	—	—	—	-
-	-	-	-	
Долихопитек	-	†	-	—
Месопитек	—	†	—	—
Колобус	†	†	—	—
-	†	-	—	-
-	†	-	—	-
Семья. Simiidae.				
Pliopithecus	—	†	—	—
Гиббоновые	†	†	—	—
Dryopithecus	—	†	—	—
Обезьяний	†	†	—	—
Горилла	†	—	—	—
Anthropopithecus	†	†	—	—

Из приведенных выше таблиц будет очевидно, что, хотя современные *Lemuroidea* ограничены Восточным полушарием, в прошлые времена некоторые роды были не только общими для обоих полушарий, но и Отряд был одинаково хорошо, если не лучше,

представлен в Новом Свете, чем в Старом. Среди *Anthropoidea*, с другой стороны, тогда, как и сейчас, ни один из родов не был общим для обоих полушарий; и большое количество существовавших тогда родов были идентичны родам, живущим сейчас, в большей степени, чем среди *Lemuroidea*.

II. Таблицы, иллюстрирующие распределение родов приматов во времени в различных зоогеографических регионах, на которые был разделен Мир.

A. Палеарктический регион.

		Третичный. ЭОЦЕН.	МИОЦЕН.	ПЛИОЦЕН.	ПОСТ- ТРЕТИЧН ЫЙ.	СЕЙЧАС ЖИВУЩИ Й СЕЙЧАС.
Фам .	Lem uroi dea.					
	Chir omy idæ	—	—	—	—	—
	Tars iidæ	—	—	—	—	—
	Meg alad apid	—	—	—	—	—

,,	æ													
	Lem urid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
,,	Ana pto mor phid æ	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ada pid æ	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Фам .	Ant hro poid ea.													
	Hap alid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ceb idæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Cer copi thec idæ	—	—	—	—	2	1	1	4	1	2	2	1	3
	Simi idæ	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—
	Ho mini dæ	—	—	—	—	?	—	—	?	—	1	1	1	1

Б. Эфиопский регион.

Третичный.
ЭОЦЕН.

МИОЦЕН.

ПЛИОЦЕН.

ПОСТ-
ТРЕТИЧНЫ
Й.

СЕЙЧАС
ЖИВУЩИЙ
СЕЙЧАС.

—


Upper
Middle
Inner
Upper
Middle
Inner

[illegible]

Meg alad apid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lem urid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Ana pto mor phid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ada pid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anth ropo idea.													
Hap alid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cebi dæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerc opit heci dæ	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—	4	42
Simii dæ	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	2	8
Hom inid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1


LEMUROIDEA.

ТАБЛИЧКА XLII.



I. КАРТА, показывающая распределение ныне живущих (синяя) и ископаемых (красная) *Lemuroidea*.

LEMUROIDEA. ПЛАСТИНКА XLIII.



II. КАРТА, показывающая распространение семейства *Tarsiidae* (синяя) и подсемейства *Galaginae* (красная) *Lemuridae*.

Д. Австралийский регион.

Третичный.

ЭОЦЕН.

МИОЦЕН.

ПЛИОЦЕН.

ПОСТ-

ТРЕТИЧНЫ
Й.

СЕЙЧАС

ЖИВУЩИЙ
СЕЙЧАС.

Upper
Middle
Lower
Middle
Lower
Middle
Lower

[illegible]

Meg alad apid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lem urid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ana pto mor phid æ	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ada pid æ	8	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anth ropo idea.													
Hap alid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cebi dæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerc opit heci dæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Simii dæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hom inid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

F. Неотропический регион.

Третичный.
ЭОЦЕН.

МИОЦЕН.

ПЛИОЦЕН.

ПОСТ-
ТРЕТИЧНЫ
Й.

СЕЙЧАС
ЖИВУЩИЙ
СЕЙЧАС.

—

Outer

Middle

Inner

Outer

Middle

Inner

Outer

Middle

Inner

Lem uroi dea.													
Chir omyi dæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tarsi idæ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Meg alad apid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lem urid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ana pto mor phid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ada pid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anth ropo idea.													
Hap alid æ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	22
Cebi	—	—	4	—	—	—	—	—	—	7	—	10	65

dæ													
Cerc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
opit													
heci													
dæ													
Simii	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dæ													
Hom	—	—	—	—	—	—	—	?	—	1	1	1	1
inid													
æ													

Приведенные выше таблицы показывают, что в эпоху эоцена третичного периода *Lemuroidea* были ограничены регионами Палеарктики и Неарктики; и, если бы геологическая летопись была более точной, мы, вероятно, обнаружили бы, что они были распространены по большей части Северного полушария, климат которого в тот период был субтропическим. За пределами этих двух регионов не было обнаружено останков лемуroidов после окончания эоцена (за исключением единственного нижнемиоценового рода *Laopithecus*) до недавнего периода, когда в поверхностных отложениях Мадагаскара были обнаружены субкаменелости *Megaladapis madagascariensis* и крупный неописанный вид (вероятно, нового рода) *Lemuridae*, оба из которых, возможно, жили в исторический период. В настоящее время лемуroidы неизвестны ни в Палеарктике, ни в Неарктике, и, за исключением четырех видов, ни один из них в настоящее время не встречается за пределами Эфиопского региона.

The *Anthropoidea*, с другой стороны, впервые появляются в неотропическом регионе, в верхнем эоцене, но возраст формации Санта-Крус, в которой встречаются останки, еще не установлен с уверенностью. В Восточном полушарии они появляются в середине миоцена и продолжают на протяжении плиоцена, плейстоцена и недавних отложений. До сих пор никаких останков не было найдено в Неарктическом регионе, где останки лемуroidов встречаются в таком изобилии.

В объединенных таблицах указано количество видов в каждом из шести крупных зоогеографических регионов, за которыми следуют другие, показывающие виды, характерные для различных подразделений этих Регионов, а также те, которые живут и окаменели в них:-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Палеарктический регион.	,Эфиопский регион.	Индийский регион.	Австралийский регион.	Неарктический регион.	Неотропический регион.
LEMUROID						
EA.						
Хиромида.						
Chiromys	—	1	—	—	—	—
Tarsiidae.						
Тарсий	—	—	2	1	—	—

**Мегаладап
ида.**

Мегаладап тис	—	1	—	—	—	—
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Лемуриды.

Perodicticu s	—	2	—	—	—	—
------------------	---	---	---	---	---	---

Лорис	—	—	1	—	—	—
-------	---	---	---	---	---	---

Показали Единствен ную	—	—	1	—	—	—
------------------------------	---	---	---	---	---	---

Галаго	—	6	—	—	—	—
--------	---	---	---	---	---	---

Chirogale	—	3	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---

Microcebus	—	5	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

Opolemur	—	2	—	—	—	—
----------	---	---	---	---	---	---

Лемур	—	8	—	—	—	—
-------	---	---	---	---	---	---

Mixocebus	—	1	—	—	—	—
-----------	---	---	---	---	---	---

Нарпалемур	—	2	—	—	—	—
------------	---	---	---	---	---	---

Lepidolemu r	—	7	—	—	—	—
-----------------	---	---	---	---	---	---

	—	1	—	—	—	—
--	---	---	---	---	---	---

быт. инэд.

Avahis	—	1	—	—	—	—
--------	---	---	---	---	---	---

Propithecus	—	4	—	—	—	—
-------------	---	---	---	---	---	---

Индрис	—	1	—	—	—	—
--------	---	---	---	---	---	---

**Anaptomor
phidæ.**

Microchær us	7	—	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Mixodectes	—	—	—	—	2	—
-------------------	---	---	---	---	---	---

Cynodonto mys	—	—	—	—	1	—
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Omomys	—	—	—	—	1	—
---------------	---	---	---	---	---	---

Anaptomor phus	—	—	—	—	3	—
---------------------------	---	---	---	---	---	---

Plesiadapi s	4	—	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Protoadapi s	2	—	—	—	—	—
-------------------------	---	---	---	---	---	---

Adapidæ.

Adapis	5	—	—	—	1	—
---------------	---	---	---	---	---	---

Tomitherium	—	—	—	—	1	—
Laopithecus	—	—	—	—	2	—
Pelycodus	1	—	—	—	4	—
Microsyops	—	—	—	—	3	—
Hyopsodus	1	—	—	—	6	—
Opisthotomus	—	—	—	—	?	—
Apheliscus	—	—	—	—	?	—
Sarcolemur	—	—	—	—	?	—
Hipposyus	—	—	—	—	?	—
	—	—	—	—	?	—
Bathrodon						
Mesacodon	—	—	—	—	?	—
Stenacodon	—	—	—	—	?	—
ANTHROPO IDEA.						
Хапалида.						
Хапале	—	—	—	—	8	Мидас
—	—	—	—	—	-	140
Себида.						
Chrysothrix	—	—	—	—	—	4
Callithrix	—	—	—	—	—	130
Nyctipithecus	—	—	—	—	—	5
Brachyurus	—	—	—	—	—	3
Pithecia	—	—	—	—	—	5
Alouatta	—	—	—	—	—	6
По Состоянию На	—	—	—	—	—	190
Lagothrix	—	—	—	—	—	2
Brachyteles	—	—	—	—	—	1
Ейтелес	—	—	—	—	—	100
Protopithecus	—	—	—	—	—	1
Гомункула	—	—	—	—	—	1

Anthropor s	—	—	—	—	—	1
? Гомоцентр ус	—	—	—	—	—	1
? Эвдиаст	—	—	—	—	—	1
Церкопите киды.						
Папском Колледже Аксоны	1	110	2	—	—	—
Theropithec us	—	1	—	—	—	—
Супопитhec us	—	—	1	1	—	—
Oreopithec us	1	—	—	—	—	—
Macacus	8	—	140	2	—	—
Dolichopit hecus	1	—	—	—	—	—
Mesopithe cus	1	—	—	—	—	—
Cercocebus	—	6	—	—	—	—
Cercopithe cus	—	410	—	—	—	—
Колобус	1	100	—	—	—	—
Сам	1	—	310	—	—	—
Нашлялись Simiidæ.	—	—	1	—	—	—
Pliopithec s	1	—	—	—	—	—
Гиббоновы е	1	—	7	—	—	—
Dryopithec us	1	—	—	—	—	—
Обезьяний	—	—	1	—	—	—
Горилла	—	1	—	—	—	—
Anthropit hecus	—	2	1	—	—	—

Ниже приводится краткий обзор прошлого и нынешнего распределения приматов в различных субрегионах и провинциях, признанный доктором Боудлером Шарпом в его статье "Зоогеографические районы мира", о которой уже упоминалось.

Черный шрифт указывает на вымершие или ископаемые виды. Названия видов, характерных для определенной области, напечатаны обычным шрифтом, а те, которые являются общими для двух или более областей, выделены курсивом.

А. ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

А¹. АРКТИЧЕСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

А². ЕВРАЗИЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

А². а. ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
Живой. Вымерший.				Живой. Вымерший.			
Своеобразные	роды	—	3	Своеобразных	рода	—	3
„	виды	—	200	„	виды	—	9

Ранее в провинции существовали следующие виды:—

LEMUROIDEA.

1. *Microchærus antiquus*. 2. *M. erinaceus*. 3. *M. edwardsi*. 4. *M. parvulus*. 5. *М. циттели*. 6. *M. armatus*. 7. *M. (Cryptopithecus) siderolithicus*. 8. *Plesiadapis remensis*. 9. *П. Жерваиси*. 10. *П. турнесарти*. 11. *П. Добрей*. 12. *Протоадапис crassicuspidens*. 13. *P. recticuspidens*. 14. *Adapis parisiensis*. 15. *A. lemuroides*. 16. *A. magna*. 17. *А. августовский*. 18. *А. минопа*. 19. *Пеликодус гельветический*. 20. *Hyopsodus jurensis*.

АНТРОПОИДЕИ.

1. *Macacus priscus*. 2. *M. pliocenus*. 3. *M. suevicus*. 4. *Русский долихопитек*. 5. *Большой колобус*. 6. *Pliopithecus antiquus*. 7. *П. шантрей*. 8. *Hylobates sp.* 9. *Dryopithecus fontani*.

А². б. ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.			II. Антропоидеи.		
Живой. Вымерший.			Живой. Вымерший.		
Своеобразный	Роды	отсутствуют	Роды	отсутствуют	
„	виды	„	„	виды	„

А³. МАНЬЧЖУРСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	2	—

В этом субрегионе в настоящее время встречаются следующие виды:-

1. *Macacus fuscatus*. 2. *M. tcheliensis*.

A⁴. СРЕДИЗЕМНОМОРСКО-АЗИАТСКИЙ СУБРЕГИОН.

A⁴. α. ПРОВИНЦИЯ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	2
„	виды	—	—	„	виды	1	6

Для этой провинции характерны следующие виды:—

1. **Папио атлантикус**. 2. **Ореопитек бамболии**. 3. *Macacus inuus* (живые и ископаемые). 4. **M. florentinus**. 5. **M. trarensis**. 6. **Мезопитек пентеличи**. 7. **Семнопитек монспессуланус**.

A⁴. β. СРЕДИЗЕМНОМОРСКО-ПЕРСИДСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Своеобразный	Роды	отсутствуют		Роды	отсутствуют		
,	виды	„		„	,	виды	„„„

A⁴. γ. МОНГОЛЬСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

Б. ЭФИОПСКИЙ РЕГИОН.

B¹. САХАРСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

B². СУДАНСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	3	—

В этом субрегионе, по-видимому, встречаются следующие виды:—

1. *Галаго сенегальское*. 2. *Г. Демидовфи*. 3. *Папио Маймон*. 4. *П. Бабуин*. 5. *П. сфинкс*. 6. *П. гамадриш*. 7. *Церкопитек сабейский*. 8. *C. neglectus*. 9. *C. patas*. 10. *C. pyrrhonotus*.

В³. ЗАПАДНОАФРИКАНСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	1	—	Особые	роды	2	—
„	виды	4	—	„	виды	370	—

В этом субрегионе встречаются следующие виды:-

1. *Perodicticus calabarensis*. 2. *P. potto*. 3. *Galago alleni*. 4. *Г. Демидовфи*. 5. *Г. монтейри*. 6. *Папио Маймон*. 7. *P. leucophaeus*. 8. *П. бабуин*. 9. *П. Анупис*. 10. *P. sphinx*. 11. *Cercocebus fuliginosus*. 12. *C. ethiops*. 13. *C. albigena*. 14. *C. aterrimus*. 15. *Cercopithecus petaurista*. 16. *C. signatus*. 17. *C. erythrogaster*. 18. *C. buettikoferi*. 19. *C. martini*. 20. *C. ludio*. 21. *C. melanogenys*. 22. *C. nictitans*. 23. *C. stampflii*. 24. *C. erythrotis*. 25. *C. cephus*. 26. *C. cynosurus*. 27. *К. каллитрих*. 28. *C. mona*. 29. *C. albigularis*. 30. *C. campbelli*. 31. *C. leucampyx*. 32. *C. grayi*. 33. *C. rogonias*. 34. *К. Диана*. 35. *C. palatinus*. 36. *C. brazzae*. 37. *C. talapoin*. 38. *C. nigripes*. 39. *C. wolffi*. 40. *Colobus verus*. 41. *C. ferrugineus*. 42. *C. satanas*. 43. *C. ursinus*. 44. *C. vellerosus*. [?45. *C. angolensis*.] 46. *C. guereza*. 47. *Горилла gorilla*. 48. *Антропитек нигерский*. 49. *А. Кальвус*.

В⁴. АБИССИНСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	1	—
„	виды	—	—	„	виды	5	—

Этот субрегион является средой обитания следующих видов:-

1. *Папио догуэра*. 2. *П. бабуин*. 3. *П. Тот*. 4. *П. гамадриас*. 5. *Теропитек гелада*. 6. *T. obscurus*. 7. *Церкопитек сабейский*. 8. *С. Бутурлини*. 9. *Колобус гереза*.

В⁵. ВОСТОЧНОАФРИКАНСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	1	—	„	виды	11	—

В этом субрегионе встречаются следующие виды:-

1. Галаго сенегальский. 2. *G. garnetti*. 3. *G. crassicaudata*. 4. Папио Бабуин. 5. *P. ibeanus*. 6. П. Сфинкс. 7. П. Лангхельди. 8. *Cercocebus galeritus*. 9. *Cercopithecus rufo-viridis*. 10. *C. schmidt*. 11. *C. albigularis*. 12. *C. pygerythrus*. 13. *C. ochraceus*. 14. *C. stairsi*. 15. *C. moloneyi*. 16. *C. leucampyx*. 17. *Colobus rufo-mitratus*. 18. *C. kirki*. 19. *C. angolensis*. 20. *C. guereza*. 21. *C. caudatus*.

В⁶. ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ СУБРЕГИОН.

а. КАПСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	вид	1	—

В этой провинции обитают следующие виды:—

1. *Papio porcarius*; *Cercopithecus pygerythrus*.

б. ПРОВИНЦИЯ НАТАЛЕ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	вид	1	—

В пределах этой провинции встречаются следующие виды:—

1. Галаго сенегальское. 2. *G. crassicaudata*. 3. *Cercopithecus pygerythrus*. 4. *C. albigularis*. 5. *C. samango*.

В⁷. СУБРЕГИОН КАМЕРОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

В этом субрегионе встречаются следующие виды:-

1. *Cercopithecus albigularis*. 2. Хвостатый колобус.

В⁸. ЛЕМУРИЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.		II. Антропоидеи.	
Живой.	Вымерший.	Живой.	Вымерший.

Своеобразные	роды	12	2	Своеобразных	родов	—	—
„	виды	34	2	„	вид	1	—

Для этого субрегиона характерны следующие виды:-

1. *Chiromys madagascariensis*; *Chirogale*, 4 вида; *Microcebus*, 4 вида; *Opolemur*, 2 вида; *Lemur*, 8 видов; ***Megaladapis madagascariensis*; Gen. ined.**; *Mixocebus caniceps*; *Hapalemur*, 2 вида, *Lepidolemur*, 7 видов; *Avahis laniger*; *Propithecus*, 3 вида; *Indris brevicaudatus*.

С. РЕГИОН ИНДИИ.

С¹. СУБРЕГИОН ПОЛУОСТРОВА ИНДИАНА.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	1	—	Особые	роды	—	—
„	виды	1	—	„	виды	6	4

Для этого субрегиона характерны следующие виды:-


1. Лорис изящный. 2. **Папио субгималайский**. 3. **П. фальконери**. 4. *Макака-резус*. 5. *M. pileatus*. 6. *M. sinicus*. 7. ***M. sivalensis***. 8. Семнопитек энтеллус.^[4] 9. *S. priamus*. 10. *S. hypoleucus*. 11. *S. cephalopterus*. 12. ***S. palæindicus***.

С². ИНДО-МАЛАЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	2	—
„	вид	1	—	„	вид	190	—


LEMUROIDEA.

ТАБЛИЧКА XLIV.



III. КАРТА, показывающая распространение семейства *Chiromyidae*, подсемейств *Lemurinae* и *Indrisinae* (синяя), а также *Lorisinae* (красная) семейства *Lemuridae*.

ANTHROPOIDEA ПЛАСТИНКА XLV.



IV. КАРТА, показывающая распределение ныне живущих (синяя) и ископаемых (красная) антропоидей.

В этом субрегионе обитают следующие виды:-

1. Тарсий тарсий. 2. *T. фускус*. 3. *Nycticebus tardigradus*. 4. *Macacus rufescens*. 5. *M. nemestrinus*. 6. *M. cynomolegus*. 7. *Semnopithecus sabanus*. 8. *C. хозии*. 9. *C. томази*. 10. *C. эверетти*. 11. *C. крусигер*. 12. *S. obscurus*. 13. *S. maurus*. 14. *S. femoralis*. 15. *S. rubicundus*. 16. *S. natunæ*. 17. *S. frontatus*. 18. *S. melanolophus*. 19. *S. mitratus*. 20. *Nasalis larvatus*. 21. *Hylobates agilis*. 22. *H. leuciscus*. 23. *H. lar*. 24. *H. syndactylus*. 25. Симиа сатирус.

С³. ИНДОКИТАЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.			II. Антропоидеи.		
Живой. Вымерший.			Живой. Вымерший.		
Особые роды	—	—	Особые роды	—	—
„ виды	—	—	„ виды	13	—

В этом субрегионе обитают следующие виды:-

1. *Nycticebus tardigradus*. 2. *Macacus leoninus*. 3. *M. Резус*. 4. *M. санкти-йоханнис*. 5. *M. Циклоп*. 6. *M. cynomologus*. 7. *Semnopithecus barbii*. 8. *S. pileatus*. 9. *S. obscurus*. 10. *S. germaini*. 11. *S. phayrii*. 12. *S. nemæus*. 13. *S. nigripes*. 14. *S. siamensis*.^[5] 15. *Hylobates agilis*. 16. *H. leucogenys*. 17. *H. hoolock*. 18. *H. lar*. 19. *X. Хайнань*.

С⁴. ГИМАЛО-КИТАЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.		II. Антропоидеи.	
Живой. Вымерший.		Живой. Вымерший.	

Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	3	—

В этом субрегионе встречаются следующие виды:-

1. *Macacus arctoides*. 2. *M. lasiotis*. 3. *Semnopithecus roxellanae*. 4. *S. schistaceus*.

C⁵. ГИМАЛО-МАЛАЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	4	—,,

В этом субрегионе встречаются следующие виды:-

1. *Macacus arctoides*. 2. *M. assamensis*. 3. *M. Силен*. 4. *Семнопитек Джони*. 5. *С. урсин*.

D. АВСТРАЛИЙСКИЙ РЕГИОН.

D¹. ЦЕЛЕБЕЗИЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	2	—

В этом субрегионе обитают следующие виды:-

1. *Тарсий фускус*. 2. *Нигерский кинопитек*. 3. *Macacus maurus*. 4. *M. cynomologus*.

D². МОЛУККСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

В этом субрегионе встречается только один вид:-

Macacus cynomologus. (Тимор; Ломбок.)

D.³. ПАПУАС. D.⁴. АВСТРАЛИЕЦ. Г⁵. НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Г⁶. ФИДЖИЕЦ. D⁷. СУБРЕГИОНЫ ГАВАЙЕВ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—

„ ВИДЫ — — „ ВИДЫ — —

Оба отряда неизвестны в этих субрегионах.

E. НЕАРКТИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ.

*E*¹. АРКТИЧЕСКИЙ СУБРЕГИОН.

а. АРКТИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

1. Lemuroidea и Anthroidea—недавние и вымершие—неизвестно.

β. АРКТИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ АЛЯСКА.

1. Lemuroidea и Anthroidea—недавние и вымершие—неизвестно.

*E*². СУБРЕГИОН С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Своеобразные	роды	—	15	Своеобразных	родов	—	—
„	виды	—	30	„	виды	—	—

В этом субрегионе были обнаружены ископаемые останки следующих видов:-

1. Острый миксодектес. 2. *M. crassiusculus*. 3. *Cynodontomys latidens*. 4. Омомис картери. 5. *Anaptomorphus aemulus*. 6. *A. гомункулус*. 7. Тенеброзус. 8. *Tomitherium rostratum*. 9. *Laopithecus robustus*. 10. *L. lemurinus*. 11. *Pelycodus jarrovii*. 12. *P. tutus*. 13. *P. frugivorus*. 14. *P. angulatus*. 15. *Microsyops spierianus*. 16. *M. elegans*. 17. *M. scottianus*. 18. Хиопсодус послушник. 19. *H. paulus*. 20. *H. minusculus*. 21. *X. Викариус*. 22. *X. пауэллианус*. 23. *Indrodon* sp. 24. *Opisthotomus* sp. 25. *Apheliscus* sp. 26. *Sarcolemur* sp. 27. *Hipposyus* sp. 28. *Bathrodon* sp. 29. *Mesacodon* sp. 30. *Stenacodon* sp.

*E*³. СУБРЕГИОН С УМЕРЕННЫМ КЛИМАТОМ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

Оба отряда приматов отсутствуют в этом субрегионе.

F. НЕОТРОПИЧЕСКИЙ РЕГИОН.

*F*¹. АНТИЛЬСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—

„ виды — — „ виды — —

Оба отряда приматов отсутствуют в этом субрегионе.

F². СУБРЕГИОН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ.

α. МЕКСИКАНСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	—	—

Из этой провинции известны следующие виды^[6]:—

1. *Ateles vellerosus*.

β. ИСТМИЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	4	—,,

В этой провинции обитают следующие виды:—

1. *Мидас Розалия*. 2. *М. Жоффруа*. 3. Хризотрикс эрстеди. 4. *Nyctipithecus rufipes*. 5. Алуатта виллоза. 6. *A. palliata*. 7. *Cebus hypoleucus*. 8. *Ателес Жоффруа*. 9. *A. руфивентрис*. 10. *A. Атер*. 11. *A. vellerosus*.

F³. СУБАНДИЙСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	—	—
„	виды	—	—	„	виды	7	—

Следующие виды зарегистрированы как обитающие в этом субрегионе:-

1. *Нарале леукопус*. 2. *Мидас розалия*. 3. *М. Жоффруа*. 4. М. Эдип. 5. *Chrysothrix sciurea*. 6. *Callithrix ornata*. 7. *Нуктипитек темурин*. 8. *Н. фелинус*. 9. *Сеникула алуатта*. 10. *Себус гиполев*. 11. *C. fatuellus*. 12. *C. capucinus*. 13. *C. albifrons*. 14. *C. chrysopus*. 15. *Lagothrix лаготрикс*. 16. *L. infumatus*. 17. *Белки пестрые*. 18. *А. Жоффруа*. 19. *А. руфивентрис*. 20. *А. Атер*. 21. *A. fusciceps*. 22. *A. cucullatus*.

F⁴. СУБРЕГИОН АМАЗОНКИ.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
		Живой.	Вымерший.			Живой.	Вымерший.
Особые	роды	—	—	Особые	роды	2	—

В этом субрегионе обитают следующие виды:-

1. *Hapale jacchus*. 2. *H. humeralifer*. 3. *H. chrysoleuca*. 4. *H. pygmæa*. 5. *H. melanura*. 6. *Midas labiatus*. 7. *M. rufiventer*. 8. *M. mystax*. 9. *M. pileatus*. 10. *M. weddelli*. 11. *M. nigricollis*. 12. *M. illigeri*. 13. *M. bicolor*. 14. *M. midas*. 15. *M. ursulus*. 16. *Chrysothrix sciurea*. 17. *C. usta*. 18. *Callithrix torquata*. 19. *C. cuprea*. 20. *C. amicta*. 21. *C. cinerascens*. 22. *C. personata*. 23. *C. nigrifrons*. 24. *C. castaneiventris*. 25. *Nyctipithecus trivirgatus*. 26. *N. lemurinus*. 27. *N. felinus*. 28. *Brachyurus melanocephalus*. 29. *B. rubicundus*. 30. *B. calvus*. 31. Питеция монахус. 32. *P. pithecia*. 33. *P. satanas*. 34. *P. chiropotes*. 35. *P. albinasa*. 36. *Алуатта сеникула*. 37. *A. Вельзевул*. 38. *A. урсина*. 39. *Cebus monachus*. 40. *C. fatuellus*. 41. *C. cirrifer*. 42. *C. albifrons*. 43. *Ларотрикс инфуматус*. 44. *Ateles variegatus*. 45. *A. paniscus*. 46. *A. marginatus*. 47. *A. amep*.


F⁵. БРАЗИЛЬСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.				II. Антропоидеи.			
Живой.		Вымерший.		Живой.		Вымерший.	
Особые	роды	—	—	Особые	роды	1	1
„	виды	—	—	„	виды	200	5

В этом субрегионе зарегистрированы следующие виды. Однако во многих случаях определение ареала обитания "Бразилия" может оказаться ошибочным, поскольку в старину им часто называли Амазонию.

1. *Hapale aurita*. 2. *H. melanura*. 3. **Х. Якхус**. 4. **Х. Грандис**. 5. *Мидас Розалия*. 6. *M. fuscicollis*. 7. *M. chrysopygus*. 8. *Chrysothrix usta*. 9. *C. entomophaga*.^[7] 10. *Каллитрикс Молох*. 11. *C. castaneiventris*. 12. *C. melanochir*. 13. *C. gigot*. 14. **C. chlorocnomys**. 15. **C. primæva**. 16. *Nyctipithecus azaræ*. 17. *Alouatta nigra*. 18. **А. Урсина**. 19. *Cebus lunatus*. 20. *C. flavus*. 21. *C. capucinus*. 22. *C. monachus*. 23. *C. variegatus*. 24. *C. robustus*. 25. *C. annellatus*. 26. *C. albifrons*. 27. *C. flavescens*. 28. **C. fatuellus**. 29. **C. cirrifer**. 30. **C. macrognathus**. 31. *C. vellerosus*. 32. *C. subcristatus*. 33. *C. capillatus*. 34. *C. azaræ*. 35. *Brachyteles arachnoides*. 36. **Бразильский протопит**.

ANTHROPOIDEA ПЛАСТИНКА XLVI.



V. КАРТА, показывающая распределение семейств *Harpalidae* (красный) и *Cebidae* (синий).

ANTHROPOIDEA ТАБЛИЧКА XLVII.



VI. КАРТА, показывающая распределение родов *Papio*, *Theropithecus*, *Cynopithecus*, *Cercosebus* и *Cercopithecus* (синяя) и *Macacus* (красная).

F⁶. ПАТАГОНСКИЙ СУБРЕГИОН.

I. Lemuroidea.			II. Антропоидеи.		
Живой. Вымерший.			Живой. Вымерший.		
Особые	роды	— —	Особые	роды	— 4
„	виды	— —	„	виды	— 4,

В этом субрегионе были обнаружены следующие ископаемые виды:-

1. Гомункулус патагоникус. 2. Антропопс совершенный. 3. Аргентинский гомоцентр. 4. Эвдиаст языкастый.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Во время прохождения этого тома через прессу в руки автора попало много дополнительных материалов, а также были опубликованы результаты важных недавних исследований. Поэтому было добавлено следующее приложение, включающее последние дополнения к нашим знаниям об антропоидах, о которых идет речь на его страницах.

На странице 82 талапоин (*Cercopithecus talapoin*) был отнесен к группе (и, действительно, Джеффри отнес его к отдельному роду — *Miopithecus*), в которой он является единственным примером из-за предполагаемой особенности наличия всего трех бугорков на заднем нижнем коренном зубе. Образец, который автор недавно исследовал, показывает, что этот признак не является неизменным, и поэтому, по его мнению, этот вид следует отнести к Зеленым генонам — группа II., *Cercopithecini Chloronoti* — и поместить следующим после танталового генона на странице 62.

Чрезвычайно важные коллекции, сделанные его другом доктором Форсайтом Мейджором во время его авантурных исследований на Мадагаскаре в 1894-1896 годах, из которых он только что вернулся, сделали необходимым добавить на странице 212 новое семейство к *Anthropoidea*. В болотах Сирабе, в Центральной части Мадагаскара, он обнаружил ископаемые останки вида настоящих обезьян — группы, до сих пор неизвестной на этом острове, — которая, должно быть, была современницей эйорниса, хорошо известной гигантской моа-подобной бескилевой птицы, которая когда-то обитала там, но теперь вымерла. Найденные фрагменты показывают, что у этого существа орбиты были направлены прямо вперед и были отделены от височных ямок костной стенкой. Слезное отверстие располагалось внутри края орбиты; внутренние верхние резцы соприкасались по средней линии; носовые кости были широкими и вогнутыми в профиль, в то время как контур лица, если смотреть сбоку, был очень высоким. Рисунок коренных зубов очень похож на тот, что наблюдается у генонов (*Cercopithecidae*). "Носовые пазухи широкие, - продолжает доктор Мейджор, - как и вся межорбитальная область, ее поперечный диаметр почти равен диаметру орбит и, следовательно, превышает тот, который получен у родов *Anthropoidea*, которые демонстрируют максимальную внешнюю протяженность области (*Mycetes, Hylobates, Homo*)". Это, пожалуй, единственный момент, когда окаменелость приближается к некоторым из *Lemuroidea*. Формула его верхних зубов равна I2, C1, P3, M3 = 18, или той, которая до сих пор считалась характерной для обезьян Нового Света. "Каждый из трех коренных зубов состоит из четырех бугорков, внешняя и внутренняя пары расположены напротив друг друга и соединены между собой поперечными выступами. Это характерно для *Cercopithecidae*; но, в отличие от обезьян Старого Света, коренные зубы уменьшаются в размере спереди назад" (крупные). Для нижней челюсти формула, по-видимому, была следующей: I2, C1, P2, M3 = 16. Следовательно, "хотя зубная формула верхних зубов совпадает с формулой *Cebidae*, на нижней челюсти она довольно своеобразна, и хотя строение коренных зубов такое же, как у *Cercopithecidae*, премоляры одинаково отличаются у обезьян Старого и Нового Света.... Эти объединенные признаки вполне оправдывают выделение отдельного семейства *Anthropoidea* для малагасийских ископаемых, промежуточного в некоторых отношениях между южноамериканскими *Cebidae* и *Cercopithecidae* Старого Света, помимо того, что оно обладает собственными признаками". Таким образом, доктор Форсайт Мейджор предложил новый

род *Nesopithecus* для получения этой самой замечательной обезьяны в рамках нового семейства *Nesopithecidae*..... Открытие *Nesopithecus roberti*, как он обозначил этот вид, предполагает, как изложил доктор Мейджор в "Геологическом журнале" за октябрь 1896 г., стр. 436, "следующие общие выводы:

"(1) Точно так же мы можем ожидать открытия обезьян третичного периода в Континентальной Африке, промежуточных между *Cebidae* и *Cercopithecidae*.

"(2) Недавние африканские *церкопитеки* не являются пришельцами с Северо-Востока, как предполагалось; напротив, большинство, если не все, третичных обезьян Европы и Азии происходят из региона Эфиопии. Родина, по крайней мере, части *антропоидей*, по-видимому, находилась в Южном полушарии. Это предположение подтверждается двумя фактами: *Антропоидеи* впервые появляются в позднем третичном периоде Европы и Азии и что они полностью отсутствуют в третичном периоде Северной Америки".

После первого абзаца на странице 219 открытия доктора Юджина Дюбуа, сделанные с момента написания этих страниц, требуют вставки следующих абзацев.


В 1892 году этот выдающийся геолог внес один из самых важных вкладов в наши знания о древности человека. В том же году он извлек большое количество останков позвоночных из пластов, возраст которых был определен как позднеплиоценовый, если не миоценовый, "сцементированного вулканического туфа, состоящего из глины, песка и уплотненных лапилли", в Триниле на склоне холмов Кенденг на Яве. Среди этих останков были часть черепа, два коренных зуба и бедренная кость, представляющие собой смесь обезьяньих и человеческих черт. Размеры черепной коробки показали, что внутренний объем черепа составлял около 1000 кубических сантиметров, в то время как самые крупные черепа обезьян имели в среднем всего около 500 сантиметров. За исключением этой большой вместительности, кальвариум представлял собой несколько признаков, которые не были сильно обезьяньими, и из всех обезьян он больше всего походил на гиббонов (*хилобатов*); но по своему черепному своду — низкому и вдавленному, каким бы ни был свод — он намного превосходил черепной свод любой обезьяны. Лобная область была узкой, а надбровные дуги выступали вперед. Шейная часть затылочной кости также имела обезьяноподобную форму. Бедренная кость (*femur*), с другой стороны, в очень заметной степени отражала человеческие черты и не давала никаких указаний на то, что человек, которому она принадлежала, имел привычку сидеть на своих окороках. Коренные зубы также были скорее человеческими, чем обезьяноподобными, хотя в них было много сильных обезьяньих черт. Доктор Дюбуа отнес эти замечательные окаменелости к виду, который он назвал *Pithecanthropus erectus* (человекообразная обезьяна прямоходящая), поскольку он считает, что их обладатель занимал место в генеалогическом древе ниже точки отделения человекообразных обезьян от человеческой линии. Доктор Каннингем из Дублина, однако, который является одним из наших самых выдающихся анатомов и антропологов, поместил бы их "по линии человека, на небольшом расстоянии выше точки, от которой отходит антропоидная ветвь"; ибо он мог бы "не верить, что человекообразная форма с черепной коробкой в 1000 сантиметров могла быть прародительницей человекообразных обезьян, самая крупная из которых имела черепную коробку всего в 500 сантиметров. Такое предположение неизбежно включало бы в себя предположение, что человекообразные обезьяны были дегенерировавшей ветвью общего ствола ". Таким образом, в целом изучение этих важных останков, как правило, показывает, что у *питекантропа* был самый низкий из известных человеческих черепов и он был самым обезьяноподобным предком человеческой расы, который когда-либо был описан. Он был почти настолько же ниже неандертальца, насколько ниже обычного европейца. Следует отметить, что были высказаны

некоторые сомнения в том, принадлежат ли все останки одному и тому же виду животных. Аргументы доктора Дюбуа в пользу их реальной принадлежности одному и тому же индивидууму кажутся, однако, очень убедительными.

На странице 223 после окончания первого абзаца вставить:—


В отложениях палеолитической террасы на Галли-Хилл в графстве Кент, в слоях, в которых были найдены многочисленные палеолитические орудия, в 1895 году было сделано одно из самых интересных открытий древних жителей Англии. В этих слоях был обнаружен человеческий череп с нижней челюстью и частями костей конечностей. Череп очень длинный и узкий; его индекс ширины превышает 64, а индекс высоты 67. Надбровные дуги были большими, глабелла выступающей, лоб скошенным, а затылочный бугор уплощенным снизу, в то время как самый задний коренной зуб был больше первого. Череп имел многочисленные признаки сходства с черепами неандертальцев и шпионов, а также с черепами представителей расы раннего неолита. Кости конечностей указывали на то, что человек был невысокого роста, чуть выше пяти футов. Доказательства того, что эти останки были естественным образом замурованы в плейстоценовую эпоху в очевидно нетронутых отложениях гравия, в которых они были найдены, а не захоронены в гораздо более поздний период, были очень убедительными.

ANTHROPOIDEA ТАБЛИЧКА XLVIII.



VII. КАРТА, показывающая распространение родов *Semnopithecus* (синий), *Nasalis* (коричневый) и *Colobus* (красный).

ANTHROPOIDEA ПЛАСТИНКА XLIX.



VIII. КАРТА, показывающая распределение родов *Hylobates* (красный), *Simia* (синий), *Gorilla* (коричневый) и *Anthropopithecus* (зеленый).

Примечания.

[1]

У образцов *Anthropopithecus niger* и гориллы *Gorilla* из музея Дерби, Ливерпуль, у которых постоянные зубы еще не сформировались, предчелюстной шов полностью стерт.

[2]

Деформация человеческого черепа, известная как акроцефалия, которая встречается у всех человеческих рас и обусловлена слишком ранним окостенением некоторых его швов, была обнаружена у шимпанзе.

[3]

"Естественная история человекообразных обезьян" Хаксли, стр. 5.

[4]

Живые и ископаемые.

[5]

Форма *S. mitratus*.

[6]

Мидас Руфивентер, о котором доктор Грей сказал, что он из Мексики, сейчас считается амазонцем. Утверждение мистера Бейтса о том, что *Harale rugtæa* обитает в Мексике (том I, стр. 136), ошибочно, и ни один вид мартышки не известен в мексиканской провинции.

[7]

Я утверждаю, что *Chrysothrix entomophaga* (том i, стр. 156) обитает в Центральной Америке. Панамская беличья обезьяна, однако, является *C. ørstedii*, и *C. entomophaga* должна быть ограничена Бразильским субрегионом (см. Alston, Biol. Центр. Амер. Мама., стр. 16).